

平成 30（2018）年度ニギス太平洋系群の資源評価

責任担当水研：中央水産研究所（巨 真吾、渡井幹雄）

参画機関：愛知県水産試験場漁業生産研究所

要 約

本系群の資源状態について、主要漁場である太平洋中部の熊野灘における1そうびき沖合底びき網漁業の資源密度指数の経年変化に基づいて評価した。本系群は、太平洋中部・南部の沖合底びき網漁業と愛知県の外海小型底びき網漁業で主に漁獲される。本系群の漁獲量は、1980年代後半から増加し1990年代後半には1,900トン台で過去最高の水準に達した。しかし、その後は減少傾向で2010年以降700トン前後で推移し2017年には616トンとなった。太平洋中部の主要漁獲海域である熊野灘における1そうびき沖合底びき網漁業の努力量は、近年横ばいで推移している。この資源密度指数（資源量指標値）を用いて、2017年の水準は低位、動向は横ばいと判断した。資源水準および資源量指標値の変動傾向に合わせて漁獲を行うことを管理方策とし、平成30年度ABC算定のための基本規則2-1)に基づき2019年ABCを算定した。

| 管理基準 | Target/ Limit | 2019年ABC (トン) | 漁獲割合 (%) | F値 |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|----|
| 0.7・Cave3-yr・0.878 | Target | 340 | — | — |
| | Limit | 424 | — | — |

Limitは、管理基準の下で許容される最大レベルの漁獲量である。Targetは、資源変動の可能性やデータ誤差に起因する評価の不確実性を考慮し、管理基準の下でより安定的な資源の増大または維持が期待される漁獲量である。 $ABC_{target} = \alpha ABC_{limit}$ とし、係数 α には標準値0.8を用いた。Cave3-yrは過去3年間（2015～2017年）における平均漁獲量である。

| 年 | 資源量 (トン) | 親魚量 (トン) | 漁獲量 (トン) | F値 | 漁獲割合 (%) |
|------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 2013 | — | — | 599 | — | — |
| 2014 | — | — | 593 | — | — |
| 2015 | — | — | 718 | — | — |
| 2016 | — | — | 739 | — | — |
| 2017 | — | — | 616 | — | — |

水準：低位 動向：横ばい

本件資源評価に使用したデータセットは以下のとおり

| データセット | 基礎情報、関係調査等 |
|------------------|--|
| 年別漁獲量 | 漁業・養殖業生産統計年報（農林水産省） 太平洋中部・南部沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計年報（水研） |
| 資源量指数 ・資源量指数等 | 太平洋中部・南部沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計年報（水研） |
| 漁獲努力量 | 太平洋中部・南部沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計年報（水研） |

1. まえがき

本系群の主要な漁場は、太平洋の中部海域（伊豆沖から熊野灘）と南部海域（紀州沖から薩南）である。本系群は太平洋中部・南部の沖合底びき網漁業（以下、沖底）の重要な漁獲対象種の一つであり、愛知県では外海小型底びき網漁業（以下、外海小底）による漁獲も行われている。愛知県以外の小底の漁獲については、統計値が未整備のため明らかではない。なお、当該海域において本種を漁獲対象とする外国漁船はない。

2. 生態

(1) 分布・回遊

本系群は、金華山から日向灘に至る太平洋沿岸の水深 100～450m に帯状に分布する（図 1）。金華山以南から房総半島沖の分布については、断片的な知見があるのみで詳細については不明である（Fujita et al. 1993）。土佐湾では本種の幼稚魚（標準体長（以下、体長）2cm 以上）は、主に 4～6 月に水深 100～150m に着底し、8～9 月までその場に留まり、それ以降成長に伴って棲み場を深みに拡大しつつ、水深 150～250m 付近に分布する成魚群へ加入していく（堀川・阪地 1996）。水平的な移動・回遊の実態については、卵稚仔の輸送を含めてほとんど知見がない。

(2) 年齢・成長

年齢と体長の関係は、満 1 歳で 13cm、満 2 歳で 18cm、満 3 歳で 20cm ほどであり（図 2）、寿命は 3 歳程度と考えられる（羽生 1956、Nashida et al. 2007、梨田 未発表）。耳石を用いた年齢解析によると、高知県沖で漁獲された漁獲物の大部分（90%）が 2 歳魚であった（片山・梨田 2010）。

(3) 成熟・産卵

土佐湾では、9 月を除くほぼ周年にわたって産卵するが、産卵盛期は 2～3 月であり、11～12 月にも産卵の小さなピークが出現するものと考えられる。前者は春生まれ群、後者は秋生まれ群と考えられ、0 歳魚に占める割合は、春生まれ群が圧倒的に多い（Nashida et al. 2007、梨田 2010、梨田 2013）。産卵は水深 200～300m の海底付近で行われ、成熟開始年齢は満 2 歳と考えられる。

(4) 被捕食関係

幼稚魚はカイアシ類を主に捕食するが、それ以降はオキアミ類が主体となる（堀川ほか

1992、堀川・阪地 1996)。捕食者は中・大型の底魚類と想定される。

3. 漁業の状況

(1) 漁業の概要

本系群の主要な漁業は、1 そうびき沖合底びき網漁業（1 そうびき沖底）と外海小底であり、2 そうびき沖合底びき網漁業でも漁獲される。主要漁場は太平洋中部海域（伊豆沖から熊野灘）では熊野灘、太平洋南部海域（紀州沖から薩南）では土佐沖で、漁獲水深は 200～300m である。

(2) 漁獲量の推移

本系群の漁法別海域別漁獲量を図 3 および表 1 に示す。全体の漁獲量は、1980～1990 年代は 1,000～2,000 トンの水準で推移し、1997 年には 1,977 トンと最高となった。その後は減少傾向で 2000 年代は 800～1,200 トン前後、2010 年以降は 1,000 トン以下で推移し、2014 年には過去最低の 593 トンとなった。2017 年の漁獲量は 616 トン（暫定値）となった。中部海域の 1 そうびき沖底による漁獲量は、1990 年代前半までは 500～900 トン台で推移し、その後 200～500 トン台で推移している。2017 年は 208 トン（暫定値）で、熊野灘における漁獲が 7 割程度を占めている。南部海域の 1 そうびき沖底による漁獲量は、1980～1990 年代は 500～900 トン台で推移していたが、2000 年代以降は 100～300 トン台で推移している。2017 年は 194 トン（暫定値）で、ほぼすべてが土佐沖における漁獲であった。外海小底による漁獲量は、1997 年の 616 トンをピークに減少傾向となり 2000 年代以降は 100～200 トン台で推移し、2017 年は 211 トン（暫定値）であった。なお、本系群は金華山以南の太平洋北部にも分布しているが、そこで操業する沖合底びき網漁業漁場別漁獲統計資料の集計対象魚種にはなっていないため太平洋北部の漁獲量は含まれていない。

(3) 漁獲努力量

中部海域の主要漁場である熊野灘と南部海域の主要漁場である土佐沖における 1 そうびき沖底の有効漁獲努力量（総漁獲量/資源量指数、網数）の推移を図 4 に、着業隻数、資源量指数等の統計値を表 2 に示す。なお、資源量指数は小海区（緯度経度 10 分升目）ごとの CPUE (kg/網) を全漁区合算した値、資源密度指数 (kg/網) は資源量指数を有漁漁区数で除した値である。これらの資源量指標値等の算出方法の詳細を補足資料 2 に示す。熊野灘では、着業隻数は 1980 年の 15 隻から 1997 年に 4 隻まで減少したが、2002 年以降は 5 隻となっている。有効漁獲努力量は 1980 年代後半に 7,000～9,000 網と高い値を示したが、1990 年代後半以降 2,000～4,000 網で横ばいで推移して、2017 年は 2,809 網であった。土佐沖では、着業隻数は 1980 年の 8 隻であったが、2002 年以降は 2 隻に減少している。有効漁獲努力量は 1986 年に最大の 6,970 網を示したが、その後大きく減少し、2017 年は 290 網であった。土佐沖では 2012 年以降、休業、故障、代船建造などの影響で、努力量が大きく低下している。努力の有効度（有効漁獲努力量/総ひき網数）は熊野灘より土佐沖の方が高く、土佐沖でニギスを狙った操業が多いことを示している。

4. 資源の状態

(1) 資源評価の方法

本資源の主要漁場である熊野灘と土佐沖のうち、近年において操業隻数が5隻と横ばいで推移している、熊野灘の1そうびき沖底の資源密度指数を系群全体の資源量指標値として資源の水準と動向を判断した(図5、表2)。土佐沖は南部海域の主要漁場であるが、2012年に土佐沖の1そうびき沖底の操業隻数が1隻となり、2013年以降、2隻の操業となったものの、操業を再開した漁船の稼働状況が悪く、そこから算出される資源密度指数が資源状態を正しく反映していないと考えられるため、水準と動向の判断の情報には用いなかった(図4、表2)。

(2) 資源量指標値の推移

熊野灘における1そうびき沖底の資源密度指数(図5)は1980年の35から1990年代半ばまで上昇傾向にあり1997年には110となったが、1998年に減少に転じ2004年は49の極小値となった。その後急速に増大し2007年には1980年以降最高の129となった。2008年以降再び減少となり2011年には46まで減少した。2012年は79と増加したが、2017年は54となった。

(3) 資源の水準・動向

1980～2017年の熊野灘における1そうびき沖底の資源密度指数(図5、表2)の最大値(2007年、129)と最小値(1980年、35)の間を三等分して高位・中位・低位として水準を判断すると2017年は54で低位、動向は直近5年間(2013～2017年)の資源量指標値の推移から横ばいと判断した。

5. 2019年ABCの算定

(1) 資源評価のまとめ

熊野灘における1そうびき沖底の資源密度指数(図5)を資源量指標値とした。2017年の値が54であることから資源水準は低位、2013～2017年の推移から動向は横ばいと判断した。

(2) ABCの算定

資源水準及び資源量指標値の変動傾向に合わせて漁獲を行うことを管理方策とし、平成30年度ABC算定のための基本規則2-1)により、 $ABC_{limit} = \delta_1 \cdot Cave \cdot \gamma_1$ とした。 δ_1 は資源状態によって決まる係数、 $Cave$ は近年(2015～2017年)の系群全体の漁獲量の平均値、 $\gamma_1 = 1 + k(b/I)$ (k は係数、 b および I はそれぞれ資源量指標値の過去3年の傾きと平均値)である。 δ_1 は資源水準が低位であることから0.7とした。資源量指標値として熊野灘における1そうびき沖底の資源密度指数を用いた。 γ_1 は、 $k = 1.0$ (標準値)、 $b = -7.50$ 、 $I = 61.24$ から0.878と算出された。これらの数値を用いて計算すると、系群全体として近年(2015～2017年)の平均漁獲量が691トンであることから、 ABC_{limit} は424トンとなった。 ABC_{target} は ABC_{limit} に安全率 α (標準値0.8)を乗じ340トンとなった。

| 管理基準 | Target/ Limit | 2019年ABC (トン) | 漁獲割合 (%) | F値 |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|----|
| 0.7・Cave3-yr・0.878 | Target | 340 | — | — |
| | Limit | 424 | — | — |

Limit は、管理基準の下で許容される最大レベルの漁獲量である。Target は、資源変動の可能性やデータ誤差に起因する評価の不確実性を考慮し、管理基準の下でより安定的な資源の増大または維持が期待される漁獲量である。ABCtarget = α ABClimit とし、係数 α には標準値 0.8 を用いた。Cave3-yr は過去 3 年間（2015～2017 年）における平均漁獲量である。

(3) ABC の再評価

| | |
|--------------------|--------------------|
| 昨年度評価以降追加されたデータセット | 修正・更新された数値 |
| 2016年漁獲量・資源量指標値確定値 | 2016年漁獲量・資源量指標値の確定 |
| 2017年漁獲量・資源量指標値暫定値 | 2017年漁獲量・資源量指標値の追加 |

| 評価対象年 (当初・再評価) | 管理基準 | 資源量 | ABClimit (トン) | ABCtarget (トン) | 漁獲量 (トン) |
|-------------------|---------------------|-----|------------------|-------------------|-------------|
| 2017年(当初) | 1.0・Cave3-year・1.15 | — | 732 | 586 | |
| 2017年(2017年再評価) | 1.0・Cave3-year・1.15 | — | 732 | 586 | |
| 2017年(2018年再評価) | 1.0・Cave3-year・1.15 | — | 732 | 586 | 616 |
| 2018年(当初) | 0.7・Cave3-yr・1.016 | — | 486 | 389 | |
| 2018年(2018年再評価) | 0.7・Cave3-yr・1.016 | — | 486 | 389 | |

6. ABC 以外の管理方策

ニギス日本海系群(松倉・養松 2016)で記載されているように沖底はその漁法の性質上、小型魚の混獲が少なくない。混獲の軽減や防止について検討することも必要である。

7. 引用文献

- Fujita T., Inada T. and Ishito Y. (1993) Density, Biomass and Community Structure of Demersal Fishes off the Pacific Coast of Northeastern Japan. *J. Oceanogr.* **49**, 211-229.
- 羽生 功(1956) ニギス *Argentina semifasciata* KISHINOUE の年令及び成長に就て. *日水誌*, **21**, 991-999.
- 堀川博史・阪地英男(1996) 農林水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総合研究. 平成 7 年度報告. 底魚群集における大陸棚縁辺部成育場の役割の解明, 226-227.
- 堀川博史・通山正弘・玉井恭一・坂本久雄(1992) 農林水産系生態秩序の解明と最適制御に関する総合研究. 平成 3 年度報告, 環境傾度分析による底魚類の棲み場をめぐる種間相互作用の解明, 234-235.
- 片山知史・梨田一也(2010) ニギス耳石の年輪構造. *黒潮の資源海洋研究*, **11**, 85-88.
- 松倉隆一・養松郁子(2016) 平成 27(2015)年度ニギス日本海系群の資源評価. 平成 27 年度我が国周辺水域の漁業資源評価(魚種別系群別資源評価・TAC 種以外) 第 2 分冊. 水

産庁増殖推進部・国立研究開発法人 水産総合研究センター, 879-893.

梨田一也(2010) 土佐湾におけるニギス幼魚の耳石日周輪. 黒潮の資源海洋研究, **11**, 89-94.

梨田一也(2013) 土佐湾におけるニギス幼魚の発生時期と初期成長. 平成 25 年度日本水産学会春季大会講演要旨集, 49.

Nashida K., Sakaji H. and Honda H. (2007) Spawning seasons of adult and growth of 0-year-old deepsea smelt *Glossanodon semifasciatus* in Tosa Bay, Pacific coast of Shikoku. Bull. Jpn. Soc. Fish. Oceanogr., **71**, 270-278.



図1. ニギス太平洋系群の分布




図2. 年齢と成長の関係




図3. 海域別漁業種類別漁獲量




図4. 熊野灘と土佐沖における1そうびき沖底の有効漁獲努力量の経年変化




図5. 熊野灘における1そうびき沖底による資源密度指数の推移と水準

表 1. 海域別漁業種類別漁獲量 (トン)

| 年 | 1そうびき沖底 | | | | | | | 2そうびき沖底 | | | | | | 外海 小底 愛知 県 | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|-------|
| | 中部 | | | 南部 | | | | 南部 | | | | | | | |
| | 伊豆 沖 | 遠州 灘 | 熊野 灘 | 紀州 沖 | 紀伊水 道沖 | 土佐 沖 | 豊後水 道沖 | 紀伊水 道沖 | 土佐 沖 | 豊後水 道沖 | 北日 向灘 | 南日 向灘 | 薩南 海域 | | |
| 1980 | - | 318 | 294 | 81 | 25 | 153 | - | 20 | 50 | 42 | 6 | 3 | 3 | 1 | 996 |
| 1981 | 8 | 296 | 369 | 95 | 141 | 293 | 0 | 8 | 42 | 62 | 8 | 1 | - | - | 1,321 |
| 1982 | 2 | 289 | 347 | 79 | 110 | 387 | 0 | 10 | 29 | 61 | 29 | 1 | 0 | - | 1,344 |
| 1983 | 3 | 365 | 365 | 37 | 246 | 292 | 1 | 6 | 38 | 34 | 53 | 4 | 5 | - | 1,448 |
| 1984 | 2 | 480 | 431 | 13 | 114 | 373 | 1 | 0 | 16 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1,493 |
| 1985 | 9 | 297 | 470 | 8 | 82 | 228 | 1 | 2 | 8 | 26 | 29 | 1 | 2 | 15 | 1,178 |
| 1986 | 22 | 362 | 448 | 6 | 180 | 285 | 0 | 2 | 33 | 23 | 35 | 8 | 1 | 88 | 1,491 |
| 1987 | 13 | 282 | 483 | 9 | 300 | 417 | - | 1 | 36 | 9 | 21 | 1 | 0 | 139 | 1,712 |
| 1988 | 20 | 266 | 513 | 8 | 170 | 314 | - | 7 | 46 | 23 | 47 | 1 | 0 | 215 | 1,631 |
| 1989 | 60 | 205 | 595 | 11 | 92 | 351 | 0 | 2 | 112 | 22 | 20 | 1 | 1 | 168 | 1,639 |
| 1990 | 19 | 219 | 458 | 8 | 120 | 362 | - | 20 | 127 | 50 | 30 | 4 | 10 | 241 | 1,669 |
| 1991 | 14 | 195 | 522 | 2 | 109 | 470 | - | 11 | 125 | 52 | 17 | 13 | 10 | 256 | 1,796 |
| 1992 | 26 | 119 | 475 | - | 133 | 643 | - | 23 | 112 | 47 | 40 | 6 | 10 | 257 | 1,892 |
| 1993 | 20 | 119 | 396 | - | 84 | 412 | 0 | 14 | 66 | 46 | 28 | 8 | 7 | 247 | 1,447 |
| 1994 | 22 | 134 | 466 | - | 167 | 528 | - | 16 | 32 | 34 | 27 | 6 | 1 | 209 | 1,641 |
| 1995 | 25 | 105 | 276 | - | 73 | 560 | - | 6 | 49 | 62 | 46 | 10 | 4 | 319 | 1,535 |
| 1996 | 13 | 41 | 279 | - | 108 | 831 | - | 3 | 73 | 76 | 26 | 7 | 3 | 476 | 1,936 |
| 1997 | 3 | 42 | 326 | - | 237 | 587 | - | 0 | 53 | 45 | 35 | 27 | 6 | 616 | 1,977 |
| 1998 | 7 | 44 | 275 | - | 58 | 508 | - | - | 26 | 25 | 37 | 13 | 13 | 559 | 1,565 |
| 1999 | - | 22 | 263 | - | 57 | 438 | - | 16 | 59 | 36 | 54 | 19 | 2 | 350 | 1,316 |
| 2000 | 0 | 54 | 265 | - | 73 | 230 | - | 93 | 11 | 18 | 27 | 19 | 5 | 364 | 1,157 |
| 2001 | 3 | 65 | 224 | - | 37 | 256 | - | 100 | 117 | 12 | 18 | 14 | 4 | 270 | 1,119 |
| 2002 | 2 | 88 | 181 | - | 39 | 164 | - | 272 | 88 | 22 | 24 | 13 | 1 | 254 | 1,147 |
| 2003 | 3 | 64 | 227 | - | 10 | 186 | - | 100 | 3 | 31 | 40 | 15 | 2 | 153 | 833 |
| 2004 | 6 | 79 | 189 | - | 55 | 144 | - | 202 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 239 | 940 |
| 2005 | 5 | 128 | 289 | - | 24 | 179 | - | 16 | 7 | 9 | 7 | 1 | - | 224 | 888 |
| 2006 | 5 | 87 | 329 | - | 21 | 227 | - | - | 2 | 18 | 5 | 10 | 0 | 239 | 942 |
| 2007 | 0 | 123 | 295 | - | 33 | 295 | - | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | - | 187 | 953 |
| 2008 | 2 | 100 | 377 | 3 | 48 | 278 | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | 259 | 1,087 |
| 2009 | 1 | 96 | 343 | 1 | 113 | 221 | - | 7 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 221 | 1,016 |
| 2010 | 0 | 76 | 271 | - | 30 | 246 | - | 6 | 33 | 3 | 1 | 0 | - | 235 | 901 |
| 2011 | 3 | 70 | 119 | 0 | 20 | 158 | - | 8 | 72 | 4 | 4 | 1 | 0 | 172 | 631 |
| 2012 | 4 | 90 | 300 | - | 31 | 209 | - | 4 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 201 | 868 |
| 2013 | 4 | 60 | 204 | 1 | 1 | 121 | - | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | - | 185 | 599 |
| 2014 | 0 | 54 | 152 | - | 12 | 168 | - | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - | 195 | 593 |
| 2015 | 2 | 65 | 201 | - | 12 | 190 | - | 2 | 21 | 3 | - | - | - | 221 | 718 |
| 2016 | 6 | 60 | 181 | - | 11 | 255 | - | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | - | 199 | 739 |
| 2017 | 2 | 55 | 151 | - | 2 | 192 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 211 | 616 |


2017年の漁獲量は暫定値。

表 2. 熊野灘と土佐沖における 1 そうびき沖底の資源量指数等の統計値

| 年 | 熊野灘 | | | | | | 土佐沖 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | 着業 隻数 | 資源密 度指数 | 資源量 指数 | 有効漁獲 努力量 | 努力の 有効度 | 有漁漁 区数 | 着業 隻数 | 資源密 度指数 | 資源量 指数 | 有効漁獲 努力量 | 努力の 有効度 | 有漁漁 区数 |
| 1980 | 15 | 35 | 456 | 5,794 | 0.73 | 13 | 8 | 28 | 607 | 3,679 | 0.94 | 22 |
| 1981 | 15 | 49 | 777 | 5,574 | 0.59 | 16 | 8 | 51 | 1,221 | 4,482 | 1.24 | 24 |
| 1982 | 14 | 57 | 682 | 4,900 | 0.60 | 12 | 8 | 49 | 1,027 | 5,847 | 1.35 | 21 |
| 1983 | 14 | 55 | 712 | 5,266 | 0.57 | 13 | 8 | 58 | 1,266 | 3,349 | 0.73 | 22 |
| 1984 | 14 | 60 | 786 | 7,453 | 0.80 | 13 | 8 | 56 | 955 | 5,773 | 0.97 | 17 |
| 1985 | 14 | 54 | 703 | 8,695 | 0.80 | 13 | 6 | 37 | 697 | 6,218 | 1.45 | 19 |
| 1986 | 14 | 50 | 645 | 9,016 | 0.89 | 13 | 6 | 43 | 899 | 6,970 | 1.48 | 21 |
| 1987 | 14 | 61 | 788 | 7,972 | 0.73 | 13 | 6 | 64 | 1,353 | 6,471 | 1.4 | 21 |
| 1988 | 14 | 57 | 744 | 8,975 | 0.84 | 13 | 6 | 54 | 1,181 | 5,852 | 1.34 | 22 |
| 1989 | 14 | 81 | 1,048 | 7,382 | 0.71 | 13 | 6 | 62 | 1,117 | 5,647 | 1.29 | 18 |
| 1990 | 13 | 80 | 877 | 5,745 | 0.64 | 11 | 6 | 74 | 1,479 | 4,890 | 1.28 | 20 |
| 1991 | 12 | 108 | 1,293 | 4,847 | 0.58 | 12 | 6 | 109 | 1,959 | 4,319 | 1.15 | 18 |
| 1992 | 10 | 91 | 914 | 5,191 | 0.73 | 10 | 6 | 143 | 2,291 | 4,491 | 1.17 | 16 |
| 1993 | 8 | 83 | 908 | 4,803 | 0.76 | 11 | 5 | 96 | 1,722 | 4,302 | 1.44 | 18 |
| 1994 | 8 | 96 | 1,054 | 4,862 | 0.76 | 11 | 5 | 199 | 3,972 | 2,660 | 0.9 | 20 |
| 1995 | 7 | 90 | 632 | 3,055 | 0.63 | 7 | 5 | 186 | 3,159 | 3,012 | 0.97 | 17 |
| 1996 | 5 | 109 | 760 | 2,569 | 0.55 | 7 | 4 | 329 | 7,245 | 2,524 | 0.89 | 22 |
| 1997 | 4 | 110 | 767 | 2,970 | 0.64 | 7 | 5 | 196 | 3,919 | 2,997 | 1.3 | 20 |
| 1998 | 4 | 85 | 596 | 3,233 | 0.74 | 7 | 4 | 222 | 5,547 | 2,289 | 0.97 | 25 |
| 1999 | 5 | 64 | 891 | 4,133 | 0.81 | 14 | 4 | 153 | 3,207 | 2,870 | 1.28 | 21 |
| 2000 | 5 | 76 | 681 | 3,503 | 0.70 | 9 | 3 | 92 | 1,557 | 2,507 | 1.37 | 17 |
| 2001 | 4 | 72 | 723 | 3,097 | 0.82 | 10 | 3 | 123 | 2,216 | 2,080 | 1.38 | 18 |
| 2002 | 5 | 57 | 740 | 3,177 | 1.27 | 13 | 2 | 261 | 4,441 | 629 | 0.51 | 17 |
| 2003 | 5 | 59 | 709 | 3,836 | 0.67 | 12 | 2 | 85 | 1,363 | 2,178 | 1.63 | 16 |
| 2004 | 5 | 49 | 542 | 3,827 | 0.65 | 11 | 2 | 91 | 1,638 | 1,580 | 1.21 | 18 |
| 2005 | 5 | 80 | 882 | 3,606 | 0.61 | 11 | 2 | 109 | 1,853 | 1,641 | 1.31 | 17 |
| 2006 | 5 | 97 | 971 | 3,386 | 0.59 | 10 | 2 | 153 | 1,984 | 1,487 | 1.34 | 13 |
| 2007 | 5 | 129 | 1,163 | 2,284 | 0.50 | 9 | 2 | 186 | 3,542 | 1,584 | 1.26 | 19 |
| 2008 | 5 | 91 | 1,004 | 4,131 | 0.85 | 11 | 2 | 186 | 2,597 | 1,501 | 1.22 | 14 |
| 2009 | 5 | 95 | 1,432 | 3,590 | 0.81 | 15 | 2 | 149 | 2,241 | 1,480 | 1.26 | 15 |
| 2010 | 5 | 79 | 1,023 | 3,438 | 0.76 | 13 | 2 | 226 | 2,491 | 1,084 | 1.25 | 11 |
| 2011 | 5 | 46 | 637 | 2,612 | 0.65 | 14 | 2 | 174 | 1,739 | 910 | 1.05 | 10 |
| 2012 | 5 | 79 | 1,109 | 3,788 | 0.87 | 14 | 1 | 634 | 6,339 | 329 | 0.81 | 10 |
| 2013 | 5 | 51 | 669 | 3,962 | 1.00 | 13 | 2 | 253 | 3,037 | 479 | 0.98 | 12 |
| 2014 | 5 | 59 | 648 | 2,576 | 0.74 | 11 | 2 | 384 | 4,991 | 437 | 0.88 | 13 |
| 2015 | 5 | 69 | 964 | 2,920 | 0.79 | 14 | 2 | 260 | 3,645 | 729 | 1.43 | 14 |
| 2016 | 5 | 61 | 732 | 2,976 | 0.92 | 12 | 2 | 849 | 9,337 | 301 | 0.99 | 11 |
| 2017 | 5 | 54 | 754 | 2,809 | 0.73 | 14 | 2 | 662 | 7,949 | 290 | 0.73 | 12 |

2017 年の資源量指数等の統計値は暫定値。

補足資料1 資源評価の流れ



補足資料2 沖底漁獲成績報告書を用いた資源量指標値の算出方法

沖底漁獲成績報告書では、月別漁区（緯度経度 10 分柁目）別の漁獲量と網数が集計されている。これらより、月 i 漁区 j における CPUE (U) は次式で表される。

$$U_{i,j} = \frac{C_{i,j}}{X_{i,j}}$$

上式で C は漁獲量を、 X は努力量（網数）をそれぞれ示す。

集計単位（年または漁期など）における資源量指数 (P) は CPUE の合計として、次式で表される。

$$P = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J U_{i,j}$$

集計単位における有効漁獲努力量 (X') と漁獲量 (C)、資源量指数 (P) の関係は次式のよ
うに表される。

$$P = \frac{CJ}{X'} \quad \text{すなわち} \quad X' = \frac{CJ}{P}$$

上式で J は有漁漁区数であり、資源量指数 (P) を有漁漁区数 (J) で除したものが資源密
度指数 (kg/網) (D) である。

$$D = \frac{P}{J} = \frac{C}{X'}$$