


## 平成24年度 第2回 日本海海況予報

－ 別表の水産関係機関が検討し独立行政法人水産総合研究センター  
日本海区水産研究所がとりまとめた結果 －

### 今後の見通し(平成24年7月～9月)のポイント

- ・ 対馬暖流域の表面水温は、“やや高め”～“かなり高め”で経過する。
- ・ 対馬暖流域の50m深水温は、日本海西部及び北部とも“やや高め”で経過する。



### 2012年7月～9月の海況

- 能登半島西方の暖水域は、北東に移動して佐渡島西方に分布する。
- 佐渡島北東の暖水域は、やや北上して男鹿半島西方に分布する。
- 若狭湾沖、能登半島北方、男鹿半島西方及び津軽半島西方の暖水域は、消滅する。
- 隠岐諸島北西、能登半島西方に新たな暖水域が形成される。
- 島根沖、山陰・若狭沖、佐渡島沖、入道埼沖の冷水域の張り出しは、平年並みで経過する。

### 問い合わせ先

独立行政法人水産総合研究センター 日本海区水産研究所 業務推進部

担当：関根、中島

電話：025-228-0451、ファックス：025-224-0950

当資料のホームページ掲載先URL

<http://abchan.job.affrc.go.jp/>

<http://jsnfri.fra.affrc.go.jp/>

# 平成24年度 第2回 日本海海況予報

## 1. 今後の見通し (2012年7月～9月)

- (1) 能登半島西方の暖水域は、北東に移動して佐渡島西方に分布する。佐渡島北東の暖水域は、やや北上して男鹿半島西方に分布する。若狭湾沖、能登半島北方、男鹿半島西方及び津軽半島西方の暖水域は、消滅する。隠岐諸島北西、能登半島西方に新たな暖水域が形成される。
- (2) 島根沖、山陰・若狭沖、佐渡島沖、入道埼沖の冷水域の張り出しは、平年並みで経過する。
- (3) 対馬暖流域の表面水温は、“やや高め”～“かなり高め”で経過する。
- (4) 対馬暖流域の50m深水温は、日本海西部及び北部とも“やや高め”で経過する。

## 2. 経過 (2012年3月～5月)

- (1) 3月に隠岐諸島西方にみられた暖水域は、勢力をほぼ維持。3月に隠岐諸島北東にみられた暖水域は、徐々に東方に移動し5月には隠岐諸島東北東に分布。3月に能登半島西方にみられた暖水域は、北東に移動し4月に能登半島北方の暖水域と合体。3月に能登半島北方に見られた暖水域は、5月に弱体化。3月に男鹿半島南西にみられた暖水域は、勢力をほぼ維持。
- (2) 島根沖の冷水域は、3月・4月は規模・接岸状況とも平年並み。5月はやや大きく接岸状況は平年並み。山陰・若狭沖の冷水域は、3月・4月は規模・接岸状況とも平年並み。5月はやや大きく接岸状況は平年並み。佐渡島沖の冷水域は、3月～5月は規模・接岸状況とも平年並み。入道埼沖の冷水域は、3月は規模・接岸状況とも平年並み。4月は規模は平年並みでやや離岸。5月はやや小さく接岸状況は平年並み。
- (3) 対馬暖流域の表面水温  
3月は、沿岸域で“やや低め”～“かなり低め”、大和堆周辺の沖合域で“やや高め”～“かなり高め”である以外は概ね“平年並み”。4月は、能登半島以西の沿岸域で“やや高め”～“かなり高め”、能登半島北方で“はなはだ高め”である以外は概ね“平年並み”。5月は、佐渡島周辺域で“平年並み”以外は概ね“やや高め”～“かなり高め”で、山口沖、能登半島西方、男鹿半島西方で“はなはだ高め”。
- (4) 対馬暖流域の50m深水温は、3月は日本海西部及び北部ともに“平年並み”。

## 3. 現況 (2012年6月)

- (1) 暖水域は、若狭湾沖、能登半島西方、能登半島北方、佐渡島北東、男鹿半島西方、津軽半島西方に分布。
- (2) 島根沖の冷水域は、規模は平年並みでやや離岸。山陰・若狭沖、佐渡島沖の冷水域は、規模・接岸状況ともに平年並み。入道埼沖の冷水域は、やや小さく接岸状況は平年並み。
- (3) 対馬暖流域の表面水温は、島根半島西方、佐渡島～男鹿半島、渡島半島西方で“平年並み”以外は概ね“やや高め”～“かなり高め”、隠岐諸島北東、能登半島西岸、津軽半島沿岸、石狩湾西方で“はなはだ高め”。
- (4) 対馬暖流域の50m深水温は、日本海西部は“やや高め”、北部は“平年並み”。

(註) 引用符 (“ ”) で囲んで表した、平年比較の水温の高低の程度は以下のとおり

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| “はなはだ高め(低め)” | : 約20年以上に1回の出現確率である2℃程度の高さ(低さ) |
| “かなり高め(低め)”  | : 約10年に1回の出現確率である1.5℃程度の高さ(低さ) |
| “やや高め(低め)”   | : 約4年に1回の出現確率である1℃程度の高さ(低さ)    |
| “平年並み”       | : 約2年に1回の出現確率で、平年値±0.5℃程度の水温   |

## 参 画 機 関

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 水産研究本部 中央水産試験場	福井県水産試験場
地方独立行政法人 青森県産業技術センター 水産総合研究所	京都府農林水産技術センター 海洋センター
秋田県水産振興センター	兵庫県立農林水産技術総合センター 但馬水産技術センター
山形県水産試験場	鳥取県水産試験場
新潟県水産海洋研究所	島根県水産技術センター
富山県農林水産総合技術センター 水産研究所	山口県水産研究センター
石川県水産総合センター	社団法人漁業情報サービスセンター  (取りまとめ機関) 独立行政法人水産総合研究センター 日本海区水産研究所