

平成29年度資源評価報告書(ダイジェスト版)

[Top](#) > [資源評価](#) > [平成29年度資源評価](#) > [ダイジェスト版](#)

標準和名 ズワイガニ

学名 *Chionoecetes opilio*


系群名 日本海系群B海域（新潟県以北）

担当水研 日本海区水産研究所



生物学的特性

寿命： 10歳以上
成熟開始年齢： 最終脱皮年齢で雄11齢(5%)、12齢(20%)、13齢(100%)、雌11齢(100%)
産卵期・産卵場： 初産卵は夏～秋、経産卵は2～3月、初産では主分布域である水深200～500mのうち比較的水深の浅い限られた海域
食性： 底生生物を主体に甲殻類、魚類、イカ類、多毛類、貝類、棘皮動物など
捕食者： 小型個体はゲンゲ類、マダラなど




漁業の特徴

B海域(新潟県以北)では主に小型底びき網(小底)と刺網によって漁獲される。新潟県、山形県および秋田県において本種を漁獲しており、新潟県による漁獲が毎年8割程度を占めている。農林水産省令により、本海域の漁期は10月1日～翌年5月31日に定められている。漁獲対象は、雄では甲幅90mm以上(実質12齢と13齢)のカタガニとミズガニであり、雌では成熟脱皮後の11齢であり、クロコ(最終脱皮後1年以上)に加えアカコ(最終脱皮後1年未満)も漁獲されている。

漁獲の動向

漁獲量(暦年)には、1960年代に約1,000トン、1980年代に約800トンのピークがみられる。その後は減少し、1990年代以降は200～400トンで推移した。2016年の漁獲量(漁期年: 7～翌年6月)は242トンであった。







資源評価法

水準は、1978年以降の情報が得られる、沖底および小底の漁獲成績報告書から求めた雌雄の資源密度指数を合計した値の5年移動平均から判断した。動向は、1999年以降に日本海北部海域の水深200～500mで実施しているかご調査の採集結果から得られた現存量と各漁期の雌雄別漁獲尾数を用いて算出した漁期開始時点の漁獲対象資源量の合計値から判断した。これ以降、年の記述は断りが無い限り漁期年(7月～翌年6月)を示す。

資源状態



資源密度指数は1980年代前半にピークがあり、その後は低下して1990年代前半より上昇し、2000年以降は変動が大きい。資源量は1998年以降2,300～5,100トンで推移し、2010年は5,000トンを超えたが、2013年と2014年は2,500トンを下回った。その後は増加して2016年は3,300トンであった。近年、親魚量が減少傾向にあり、2016年は460トンであった。現状の漁獲圧は生物学的管理基準値のF0.1、F30%SPRより低い。水準は雌雄合計の資源密度指数を指標とし、資源量の推移と連動せず操業形態の変化に起因すると判断される近年の急増が起こる前の2009年までの最高値と0の間を3等分し、高位、中位、低位とした。2016年は8.3kgで高位、動向は直近5年間(2012～2016年)の資源量の推移から、横ばいと判断した。





管理方策

現状の漁獲圧は低く、親魚量を確保することで資源を維持することを管理目標とし、現状の漁獲圧の維持 ($F_{current}$)、適度な漁獲圧による漁獲 ($F_{0.1}$)、および親魚量の確保 (30%SPR) を目指す漁獲シナリオに基づき、2018年漁期ABCを算定した。親魚量の確保の面からは、雌のアカコ (最終脱皮後1年未満) の禁漁が望ましい。



漁獲シナリオ (管理基準)	Target /Limit	2018年 漁期ABC (雄, 雌) (トン)	漁獲割合 (雄, 雌) (%)	F値 (雄, 雌) (現状の F値からの 増減%)	2022年の 親魚量 (トン) (80%区間)	確率評価 (%)	
						2022年に 2017年親魚量を 維持	2022年に Blimitを 維持
現状の 漁獲圧の維持 ($F_{current}$)	Target	280 (218, 64)	9 (9, 9)	0.09 (0.09, 0.09) (-20%)	—	—	—
	Limit	350 (269, 79)	11 (11, 11)	0.11 (0.11, 0.12) (±0%)	—	—	—
適度な 漁獲圧による漁獲 ($F_{0.1}$)	Target	400 (305, 99)	12 (12, 14)	0.13 (0.13, 0.15) (+17%)	—	—	—
	Limit	500 (375, 121)	15 (15, 17)	0.17 (0.16, 0.19) (+46%)	—	—	—
親魚量の確保 ($F_{30\%SPR}$)	Target	500 (382, 117)	15 (15, 16)	0.17 (0.16, 0.18) (+47%)	—	—	—
	Limit	610 (468, 143)	19 (19, 20)	0.21 (0.20, 0.22) (+84%)	—	—	—

- 定義
- Limitは、各漁獲シナリオの下で許容される最大レベルのF値 (漁獲係数) による漁獲量、Targetは資源変動の可能性やデータ誤差に起因する評価の不確実性を考慮し、各漁獲シナリオの下でより安定的な資源の増大または維持が期待されるF値による漁獲量
 - $F_{target} = \alpha F_{limit}$ とし、 α には標準値0.8を用いた
 - $F_{current}$ は、2012～2016年漁期の漁獲係数の平均を示す
 - $F_{current}$ では雌雄別に推定されたF値を、 $F_{0.1}$ および $F_{30\%SPR}$ では雌雄別に加入量当たり漁獲量および加入量当たり親魚量から計算されたF値をそれぞれ使用した
 - 年は漁期年 (7～翌年6月)
 - 漁獲割合は、2018年漁期の漁獲量 / 2018年漁期当初の漁獲対象資源量
 - F値は雌雄の合計に対する値

コメント

- ABCの算定には、規則1-3)-(1)を用いた
- 再生産関係が不明であり、漁獲加入前の資源尾数が推定できないことから、将来予測は行っていない
- 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第3に記載されている本系群の中期的管理方針では、「資源の維持若しくは増大を基本方向として、安定的な漁獲量を継続できるよう管理を行うものとする」とされており、雌雄ともに現状の漁獲圧の維持により資源の維持が可能と考えられる
- 「現状の漁獲圧の維持」は雌雄合計のF値およびABCが最も低い管理基準であり、漁獲圧を高めることも可能であるが、「親魚量の確保」程度に抑えるべきである

資源評価のまとめ

- 資源水準は高位、動向は横ばい
- 2016年の資源量は3,300トン
- 現状の漁獲圧は雌雄ともに生物学的管理基準値と比較して十分低い

管理方策のまとめ

- 親魚量の確保を管理目標とした
- 現状の漁獲圧の維持、適度な漁獲圧による漁獲、および親魚量の確保を目指す漁獲シナリオに基づき、2018年漁期ABCを算定した
- 親魚量の確保のため、雌のアカコ (最終脱皮後1年未満) の禁漁が望ましい

