平成27年3月

平成26年度 我が国周辺水域の漁業資源評価
(魚種別系群別資源評価・TAC種)

第1分冊

正誤表

ズワイガニ太平洋北部系群

p.512 補足表3

誤	CW(mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	<u>1230</u>
	QCW	0.02	0.04	0.09	<u>1.17</u>	0.28	0.41	0.52	0.59	0.63	0.65	0.66	0.66
正	CW(mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	<u>120</u>
	QCW	0.02	0.04	0.09	<u>0.17</u>	0.28	0.41	0.52	0.59	0.63	0.65	0.66	0.66

p.512 補足表 5 雌の資源重量及び QCW/Q03(%)の数値

誤	全資源(千尾、トン)																	
	雄		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	尾数	Q03	7,150	8,239	9,971	9,524	7,322	11,385	13,948	13,908	19,263	21,956	37,691	25,430	17,490	20,636	17,854	
		QCW	6,395	10,804	7,183	5,261	9,155	9,401	11,243	14,003	28,005	27,325	29,281	19,571	16,987	22,210	20,151	
		QCW/Q03(%)	85.1	146.6	74.0	56.0	118.4	84.8	83.8	97.6	130.0	94.8	80.6	78.4	95.0	107.8	105.1	
	重量	Q03	981	1,103	1,625	2,600	968	1,770	2,046	1,615	2,043	2,559	5,569	4,284	2,418	2,497	2,096	
		QCW	597	689	925	1,289	604	1,006	1,161	1,029	1,477	2,074	3,159	2,366	1,452	1,531	1,436	
		QCW/Q03(%)	59.3	63.6	57.4	50.0	60.6	56.9	60.2	62.9	65.1	64.5	57.3	56.0	60.2	62.6	63.6	
	雌		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	尾数	Q03	7,380	7,607	12,366	5,846	5,945	12,036	12,278	13,331	16,420	26,226	20,375	12,197	16,052	18,260	13,750	
		QCW	7,627	8,616	10,398	3,735	7,326	9,681	10,101	13,129	24,077	25,561	18,346	12,177	16,517	18,318	15,038	
		QCW/Q03(%)	98.5	116.9	84.2	63.8	114.9	81.8	88.9	95.9	133.3	96.9	92.7	100.0	102.5	101.3	100.6	
	重量	Q03	<u>534</u>	<u>535</u>	<u>536</u>	<u>537</u>	<u>538</u>	<u>539</u>	<u>540</u>	<u>541</u>	<u>542</u>	<u>543</u>	<u>544</u>	<u>545</u>	<u>546</u>	<u>547</u>	<u>548</u>	
		QCW	474	530	898	434	365	814	813	841	1,039	1,538	1,295	714	985	1,088	851	
		QCW/Q03(%)	<u>64.0</u>	<u>61.3</u>	<u>58.6</u>	<u>56.4</u>	<u>69.3</u>	<u>61.1</u>	<u>66.4</u>	<u>66.0</u>	<u>73.9</u>	<u>72.2</u>	<u>66.6</u>	<u>74.8</u>	<u>69.6</u>	<u>69.0</u>	<u>72.8</u>	
	正	全資源(千尾、トン)																
		雄		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		尾数	Q03	7,150	8,239	9,971	9,524	7,322	11,385	13,948	13,908	19,263	21,956	37,691	25,430	17,490	20,636	17,854
		QCW	6,395	10,804	7,183	5,261	9,155	9,401	11,243	14,003	28,005	27,325	29,281	19,571	16,987	22,210	20,151	
		QCW/Q03(%)	85.1	146.6	74.0	56.0	118.4	84.8	83.8	97.6	130.0	94.8	80.6	78.4	95.0	107.8	105.1	
重量		Q03	981	1,103	1,625	2,600	968	1,770	2,046	1,615	2,043	2,559	5,569	4,284	2,418	2,497	2,096	
		QCW	597	689	925	1,289	604	1,006	1,161	1,029	1,477	2,074	3,159	2,366	1,452	1,531	1,436	
		QCW/Q03(%)	59.3	63.6	57.4	50.0	60.6	56.9	60.2	62.9	65.1	64.5	57.3	56.0	60.2	62.6	63.6	
雌			1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
尾数		Q03	7,380	7,607	12,366	5,846	5,945	12,036	12,278	13,331	16,420	26,226	20,375	12,197	16,052	18,260	13,750	
		QCW	7,627	8,616	10,398	3,735	7,326	9,681	10,101	13,129	24,077	25,561	18,346	12,177	16,517	18,318	15,038	
		QCW/Q03(%)	98.5	116.9	84.2	63.8	114.9	81.8	88.9	95.9	133.3	96.9	92.7	100.0	102.5	101.3	100.6	
重量		Q03	<u>730</u>	<u>860</u>	<u>1,536</u>	<u>766</u>	<u>498</u>	<u>1,333</u>	<u>1,297</u>	<u>1,257</u>	<u>1,256</u>	<u>2,094</u>	<u>1,967</u>	<u>965</u>	<u>1,420</u>	<u>1,620</u>	<u>1,096</u>	
		QCW	474	530	898	434	365	814	813	841	1,039	1,538	1,295	714	985	1,088	851	
		QCW/Q03(%)	<u>65.0</u>	<u>61.7</u>	<u>58.5</u>	<u>56.7</u>	<u>73.3</u>	<u>61.1</u>	<u>62.7</u>	<u>66.9</u>	<u>82.7</u>	<u>73.4</u>	<u>65.8</u>	<u>74.0</u>	<u>69.4</u>	<u>67.1</u>	<u>77.6</u>	

p.513 補足表 6 雄の重量の QCW/Q03(%)の小数点以下の表記

		漁獲対象資源(千尾、トン)															
雄		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
誤	尾数	Q03	1,624	2,197	3,308	6,163	2,135	2,699	3,415	2,312	3,539	3,578	9,688	9,438	3,820	3,707	3,509
		QCW	816	1,025	1,653	2,959	1,007	1,291	1,571	1,117	1,898	1,936	4,721	4,538	1,825	1,780	1,894
		QCW/Q03(%)	50.1	48.6	50.4	48.2	47.5	47.8	47.2	48.5	48.7	48.0	48.7	48.1	47.9	48.3	48.5
	重量	Q03	519	771	947	2,196	657	881	1,083	658	951	1,132	2,522	2,756	1,290	1,046	992
		QCW	260	357	469	1,043	307	417	489	315	506	600	1,220	1,313	608	498	537
		QCW/Q03(%)	<u>50</u>	<u>48</u>	<u>50</u>	<u>48</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>48</u>
	雌		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	尾数	Q03	2,902	4,760	8,163	4,299	2,308	5,398	7,105	5,706	4,630	4,996	7,124	2,795	6,864	5,688	3,957
		QCW	1,556	2,559	4,457	2,350	1,239	2,979	3,908	3,239	2,876	2,749	4,017	1,574	3,940	3,143	2,375
	QCW/Q03(%)	54.3	54.0	54.6	54.5	53.5	57.6	59.9	57.0	55.7	57.6	56.6	58.1	57.9	55.9	57.3	
重量	Q03	446	744	1,237	641	360	748	971	777	665	723	1,002	383	888	803	536	
	QCW	236	394	667	346	191	410	531	434	407	392	557	213	498	437	319	
	QCW/Q03(%)	53.4	52.8	53.9	53.9	52.8	55.3	57.1	55.9	54.5	54.7	55.5	56.4	56.4	55.0	56.1	
正	漁獲対象資源(千尾、トン)																
	雄		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	尾数	Q03	1,624	2,197	3,308	6,163	2,135	2,699	3,415	2,312	3,539	3,578	9,688	9,438	3,820	3,707	3,509
		QCW	816	1,025	1,653	2,959	1,007	1,291	1,571	1,117	1,898	1,936	4,721	4,538	1,825	1,780	1,894
		QCW/Q03(%)	50.1	48.6	50.4	48.2	47.5	47.8	47.2	48.5	48.7	48.0	48.7	48.1	47.9	48.3	48.5
	重量	Q03	519	771	947	2,196	657	881	1,083	658	951	1,132	2,522	2,756	1,290	1,046	992
		QCW	260	357	469	1,043	307	417	489	315	506	600	1,220	1,313	608	498	537
		QCW/Q03(%)	<u>49.8</u>	<u>47.9</u>	<u>50.0</u>	<u>47.7</u>	<u>47.0</u>	<u>47.3</u>	<u>46.6</u>	<u>48.0</u>	<u>48.1</u>	<u>48.3</u>	<u>48.4</u>	<u>47.7</u>	<u>47.2</u>	<u>47.8</u>	<u>48.0</u>
	雌		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
尾数	Q03	2,902	4,760	8,163	4,299	2,308	5,398	7,105	5,706	4,630	4,996	7,124	2,795	6,864	5,688	3,957	
	QCW	1,556	2,559	4,457	2,350	1,239	2,979	3,908	3,239	2,876	2,749	4,017	1,574	3,940	3,143	2,375	
	QCW/Q03(%)	54.3	54.0	54.6	54.5	53.5	57.6	59.9	57.0	55.7	57.6	56.6	58.1	57.9	55.9	57.3	
重量	Q03	446	744	1,237	641	360	748	971	777	665	723	1,002	383	888	803	536	
	QCW	236	394	667	346	191	410	531	434	407	392	557	213	498	437	319	
	QCW/Q03(%)	53.4	52.8	53.9	53.9	52.8	55.3	57.1	55.9	54.5	54.7	55.5	56.4	56.4	55.0	56.1	

補足表 3 修正シート

補足表 3. 推定式より求めた甲幅別採集効率

CW(mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
QCW	0.02	0.04	0.09	0.17	0.28	0.41	0.52	0.59	0.63	0.65	0.66	0.66

補足表 5 修正シート

補足表 5. 採集効率別のズワイガニ全体の推定資源量

全資源(千尾、トン)

雄		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
尾数	Q03	7,150	8,239	9,971	9,524	7,322	11,385	13,948	13,908	19,263	21,956	37,691	25,430	17,490	20,636	17,854
	QCW	6,395	10,804	7,183	5,261	9,155	9,401	11,243	14,003	28,005	27,325	29,281	19,571	16,987	22,210	20,151
	QCW/Q03(%)	85.1	146.6	74.0	56.0	118.4	84.8	83.8	97.6	130.0	94.8	80.6	78.4	95.0	107.8	105.1
重量	Q03	981	1,103	1,625	2,600	968	1,770	2,046	1,615	2,043	2,559	5,569	4,284	2,418	2,497	2,096
	QCW	597	689	925	1,289	604	1,006	1,161	1,029	1,477	2,074	3,159	2,366	1,452	1,531	1,436
	QCW/Q03(%)	59.3	63.6	57.4	50.0	60.6	56.9	60.2	62.9	65.1	64.5	57.3	56.0	60.2	62.6	63.6
雌		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
尾数	Q03	7,380	7,607	12,366	5,846	5,945	12,036	12,278	13,331	16,420	26,226	20,375	12,197	16,052	18,260	13,750
	QCW	7,627	8,616	10,398	3,735	7,326	9,681	10,101	13,129	24,077	25,561	18,346	12,177	16,517	18,318	15,038
	QCW/Q03(%)	98.5	116.9	84.2	63.8	114.9	81.8	88.9	95.9	133.3	96.9	92.7	100.0	102.5	101.3	100.6
重量	Q03	730	860	1,536	766	498	1,333	1,297	1,257	1,256	2,094	1,967	965	1,420	1,620	1,096
	QCW	474	530	898	434	365	814	813	841	1,039	1,538	1,295	714	985	1,088	851
	QCW/Q03(%)	65.0	61.7	58.5	56.7	73.3	61.1	62.7	66.9	82.7	73.4	65.8	74.0	69.4	67.1	77.6

補足表 6 修正シート

補足表 6. 採集効率別のズワイガニ漁獲対象資源量

漁獲対象資源(千尾、トン)

雄		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
尾数	Q03	1,624	2,197	3,308	6,163	2,135	2,699	3,415	2,312	3,539	3,578	9,688	9,438	3,820	3,707	3,509
	QCW	816	1,025	1,653	2,959	1,007	1,291	1,571	1,117	1,898	1,936	4,721	4,538	1,825	1,780	1,894
	QCW/Q03(%)	50.1	48.6	50.4	48.2	47.5	47.8	47.2	48.5	48.7	48.0	48.7	48.1	47.9	48.3	48.5
重量	Q03	519	771	947	2,196	657	881	1,083	658	951	1,132	2,522	2,756	1,290	1,046	992
	QCW	260	357	469	1,043	307	417	489	315	506	600	1,220	1,313	608	498	537
	QCW/Q03(%)	49.8	47.9	50.0	47.7	47.0	47.3	46.6	48.0	48.1	48.3	48.4	47.7	47.2	47.8	48.0
雌		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
尾数	Q03	2,902	4,760	8,163	4,299	2,308	5,398	7,105	5,706	4,630	4,996	7,124	2,795	6,864	5,688	3,957
	QCW	1,556	2,559	4,457	2,350	1,239	2,979	3,908	3,239	2,876	2,749	4,017	1,574	3,940	3,143	2,375
	QCW/Q03(%)	54.3	54.0	54.6	54.5	53.5	57.6	59.9	57.0	55.7	57.6	56.6	58.1	57.9	55.9	57.3
重量	Q03	446	744	1,237	641	360	748	971	777	665	723	1,002	383	888	803	536
	QCW	236	394	667	346	191	410	531	434	407	392	557	213	498	437	319
	QCW/Q03(%)	53.4	52.8	53.9	53.9	52.8	55.3	57.1	55.9	54.5	54.7	55.5	56.4	56.4	55.0	56.1

平成 26 (2014) 年度ズワイガニ太平洋北部系群の資源評価

責任担当水研:東北区水産研究所(伊藤正木、服部 努、成松庸二、柴田泰宙、永尾次郎)

参画機関:青森県産業技術センター水産総合研究所、岩手県水産技術センター、宮城県水産技術総合センター、福島県水産試験場、茨城県水産試験場

要 約

1996 年以降、毎年、本系群の 7 割以上は福島県で水揚げされていた。しかし、2011 年 3 月の東日本大震災以降、福島県の操業が休止している。2012 年からは福島県漁船による試験操業が行われているが、本系群の漁獲量は極めて少ない状況である。

本系群の資源量については、着底トロールによる調査を行い、面積密度法により資源量を計算した。2013 年漁獲対象資源の雌雄合計尾数は 1,764 千尾(対 2012 年比 47%)と半減し、重量では 381 トンで過去最低値となった。雄の漁獲対象資源は 953 千尾、269 トンと推定され、2012 年の 3,101 千尾、1,056 トンから尾数、重量ともに大きく減少した。雌は 811 千尾、111 トンと 2012 年に 624 千尾、84 トンから若干増加した。

1997 年以降のトロール調査による資源量推定値の推移から、2013 年の雌雄合計の漁獲対象資源の水準は低位と判断した。また、過去 5 年間(2009~2013 年)の資源量推定値の推移から、資源動向は減少と判断した。

資源水準・動向が低位・減少、漁期後の雌資源量(SSB)も過去最低レベルに低下し、今後の加入も良くない可能性があることから、漁獲シナリオを、現状の漁獲圧の維持(震災後の試験操業を含む漁獲圧)及び親魚量の増大とし、2015 年 ABC を算定した。

漁獲シナリオ (管理基準)	F 値(雄,雌) (Fcurrent との 比較)	漁獲 割合 (雄,雌)	将来漁獲量		評価		2015 年 漁期 ABC (雄,雌)
			5 年後 (雄,雌)	5 年 平均 (雄,雌)	平均 SSB 以 上を維持 (5 年後)	Blimit を 維持 (5 年後)	
現状の漁獲圧の維持 (Fcurrent) *	0.012 (0.003,0.035) (Fcurrent)	1.2 (0.3,3.3) %	10-16 (2,8-14) トン	13 (2,11) トン	32%	100%	8.0 (1.3,6.7) トン
現状の漁獲圧の維持 の予防的措置 (0.8Fcurrent) *	0.010 (0.002,0.028) (0.8Fcurrent)	0.9 (0.2,2.6) %	8-13 (1-2,7-11) トン	11 (2,9) トン	37%	100%	6.4 (1.0,5.4) トン
親魚量の増大 (0.17Fave 3-yr)*	0.031 (0.029,0.034) (2.6Fcurrent)	2.9 (2.8,3.2) %	24-36 (16-23,8-13) トン	31 (20,11) トン	35%	100%	20.1 (13.6,6.5) トン
親魚量の増大の予防 的措置(0.8・0.17Fave 3-yr) *	0.025 (0.024,0.027) (2.1Fcurrent)	2.3 (2.2,2.6) %	19-30 (13-19,6-11) トン	25 (16,9) トン	39%	100%	16.1 (10.9,5.2) トン
コメント ・本系群の ABC 算定には、規則 1-3)-(3)を用いた。 ・主漁場における漁獲が行われていないにも関わらず漁獲対象資源は大きく減少し、トロール調査結果から推定可能な 2016 年までの加入量も少ない。 ・SSB も過去最低レベルになっているため、SSB を現状より下げないことが重要。 ・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第 3 に記載されている本系群の中期的管理方針では、「資源の維持若しくは増大を基本方向として、安定的な漁獲量を継続できるよう、管理を行うものとする」とされており、現状の漁獲圧の維持、親魚量の増大のシナリオともに Blimit を下回ることはなく、SSB は増加すると考えられる。同方針に合致する漁獲シナリオには*を付した。 ・原発事故の影響による操業休止から、2011 年漁期以降の漁獲は僅かである。							

- ・2015 年漁期は 2015 年 12 月～2016 年 3 月
- ・ABC 算定年の漁期当初資源量を推定する際、2014 年漁獲量は、福島県沖底船が 2012 年及び 2013 年と同様の試験操業を行うとして、試験操業の水揚量を含めた 2012 年と 2013 年全県漁獲量の平均とした。
- ・漁獲割合は 2015 年漁期当初の漁獲対象資源量に対する漁獲量(ABC)の割合である。将来漁獲量は 1,000 回のシミュレーション後の 2019 年の漁獲量を 80%区間で表示、5 年平均には 2019 年の平均値を示した。
- ・評価は、1,000 回のシミュレーション後、2019 年漁期後の親魚量が 2002～2010 年（2008 年を除く）の SSB の平均値 275 トンと最小値 63 トン(Blimit)を下回らない割合を示した。
- ・将来予測において仮定する加入量は、資源が減少し、今後加入が低い水準で推移する可能性があることから、低水準になっている 2014～2016 年の値を用いた。
- ・Fcurrent は福島県の試験操業による漁獲量を加えた青森県～茨城県の合計漁獲量から得られた 2012 年及び 2013 年漁期の F の平均とした。
- ・管理基準値の Fave 3-yr は、東日本大震災（以下、「震災」という）及び福島第一原発事故（以下、「原発事故」という）による操業休止により、2011 年漁期以降は漁獲が殆どないため、震災前の平均的な数値として、資源量の過小推定の可能性がある 2008 年を除いた 2006～2009 年の平均とした。

年	資源量 (トン)		漁獲量 (トン)		F値		漁獲割合
2012	雄	1,056	雄	1.3	雄	0.001	0.1%
	雌	84	雌	4.3	雌	0.06	5.1%
	計	1,140	計	5.6	雌雄	0.005	0.5%
2013	雄	269	雄	1.1	雄	0.004	0.4%
	雌	111	雌	1.5	雌	0.015	1.4%
	計	381	計	2.6	雌雄	0.007	0.7%
2014	雄	394	雄		雄		
	雌	164	雌		雌		
	計	558	計		雌雄		

各年の資源量は漁期初めの漁獲対象資源量を示し、2012年、2013年は各年10月のトロール調査結果から得られた値、2014年は2013年資源量からの予測値。
 漁獲量は漁期年(12月～翌年3月)で集計。2012年以降の大部分は福島県船の試験操業による値。

水準：低位 動向：減少

	指 標	値	設 定 理 由
Bban	未設定		
Blimit	漁期後の雌漁獲対象資源量	1997～2010年(2008年を除く)の最低水準(63トン)	過去の漁期後の雌漁獲対象資源量の変動幅に収まる。
2013年	親魚量(漁期後の雌漁獲対象資源量)	1997～2010年の最低水準(63トン)以上(81トン)	

本件資源評価に使用したデータセットは以下のとおり

データセット	基礎情報、関係調査等
2013年資源量	2013年トロール調査(水研セ)
2014、2015年加入量	2013年トロール調査(水研セ)
自然死亡係数(M) (年当たり)	最終脱皮後1年以上経過した個体 M=0.2 未最終脱皮及び最終脱皮後1年未満 M=0.35を仮定
漁獲量	県別漁法別水揚量(青森～茨城(5)県)
漁獲努力量、CPUE 資源密度指数	沖合底びき網漁獲成績報告書(水研セ)、標本船データ(福島県)

1. まえがき

太平洋北部海域（北海道を除く、以下同じ）では、ズワイガニは主に沖合底びき網漁業（以下、「沖底」という）により漁獲されている。1996年に農林水産省令に基づき規制が導入され、操業期間は12月10日から翌年3月31日、雄では甲幅80mm未満、雌では外仔を持たない未成熟ガニの漁獲は周年禁止されている。規制の導入とあわせてTAC対象種となった。本報告では以後、ズワイガニの漁業に関する記述について12月～翌年3月の漁期を12月の属する年として表示する。

2011年3月の東日本大震災により福島県の漁業が休止する前の1995～2010年の漁獲量は107～353トンで、日本海やオホーツク海に比べて少ないものの、福島県では重要な水産資源の1つである。同県沖底の漁獲量は太平洋北部海域で漁獲されるズワイガニの65～99%を占めており、同県ではズワイガニの多い場所での漁期外の操業や稚ガニが多数生息する場所での操業の自粛、1隻1航海当たり水揚量の制限、操業期間の短縮などの規制措置を漁業者自らが講じている。

2. 生態

(1) 分布・回遊

太平洋北部海域においては、青森県～茨城県沖合の水深150～750mにズワイガニが分布することが確認されており、宮城～福島県沖で分布密度が高い（図1、2、北川ほか1997a；1997b、北川2000、服部ほか1998、1999）。

漁獲可能なサイズ（雄：甲幅80mm以上）は水深400～500mに多い傾向があり（北川2000）、この水深帯が主漁場と考えられる。オホーツク海沿岸の漁場水深帯の150～250m（土門1965）や日本海西部海域の漁場水深帯の200～400m（伊藤1956、金丸1990）に比較して深い。調査船調査によって採集された本種の水深別甲幅組成から、甲幅40mm以下の稚ガニは水深400m以浅の海域に広く生息し、成長とともに次第に深所へ移動していくと推定されている（北川2000）。本海域における生活史、季節的な深浅移動や南北方向の移動については明らかではない。

(2) 年齢・成長

本系群の年齢・寿命は不明である。

齢期は脱皮回数で数えた脱皮齢であるため実際の年齢とは一致しない。甲幅20mm程度（第6齢期未満）までは1年間に複数回の脱皮を行い、以降は毎年1回脱皮する（桑原ほか1995）。

(3) 成熟・産卵

① 甲幅別成熟割合

日本海における知見（今ほか1968、山崎1991、山崎ほか1992）では第11齢期で成熟を開始する（図3）。太平洋北部海域において最終脱皮後の個体の割合が50%となるズワイガニの甲幅は、雄で78.6mm、雌で65.8mmである。最終脱皮後の雄のサイズは日本海のものよりも小さいが、雌の成熟サイズは日本海とほぼ同程度である（北川2000）。

年齢が不明であるため、年齢別成熟割合は算出できないが、2013年10～11月のトロー

ル調査によって得られた甲幅別の最終脱皮個体の成熟個体の割合を図4に示す。

これを見ると雄では甲幅 60mm 未満でも最終脱皮後の成熟個体が僅かに見られるが、最終脱皮個体の割合が 50%以上となるのは甲幅 76mm 以上で、甲幅 100mm 以上ではほとんどが最終脱皮後の個体である。太平洋北部系群では、日本海に比べ大型の雄個体が少ないが、これは成長速度の違いによるものではなく、すべての個体が最終脱皮を終える甲幅が日本海よりも小さいことによると考えられる（上田ほか 2007）。

雌では甲幅 60mm ぐらいから最終脱皮後の成熟個体の割合が高くなり、65mm でほぼ半数が成熟し、76mm 以上はほとんどが成熟個体である。

②産卵場・生態

産卵場についての詳細は不明であるが、調査標本の測定等の結果では、ふ化が近い外仔を有する個体は冬～春に多い。

索餌期は周年で、索餌場所は水深 150～750m である。

(4) 被捕食関係

東北海域での食性は不明であるが、日本海では底生生物を主体に、甲殻類、魚類、イカ類、多毛類、貝類、棘皮動物など多様な食性であることが報告されている（尾形 1974）。

未熟な小型個体はマダラ、ゲンゲ類、カレイ類、ヒトデなどに捕食される。

3. 漁業の状況

(1) 漁業の概要

太平洋北部海域では、青森県～茨城県において沖底により漁獲されている（図5）。青森県沖ではかけまわし漁法、岩手県沖ではかけまわし漁法及び2そうびき漁法、宮城県以南ではオッターロール漁法が用いられている。福島県では 1975～1980 年頃からズワイガニを漁獲するようになり、太平洋北部海域における漁獲の大半は福島県漁船によるものである（表1）。しかしながら、本種を選択的に漁獲する専業船は少なく、他の多くの魚種とともに漁獲対象の一つとして扱われている。

水揚の中心となる福島県相馬港では、沖底船の1隻1日当たりの水揚量制限や、休漁日を設定している。また、茨城県でも12月の漁獲禁止など自主規制を行っている。

2011年3月以降は、震災と原発事故により、福島県の漁業は休止しており、2012年11月以降は部分的に試験操業が行われるのみとなっている。

(2) 漁獲量の推移

福島県相馬港における水揚については、雌雄及び雌の成熟・未熟を区別した集計が1985年以降行われている。相馬港以外では、カニ類として扱われるなど漁獲統計資料が十分に整備されておらず、青森県～茨城県の漁獲量が把握できているのは1996年以降である。

1985年以降のズワイガニ漁獲量の推移を図6に、1992年以降の県別漁獲量を表1に示す。

福島県の水揚量は1985年の110トンから1987年には225トンに増加した。1989年に71トンに減少し、1993年まで70～100トンで推移した。1995年に最高の324トンに達した後、2000年には104トンに減少した。その後、増減しつつ緩やかに増加し、2008年には213

トンとなったが 2010 年は再び減少し 155 トンとなった。2011 年は原発事故により、福島県漁船は操業を休止したため漁獲はなかった。2012 年 11 月から福島県漁船の試験操業が開始され、2012 年は 4.6 トン、2013 年は 1.5 トンの漁獲があった。

県別に見ると、1996～1998 年は福島県に次いで宮城県の漁獲が多く、19～72 トンの漁獲があったが、以後一部の年を除き数トン程度である。青森県でも 1995 年、1996 年は 20～30 トンの漁獲があったが 2001 年以降の漁獲は 1 トンに満たない。岩手県の漁獲は 0.1～1.3 トンと少なく、茨城県は 2003 年以降の漁獲が 3～90 トンで、増減がはっきりしている（図 6、表 1）。

全県漁獲量は 1995 年に 353 トンに達した後減少し、2000 年に 107 トンとなった。その後再び増加して、2003 年は茨城県の増加により 279 トンになった。2004 年は 132 トンと半減し、2005 年も 122 トンと減少した。2006～2008 年は増加傾向であったが、2009 年は若干減少して全体で 219 トン、2010 年は 160 トンと 2009 年より 20%程度減少した。2006 年以降は 3 月の漁獲量が各年の漁獲量の 17～28%を占めていたことから、2010 年の漁獲量減少の要因は、震災による 2011 年 3 月 11 日以降の操業休止が大きいと考えられる。

2011 年は、前述のように漁獲量の大半を占める福島県漁船の操業休止が継続されたため、漁獲は 1 トンに満たなかった。2012 漁期は福島県沖底漁船による試験操業が実施され、これを合わせた全県漁獲量は 5.6 トンであった。2013 年は 2.6 トンに半減したが、これは福島沖での漁獲が少なかったことによる。

なお、震災以前における当海域でのズワイガニの漁獲は、価格動向や他の魚種の漁獲状況などにより影響を受けており、漁獲量の変動が直接に資源の変動を示すものではない。

この海域での漁獲の大半が水揚される福島県相馬港における水揚量の雌雄比について表 2 に示す。これによると、雄雌でほぼ同じ程度の漁獲重量となっている。漁獲重量ではほぼ同量であるが、雌の漁獲対象サイズの平均体重は雄の 20～50%程度であることから、個体数では、雌は雄の 2～5 倍多く漁獲されていると見積もられる。

(3) 漁獲努力量

本系群を漁獲する主な漁法は沖底であり、そのほとんどが福島県漁船によるものである。沖底の漁獲成績報告書（以下、「漁績」という）を用いて福島県漁船のズワイガニ有漁全漁区（福島県漁船が漁期中にズワイガニを漁獲したすべての漁区）及びズワイガニ主漁場（1996～2008 年の 13 年間うち漁期中のズワイガニ漁獲実績が 10 年以上ある漁区）におけるズワイガニ有漁網数（ズワイガニが漁獲された日の曳網数）を図 7 に示す。

2011 年 3 月の震災以降、福島県では操業が休止され、2012 年 11 月以降は試験操業が行われているが、その努力量は震災前の 3%程度であることから図 7 では 2009 年までの数値を示した。

漁績は 1 日単位で記載されるため、ズワイガニを漁獲した曳網のみを分離して集計することができない。聞き取り情報によると 1 日のすべての曳網でズワイガニを漁獲しているわけではないため、漁績データを集計して得られたズワイガニ有漁曳網数は、実際にズワイガニを漁獲した曳網数より多くなっていると考えられる。そこで、ズワイガニが漁獲された操業日について、ズワイガニ有漁網数を 1 日当たり 1 回とした場合を努力量の下限、漁績に記録された曳網回数を上限とした。

ズワイガニが漁獲された全漁区における漁期中の網数の合計は、2002年まで上限値では1,800~2,500回前後でほぼ横ばい状態で推移し、2003年は3,700回に増加した。しかし2005年には1,600回と半減、2006年以降は再び増加し、2009年は4,100回であった（2004年以降の数値は、未提出の漁績があるため県別月別の提出率で引き延ばした値）。

ズワイガニ主漁場における網数も、2000年までは上限800回前後で比較的安定していた。2001年以降は700~1,300回とやや変動が大きい。有漁全漁区、主漁場とも2002年以降は網数の変動が大きい、1996年以降、主漁場での長期的な傾向としてはほぼ横ばい状態である（図7）。

沖底漁績のほか、標本数は7~10隻と多くないが、福島県沖底の標本船により、2001年以降の操業毎の漁獲状況等が得られている。これによると2001年以降でズワイガニを漁獲した沖底標本船は2~4隻であった。これらが漁期中にズワイガニを漁獲した曳網回数と累積曳網時間から求めた1網当たりの平均曳網時間を表3に示す。2001~2003年は2.2~2.6時間と曳網時間は2時間を超えたが、2004年以降は1.6~1.9と1時間台に減少しており、震災以前にズワイガニに対する努力量は減少していたと考えられる。

4. 資源の状態

(1) 資源評価の方法

資源評価は、トロール調査結果と漁獲・水揚量調査結果を用いて、補足資料1に示したフローに沿って行った。

2013年10~11月に太平洋北部海域全域で着底トロール網による底魚類資源量調査を実施し（水深150~900m、計113地点、うちズワイガニ採集点は65点、補足資料2参照）、海域を南北方向で4分割してそれぞれ50~100m幅の水深帯別に層化し、面積密度法により資源量を推定した。

資源量推定の際、雌雄別に最終脱皮の前と後に分類し、雄についてはさらに甲幅80mm以上と未満に分けて集計して、2013年の甲幅別資源量を計算した。この結果から2014年以降の加入量を推定して、2015年までの資源動向を予測した。資源量計算の詳細については補足資料3に示した。

動向予測に用いた雌雄別の漁獲量は、福島県の雌雄別水揚量から求めた雌雄比で全体の漁獲量を配分して求めた。なお、2014年の予想漁獲量は、2012年及び2013年の全県漁獲量を、福島県沖底漁船による試験操業で得られた雌雄別漁獲量の比を用いて求めた雌雄別漁獲量の平均とした。

底魚類資源量調査は1996年から実施しているが、2002年以降は資源量推定精度向上のために調査点数の増加や配置の変更を行い、2004年から現在の調査点数・配置となっている。資源量推定に当たって、1997~2003年のデータについては対象海域の南北方向を4区分、水深を100m毎の水深帯に8区分し、合計32層で資源量を計算した。2004年以降は、南北方向の4区分に加えズワイガニの主分布水深帯である200~500mを水深幅50mに区分し、合計48層で計算を行っている。

今年度の資源量計算時に、宮城県以南における南北の境界線が、若干南側にずれた状態で面積計算されていたことを確認した。このため、境界を正しい位置に戻して面積を再計算し、各年の資源量推定値を修正した。これにより各年の資源量推定値に若干増減が生じ

たが、資源水準及び動向の判断には殆ど影響はない（補足資料4参照）。

なお、2012年の調査では海況が悪く、荒天待機を余儀なくされ、調査を実施できたのは101点と予定調査点の60%程度であった。特に、金華山以南の海域では、調査点が1点しかない層があったため、1点/層となる層については隣接する水深帯と統合して計算を行い、資源量を推定した。

トロール網のズワイガニ採集効率（網を曳いた場所にいたズワイガニの何割が網に入るのかを示す係数）には、補足資料5に示した方法で行った採集効率調査により得られたデータを用い、以下に示す関係式(1)により求めた。

$$Q=0.664/(1+\exp(-(-4.276+0.079*CW))) \quad (1)$$

ここでQは採集効率、CWは甲幅(mm)を示す。

(2) 資源量指標値の推移

前述のように2010年終盤の2011年3月11日以降は、震災と原発事故により、本系群を対象とする漁業が殆ど行われておらず、資源量の指標として利用可能な漁業データが得られていない。したがって、ここでは2009年までのデータによる資源量指標値を示す。

沖底のうち、本種を漁獲する主要漁業であるオッタートロールの漁期(12月～翌年3月)について漁績データから求めたズワイガニ主漁場におけるCPUE(kg/網)の経年変化を図8に、資源量指数の経年変化を図9に示す。

資源量指数は漁期における漁区毎のCPUEに漁区の面積を乗じたものを合算した数値で、以下の式により示される。

$$P = \sum_i A_i \frac{C_i}{X_i}$$

ここでPは資源量指数、 A_i は漁区*i*の面積、 C_i は漁区*i*の漁獲量、 X_i は漁区*i*の操業網数を示す。各漁区の面積(A_i)はほぼ等しいので $A_i=1$ として計算を行った。

本系群では、聞き取り情報などから漁場形成状況と価格や需要の動向、他の魚種の漁況により、ズワイガニ対象の操業と他の魚種対象の操業を切り替えて行っていると考えられる。また、漁業者によるとズワイガニは日没後によく漁獲されるため、夜間にズワイガニ狙いの操業を行うことが多いという。このため、1日の操業においてもズワイガニ狙いによる操業と他の魚種を対象にした操業が混在する。

CPUE等の検討の際、狙い操業と混獲を区別する必要があるが、操業漁区や努力量の情報が得られる唯一の統計資料である沖底漁績では、操業状況や漁獲は1日毎にまとめられ、狙い操業と混獲の区別は困難である。そこで混獲による影響を小さくするため、ズワイガニ漁期中の福島県沖底漁船による操業のうち、主漁場(1996～2008年の13年間でズワイガニ漁獲実績が10年以上ある漁区)について集計を行った。

沖底漁績に基づく主漁場のCPUEは、1996～1998年の59～68kg/網から減少し、2002年以降は30～40kg/網とほぼ横ばいで推移している(図8)。

主漁場における資源量指数は、1997年に350と最も高い値を示した後は1999年に199に減少し、その後は増減しつつ横ばいで推移している（図9）。

福島県の標本船のうち、ズワイガニを漁獲している操業データを用いて、操業毎のズワイガニの漁獲量と曳網時間から曳網1時間当たりの漁獲量を求めた。この海域でズワイガニを漁獲する際には、ある程度狙った操業が行われることから、ズワイガニを漁獲した操業について集計を行った。それでもなお若干の他魚種狙いの混獲データも含まれていると考えられるが、1日分の漁獲量と網数から求めたCPUEよりもより実態に近い値であると考えられる。これによれば、2001年以降では、曳網1時間当たりの漁獲量は概ね増加傾向にある（図10）。

(3) 甲幅別資源尾数

ズワイガニは年齢が推定できないため漁獲物の年齢組成は明らかではない。ここでは調査船調査で得られた甲幅別資源尾数の経年変化を雌雄別に図11及び12に示す。

雄の甲幅の範囲は10～130mmで年による大きな差は見られない。80mm以上の漁獲対象サイズでは、ほとんどが最終脱皮後の個体である。

1998年、2001年は38mmモードの個体が多く、2005年以降は30～70mm程度の加入前の資源尾数が多い。2005年の38mmモードの群は、2006年には52mmモード、2007年には68mmモードに成長し、各年とも資源尾数が多かった。この2007年の68mmモード群は2008年に漁獲加入すると考えられ、2008年の漁獲対象資源は大きく増加することが期待された。しかし2008年の資源尾数は過去最高値とはいえ2007年と殆ど差がなかった。

2010年の80mm以上の資源尾数は2009年とほぼ同じであったが、甲幅100mm以上の割合は2009年より少なかった。2011年は、翌2012年に加入すると考えられる甲幅60～80mmが2010年に比べ少ないが、2013年に加入すると考えられる50mmにモードを持つ個体数は増加している。

2012年は漁獲対象となる80mm以上の雄、特に100mm以上の個体が2009～2011年に比べ多いが、80mm未満は少なかった。2013年は2012年に多かった甲幅100mm以上の個体も殆ど出現しなかった。また、80mm未満の個体数も2012年同様に少なく、2016年までは加入が少ない可能性が高い。2017年以降に加入すると考えられる28mm未満の小型個体は、過去と比べて多かった。

雌は各年ともに甲幅54～85mmが中心で、76mm前後にモードが見られ、76mm以上はほとんどが成熟した漁獲対象資源となっている。雄同様に2001～2011年までは30～70mm程度の加入前の資源尾数が多い。2005年の38mmモードの群は、2006年には52mmモードに、2007年はこれらが68mmモードに成長したと考えられる。この群は2008年に加入すると推測されたが、2008年の雌の漁獲対象尾数は2007年の半分程度に減少した。

2009年、2010年に加入すると考えられる2008年の48mm、62mmモードの資源尾数は、2006年、2007年に比べて少なかったが、2009年の資源尾数は2002～2007年に近い値となった。

2011年に漁獲加入する2010年の60mm台も比較的多かったが、2011年の漁獲対象資源は減少した。また、2012年、2013年ともに漁獲対象の成熟雌が少ないだけでなく、次年以降に加入してくる60mm以下の資源尾数が少ない。一方で2017年以降に加入する28mm

未満の個体数は過去に比べて多い。

(4) 資源量と漁獲割合の推移

2013年10～11月のトロール調査により推定された資源尾数及び資源重量は、雄は11,208千尾（変動係数 CV:0.19）、610トン、雌は8,006千尾（CV:0.18）、279トン、雌雄合わせて19,214千尾、889トンで2012年より尾数では増加したが重量では半減した（図13、表4）。そのうち甲幅80mm以上の雄ガニと成熟雌ガニとを合わせた漁獲対象資源量は、1,764千尾、381トンで、尾数、重量とも2012年より減少し、過去最高であった2007年の20%程度になった（図13、14、表4）。

雌雄別に見ると、2013年の雄の漁獲対象資源量は、尾数では953千尾(CV:0.37)と最も多かった2007年の約20%、重量では269トン(CV:0.42)と22%に減少した。なお、2007年は茨城県沖の1調査点で、2008年は2007年と同じ茨城県沖の調査点と福島県沖の1調査点で雄がまとまって採集され、茨城県沖と福島県沖の雄ガニの平均密度が高く推定されるとともに、信頼区間が広がった。このことから2007年、2008年の雄の資源量が過大に推定されている可能性がある。この2年と2000年を除くと、雄の漁獲対象資源尾数は、1,000～2,000千尾で推移しており、2013年は過去最低水準にある。

一方、雌の漁獲対象資源は雄に比べて資源尾数の信頼区間がやや広いが、2008年を除く2002～2010年は3,000～4,000千尾で推移していた。2011年以降は減少し、2012年は624千尾、84トンと過去最低の値となった。2013年は若干増加し811千尾(CV:0.29)、111トン(CV:0.29)となった。

漁獲割合は、資源量の増減と概ね逆の変動を示しており、1997年の61%をピークに2000年に7.7%に減少した。2001～2010年は9～27%で推移しており、震災前の平均は約20%であった（表4、図14）。なお、2011年は震災と原発事故により福島県の操業が休止して漁獲が殆どなく、漁獲割合はほぼ0%となった。2012年は試験操業が開始されたが、漁獲量は少なく漁獲割合は0.5%、2013年も0.7%と低い値である。

漁獲係数Fも漁獲割合とほぼ同じ傾向で推移し、2012年、2013年は福島県沖底船による試験操業が実施されたことにより若干の漁獲があったが、雌雄合わせたFは、それぞれ0.005、0.007と低い値である（図15）。

(5) 資源の水準・動向

県別ズワイガニ漁獲量データは1996年以降、資源量推定値も1997年以降の数値しかない。漁業者からの聞き取り情報では、1997年以前は現状程度の漁獲量達成は、より容易であったように感じるとのことから、漁獲量や資源量推定値が得られていなかった1995年以前は1997年以降より資源量は多かったと推測される。そこで、1997～2010年の面積密度法により推定した漁獲対象資源重量の最高値（1,777トン、2007年）を高位と中位の境界、最低値（496トン、1997年）を中位と低位の境界として資源水準を判断した。その結果、2013年の雌雄合計の資源重量（381トン）は低位水準と判断された（図16）。

資源の動向については、これまで沖底漁績による主漁場のCPUEや資源量指数、トロール調査から得られた資源量の推移から総合的に判断していた。しかし、2011年3月以降は震災と原発事故による操業休止により、漁業からズワイガニ資源の状況を反映する情報は

殆ど得られていない。したがって、今年度の資源評価では、トロール調査による資源量推定値に基づき動向を判断した。2009～2013年の5年間の漁獲対象資源量の推移から動向は減少と判断された。

2013年は雄の漁獲対象資源も著しく減少したこと、雌雄ともに若齢個体の資源尾数も減少していることから、今後の動向には注意を要する。

(6) 再生産関係

年齢が不明で、ふ出した幼生が漁獲加入するまでの年数が長く、産卵親ガニの量と加入量の関係を検討するためのデータ年数が不足していることから、再生産関係については不明である。これまで、ある年の漁期後の雌ガニと7年後の42～56mm（これらは2年後に漁獲加入する）の雌雄合計の資源尾数について相関関係が見られていたが、2013年までの最新値を加えた結果、相関関係は不明瞭になった。（図17中段中央）。1年後に加入すると考えられる雄の56～74mmと雌の56～76mmの合計（図17下段）、3年後に加入する28～42mm（図17上段）についても同様に比較したが、明瞭な相関関係は見られない。

(7) Blimit の設定

再生産関係が不明なため、ここでは再生産に影響をされると考えられる雌の獲り残し量を基準として、2008年を除く1997～2010年のSSBの最低値63トン（表5）をBlimitと設定した。

SSB<Blimitとなる状態が2年以上連続する場合や、今後の動向予測においてSSB<Blimitとなる状態が連続する、あるいは加入量が低い水準になることが予想される場合には何らかの規制措置を執ることを提案する。

1997～2013年のトロール調査結果から推定されたSSBは、図18に示すように、2002～2010年は、2008年を除くと250～350トン、平均275トンでほぼ横ばい傾向で推移していた。しかし、2012年のSSBは60トンでBlimitを下回り、2013年は若干増回して83トンとなったがBlimitをやや上回るレベルである。

(8) 今後の加入量の見積もり

①資源と海洋環境の関係

浮遊期幼生の生残、着底海域への移送等に海流や水塊配置などが大きな影響を与えると推測されるが、詳細については不明である。

②調査船調査からの今後の加入量の仮定

甲幅サイズ別の採集効率の導入により3年後に加入する28～42mmの推定値が改善された。これにより、28～42mmの資源尾数と翌年の42～56mmの資源尾数の相関関係が認められ（図19）、その相関を利用して今年度よりABC算定年の翌年の加入量を推定した。

各年の資源量調査から得られた加入前の資源尾数を表6に、加入前資源尾数から推定した加入量を図20及び表7に示す。

2007年雄の56～74mmの半数と74～80mmの未最終脱皮個体を合わせた2008年に加入する雄資源尾数は、5,918千尾と1997年以降では最高の値であった。2009年以降、翌年に加入する雄の資源尾数は減少し、2013年は730千尾であった。この値とM=0.35により求

めた各年推定加入尾数も 2008 年をピークに減少傾向にあり、2014 年は 515 千尾（対 2013 年比 42%）、2015 年も 497 千尾（対 2013 年比 40%）と低い水準であると推定された。

雌の加入前資源量を見ると、2006 年と 2007 年の 56~76mm の尾数と $M=0.35$ から求めた 2007 年と 2008 年の雌の推定加入尾数は過去最高レベルになると推定された。2008 年と 2009 年の 56~76mm は、2006 年、2007 年からは大きく減少したが、2005 年以前と比べても高い値である（表 6）。2010 年の 56~76mm は多かったが、以後減少して 2013 年は 841 千尾であった。

2011 年の雌の推定加入尾数は 2,871 千尾と 2010 年より増加したが、2012 年は半減した。2013 年の推定加入尾数は 2012 年よりやや減少した。2014 年は 596 千尾（対 2013 年比 43%）と大きく減少し、2015 年も 605 千尾（対 2013 年比 44%）と低い水準と推測される。

これらのことから雌雄ともに 2011 年以降の加入尾数は減少傾向で、2014 年以降も低い水準であると推定される。

(9) 生物学的管理基準（漁獲係数）の基準値と漁獲圧の関係

漁獲対象資源の加入量当たり漁獲量(YPR)と加入量当たり産卵親魚量(SPR)を求め、 F との関係性を雌雄別に図 21 に示す。

加入後の資源動態についてはコホート解析の前進法と同様の方法によって計算した。漁獲対象とならない小型個体も同じ F で漁獲され再放流されるが、このズワイガニ（以下「再放流個体」という）がすべて生き残る場合（100%生残）、半数が生き残る場合（50%生残）、生き残らない場合（0%生残）を仮定して検討を行った。YPR の漁獲量は水揚された漁獲対象資源のみとした。前述のように、当海域においては雄では甲幅 80mm 以上、雌では成熟個体が漁獲対象となるが、計算では年齢別選択率は一定とし、漁獲対象資源についてはサイズに関係なく一定の漁獲圧がかかると仮定した。また、漁期中に漁獲された漁獲対象資源はすべて水揚されるものとして扱った。寿命については考慮していない。

なお、太平洋北部海域における再放流個体の再放流後の生残については見解がないため、本報告中の資源量推定や動向予測では、再放流個体はすべて生き残るものとした。

100%生残では、YPR は雌雄ともに F を高くすると次第に増加し、 $F=1.0$ までの範囲では次第に増加率は減少するが増加を続ける。50%生残及び 0%生残では、YPR はある $F(F_{max})$ で極大となり、その後 F を高くすると減少する。50%生残における YPR が極大となる $F(F_{max})$ は雄 0.25、雌 0.20 で、0%生残の F_{max} は雄 0.16、雌 0.15 であった（図 21 上）。

100%生残では、 F を強めても YPR は減少しないため F_{max} を基準とした管理方策の検討は適用できない。また、最近年の F の平均（2008 年除く 2006~2009 年の F_{ave} 3-yr、雄 0.17、雌 0.20）は、雄では 50%生残の F_{max} よりも小さく、0%生残では F_{max} を若干越えている。雌では、ほぼ 50%生残時の F_{max} に相当し、0%生残の F_{max} より若干高い値である。

次に SPR について見ると、一般的な基準とされる $F_{30\%SPR}$ は、100%生残では雄 0.55、雌 0.85、50%生残では雄 0.26、雌 0.32、0%生残では雄 0.18、雌 0.22 となる。雄の F_{ave} 3-yr（0.17）は、0%生残の $F_{30\%SPR}$ と同等で、雌の F_{ave} 3-yr は $F_{30\%SPR}$ よりも低い値である（図 21）。

以上のように、震災直前の雄の F は、再放流された加入前の個体の生残があまり良くない状態では F_{max} と同程度、%SPR も比較的高い値を示しており、資源に大きな影響を与

えていないと考えられる。一方、雌の場合、再放流された加入前個体の生残が 0%の時には震災直前の $F_{ave\ 3-yr}$ は F_{max} より大きく、 $F_{30\%SPR}$ より低い値である。

5. 2015 年 ABC の算定

(1) 資源評価のまとめ

2013 年の漁期前の雌雄を合わせた漁獲対象資源量は、381 トンと前年から大きく減少し、1997 年以降の最低値となり、資源水準は低位と判断された。一方、2009 年以降の過去 5 年間の雌雄を合わせた資源量の推移から動向は減少と判断された。2014～2016 年の加入量は雌雄ともに低い水準と予想される（表 7）。

こうした資源量の減少や加入水準の低下は、震災以降、殆ど漁獲されていない状況下で起こった現象で、要因としては、以下のようなものが推測される。

- ①地震や津波の影響によって、沖合の海底でも何らかの変化が生じている。
- ②2012 年は、調査時期の海底水温が例年より高い傾向が見られたことから、水温条件がより良い海域にズワイガニが移動したか、高水温による斃死率が高まった。
- ③福島県漁業の休止、放射性物質検出による水揚自粛により、漁獲圧が大きく下がったため、マダラ、ヒラメなど比較的高い漁獲圧を受けていた高次捕食者の個体数が急増し、捕食された。
- ④捕食者回避のため、海底の障害物などに身を隠し、底びき網では採集されにくくなった。
- ⑤漁獲圧が低下したことで、生態系のバランスが崩れた。

現状では、資源減少のメカニズムは分からないが、このうち③に記したマダラの資源増加は、震災後に確認できる顕著な現象であり、マダラの食性についての調査からズワイガニがマダラに捕食されていることが確認されている（補足資料 6）。

(2) 漁獲シナリオに対応した 2015 年 ABC ならびに推定漁獲量の算定

本系群については、再生産関係が不明で、資源が低位水準であることから、ABC算定規則 1-3)-(3)を適用し、2015年（2015年12月～2016年3月）の漁獲量をABCとして算出した。

本系群に関する中期的管理方針は、資源の維持若しくは増大である。主漁場が休漁状態にあるにもかかわらず資源が減少していることから、漁業以外の要因による減少と考えられるが、資源の減少を止め、親魚量の確保と増大を図るため、低い漁獲圧を維持することが望ましい。

ここでは低い加入水準の下で、資源減少を止め、親魚量の増大を可能とする漁獲シナリオとして、「現状の漁獲圧の維持」及び「親魚量の増大」の2つについて示した。

現状の漁獲圧の維持シナリオでは、福島県漁船の試験操業による2012年と2013年の全県漁獲量と資源量推定値から求めたFの平均値を $F_{current}$ として管理基準値に用いた。

親魚量の増大シナリオでは、これまでの本系群の維持すべきSSBとして用いてきた2002～2010年（2008年を除く）のSSB平均値（275トン）を目標値に設定した。今後の加入量水準が低いことを考慮して、将来予測においては2014～2016年の加入量推定値の平均を用いた。この平均値を加入量として与え、10年程度で目標値に達する雌のFを探索的に求めたところ、 $F=0.029$ （0.17 $F_{ave\ 3-yr}$ ）を維持したときに、2023年のSSBが275トンに達する。雄の

漁獲シナリオ	管理基準	漁獲量 (トン)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
現状の漁獲圧の維持	0.012(0.003, 0.035) (Fcurrent)	1	1	1	2	2	2	2
		2	3	7	9	10	10	11
現状の漁獲圧の維持の予防的措置	0.010(0.002, 0.028) (0.8Fcurrent)	1	1	1	1	1	2	2
		2	3	5	7	8	8	9
親魚量の増大	0.031(0.029, 0.034) (0.17Fave 3-yr)	1	1	14	16	18	19	20
		2	3	7	9	9	10	11
親魚量の増大の予防的措置	0.025(0.024, 0.027) (0.8・0.17Fave 3-yr)	1	1	11	13	14	15	16
		2	3	5	7	8	8	9
漁獲シナリオ	管理基準	資源量 (トン)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
現状の漁獲圧の維持	0.012(0.003, 0.035) (Fcurrent)	269	394	490	603	686	741	789
		111	164	205	269	293	315	332
現状の漁獲圧の維持の予防的措置	0.010(0.002, 0.028) (0.8Fcurrent)	269	394	490	603	686	742	790
		111	164	205	270	295	318	336
親魚量の増大	0.031(0.029, 0.034) (0.17Fave 3-yr)	269	394	490	592	663	708	746
		111	164	205	269	293	315	332
親魚量の増大の予防的措置	0.025(0.024, 0.027) (0.8・0.17Fave 3-yr)	269	394	490	594	668	715	755
		111	164	205	270	295	318	336

※各漁獲シナリオの漁獲量及び資源量の上段は雄、下段は雌。

Fについては、探索的に決定した雌のFとFave 3-yrの雌のFの比率を雄のFave 3-yrに乗じて求めた。

2014年漁獲量は、以下の仮定により、福島県漁船と他県を合わせた2012年と2013年の漁獲量の平均とした。

- ・2010年以前同様に福島県沖底漁船による漁獲が大部分を占める。
- ・福島県沖底漁船は、2012年11月から開始された試験操業を、2014年12月のズワイガニ解禁以降も2012年、2013年と同様な規模で行う。

Fcurrent (雄 F=0.003、雌 F=0.035) では、2019年の漁獲量は雄で2トン、雌は11トンとなる。2019年資源量は、雄789トン、雌332トンと、それぞれ2013年の2.9倍、3.0倍に増加する。

0.17Fave 3-yr (雄 F=0.029、雌 F=0.034) を維持した場合、2019年の漁獲量は、雄で20トン、雌は11トンとなる。2019年の雄の漁獲対象資源量は746トンと2013年の2.6倍に増加、雌の資源量は332トンと2013年の3倍に増加する。

2014年以降のSSBは、Fcurrent、0.17Fave 3-yrではともに、2014～2016年の低い加入水準でもBlimitを上回って増加し、2019年にはそれぞれ32%、35%の確率で平均値に近い値に達する(表8)。

(3) 加入量の不確実性を考慮した検討、シナリオの評価

再生産関係が不明であり、加入量や資源の変動に影響する要因等も明らかでないため、2017年以降の加入動向は推定できない。そこで今後も低水準の加入が続くと仮定して、2014～2016年の加入量推定値の平均に、標準偏差V、平均を1とした正規乱数を乗じた値を加入量としてシミュレーションを行った(補足資料7)。将来漁獲量は1,000回のシミュ

レーション後の 2019 年の漁獲量を 80%区間で示し、5 年平均は 2019 年の平均値とした。評価には、1,000 回のシミュレーション後、2019 年後の親魚量が平均 SSB、Blimit を下回らない割合を示した。

2013～2019 年の SSB と雌雄合計資源量のシミュレーション結果のメジアン、上限 90%、下限 10%の経年変化を図 22 に示す。Fcurrent 及び 0.17Fave 3-yr のシナリオではともに、Blimit 以上の SSB を維持する確率は 100%であった。5 年後に平均 SSB に達する確率は、それぞれ 32%と 35%で高くないが、両シナリオとも SSB、雌雄合計資源量は上限 90%、メジアン、下限 10%のいずれでも 2015 年以降増加する (図 22)。

各シナリオに対し予防的措置として、一定の係数 α を掛けた F で漁獲した場合についても検討した。 α には標準値の 0.8 を用いた。Fcurrent 及び 0.17Fave 3-yr ではともに予防的措置を執ることにより、SSB が平均を上回る確率は 40%近くに増加する。

漁獲シナリオ	F 値 (Fcurrent との比較)	漁獲割合 (雄,雌)	将来漁獲量		評価		2015 年 漁期 ABC (雄,雌)
			5 年後 (雄,雌)	5 年 平均 (雄,雌)	平均 SSB 以上を維持 (5 年後)	Blimit を維持 (5 年後)	
現状の漁獲圧の維持 (Fcurrent) *	0.012 (0.003,0.035) (Fcurrent)	1.2 (0.3,3.3) %	10-16 (2,8-14) トン	13 (2,11) トン	32%	100%	8.0 (1.3,6.7) トン
現状の漁獲圧の維持の予防的措置 (0.8Fcurrent) *	0.010 (0.002,0.028) (0.8Fcurrent)	0.9 (0.2,2.6) %	8-13 (1-2,7-11) トン	11 (2,9) トン	37%	100%	6.4 (1.0,5.4) トン
親魚量の増大 (0.17Fave 3-yr) *	0.031 (0.029,0.034) (2.6Fcurrent)	2.9 (2.8,3.2) %	24-36 (16-23,8-13) トン	31 (20,11) トン	35%	100%	20.1 (13.6,6.5) トン
親魚量の増大の予防的措置(0.8・0.17Fave 3-yr) *	0.025 (0.024,0.027) (2.1Fcurrent)	2.3 (2.2,2.6) %	19-30 (13-19,6-11) トン	25 (16,9) トン	39%	100%	16.1 (10.9,5.2) トン
コメント ・本系群の ABC 算定には、規則 1-3)-(3)を用いた。 ・主漁場における漁獲が行われていないにも関わらず漁獲対象資源は大きく減少し、トロール調査結果から推定可能な 2016 年までの加入量も少ない。 ・SSB も過去最低レベルになっているため、SSB を現状より下げないことが重要。 ・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第 3 に記載されている本系群の中期的管理方針では、「資源の維持若しくは増大を基本方向として、安定的な漁獲量を継続できるよう、管理を行うものとする」とされており、現状の漁獲圧の維持、親魚量の増大のシナリオともに Blimit を下回ることはなく、SSB は増加すると考えられる。同方針に合致する漁獲シナリオには*を付した。 ・原発事故の影響による操業休止から、2011 年以降の漁獲は僅かである。							

(4) ABC の再評価

昨年度以降追加されたデータセット	修正・更新された数値
2013年漁期漁獲量	2013年漁期漁獲量の確定
2013年甲幅別資源量	海区区分の修正 2013年資源量確定、2014年加入量確定、2015年加入量改定

2011年調査結果から算定した当初の2013年ABClimitは、雄220トン、雌220トンであった。2013年再評価では、2012年調査結果から算定した2013年漁獲対象資源量は当初の推定値を大きく下回ったため、ABClimitは雄177トン、雌79トンに下方修正された。

2014年再評価では、2013年調査結果から算定した2013年雄の漁獲対象資源量がさらに少したことからABClimitは93トンと下方修正された。雌のABClimitは2013年再評価時より若干資源量が増加したことから2013年再評価より若干増加して82トンとなった。

このように2013年ABCは、再評価、再々評価時の推定資源量が低い値に修正されたことにより大きく下方修正された。これは調査結果から推定した加入量よりも実際の加入量が少なかったことが主な要因と考えられる。この原因については不明であるが、当初と再評価時の資源量推定値の変化の傾向は、補足資料8に示したように雌雄や年代で異なるた

評価対象年 (当初・再評価)	管理基準	F値	資源量 (トン)	ABClimit (トン)	ABCtarget (トン)	漁獲量 (トン)
2013年(当初)	1.3Fcurrent	雄 0.10	2,386	220	156	
	1.3Fcurrent	雌 0.25	1,031	220	160	
2013年(2013年再評価)	1.3Fcurrent	雄 0.10	1,948	177	126	
	1.3Fcurrent	雌 0.25	373	79	57	
2013年(2014年再評価)	1.3Fcurrent	雄 0.10	1,011	93	75	1.1
	1.3Fcurrent	雌 0.25	385	82	67	1.5
2014年(当初)	0.9Ccurrent	雄 0.12	1,080	105	84	
	0.9Ccurrent	雌 0.59	180	83	57	
2014年(2014年再評価)	0.9Ccurrent	雄 0.33	394	105	84	
	0.9Ccurrent	雌 0.76	164	83	57	

・2013年TAC設定の根拠となったシナリオ：現状の親魚量の維持。
 ・2014年TAC設定の根拠となったシナリオ：現状の漁獲量の維持。
 ※2013年の当初及び再評価の資源量は採集効率0.3で推定した数値、2014年資源量は甲幅別採集効率で推定した数値で、面積修正後の値

め、モデルの特性とは考えにくい。今後、年によるMの変化などを加味した検討が必要である。また、加入量変動に関わる要因についての検討も重要である。

2014年(当初)では、2012年調査結果から算定した2014年漁獲対象資源量は雄1,080トン、雌180トンで、これに基づくABClimitは雄105トン、雌83トンであった。

2014年(2014年再評価)では、2013年調査結果から算定した2014年漁獲対象資源量は雄394トン、雌164トンとなり、雄が大きく減少した。漁獲量一定シナリオに基づくABCであることからABClimitは当初と同じ雄105トン、雌83トンとなる。

6. ABC 以外の管理方策への提言

本系群の資源の減少を止め、親魚量の増大を図るためには、漁期（12月10日～翌3月31日）以外の混獲を避けることが必要である。加えて、漁期外の混獲及び漁獲対象外資源の漁獲実態を把握し、漁獲後速やかに放流するなど再放流個体の生残を高める工夫も重要である。また、ズワイガニの再生産に重要である雌ガニの保護策について検討する必要がある。特に、雌雄別の漁獲重量はほぼ等しいか雌が多い傾向があり、漁獲対象の雌雄の体重差から、個体数レベルでは雌は雄の2～5倍多く漁獲されていると推測される。今後、雌雄の漁獲状況や資源状況の違いに応じた雌雄別の漁獲方策やABC、TAC設定を検討するべきである。なお、雌雄の獲り分けは容易ではないが、少なくとも漁期中の狙い操業では、漁獲後の選別と再放流は可能と思われる。また、漁場に複数の操業区域を設定し、一つの区域での雌の漁獲が一定数量・割合に達したところで操業を止めるなどの方法も検討するべきである。

震災以前の当海域のズワイガニ漁業は、他の魚種の漁況や価格動向によってズワイガニ狙いの努力量に変化が生じていた。これまではスルメイカやマダラ、アカガレイ、ミズダコなど漁獲が比較的好調で、これらの魚種へ漁獲努力が向けられていたため、最近年ではズワイガニ狙いの努力量は少なかったと考えられる。しかし、今後これらの資源状況が悪化した場合に他の重要種の漁獲減少を補うためにズワイガニに高い漁獲圧がかかる可能性もある。ズワイガニに加え、タラ類、カレイ類など他の重要魚種の資源動向や漁獲状況にも注意を払い、適切な資源維持・増大方策を行うなど重要底魚類に対する包括的な資源管理体制を確立する必要がある。

太平洋北部系群のズワイガニは単価が低いという現実があり、これによって過度の漁獲が避けられている皮肉な側面がある。漁獲量にある程度の制限を設ける一方で、漁業者の収入増加を図るためには、単価の上昇が望まれるところである。単価低迷の一因として雄の大型個体が少ないことが挙げられる。日本海系群については、雄の甲幅制限を自主的により大型なものにするなど種々の取り組みが行われているが、甲幅100mm程度でほとんどの個体が最終脱皮をしてしまう本系群では、甲幅の規制サイズを大きくしてもその効果は低いと考えられる。そこで甲幅80mm以上でも最終脱皮に至っていないハサミの小さな雄を再放流し、さらに脱皮・成長させることが一つの方法として挙げられる。これにより、単価が低いミズガニの混入が少なくなり、単価の上昇も期待される。あわせて需要の高い時期に絞った水揚げやブランド化などの推進により単価引き上げを推進する必要がある。

7. 引用文献

- 土門 隆(1965)ズワイガニ調査(1964). 北水試月報, 22,219-234.
- 服部 努・北川大二・今村 央・池川正人(1998) 1997年の底魚類資源量調査結果. 東北底魚研究, 1, 47-67.
- 服部 努・北川大二・今村 央・野別貴博(1999) 1998年の底魚類資源量調査結果. 東北底魚研究, 19, 77-91.
- 伊藤勝千代(1956) 日本海の底魚漁業とその資源. 重要水族の漁業生物学的研究(ズワイガニの項). 日水研報告, 4, 293-305.
- 金丸信一(1990) 日本海区のズワイガニ類の漁獲状況について. 漁業資源研究会議北日本

- 底魚部会報, 23, 13-23.
- 北川大二・服部 努・今村 央・野澤清志(1997a) 東北海域におけるズワイガニとベニズワイガニの分布特性. 東北底魚研究, 17, 69-78.
- 北川大二・服部 努・斉藤憲治・今村 央・野澤清志(1997b) 1996年の底魚類資源量調査結果. 東北底魚研究, 17, 79-96.
- 北川大二(2000) 東北海域におけるズワイガニの分布と生物特性. 東北水研研報, 63, 109-118.
- 今攸・丹羽正一・山川文男(1968) ズワイガニに関する漁業生物学的研究-II. 甲幅組成から推定した脱皮回数. 日水誌, 34, 138-142.
- 桑原昭彦・篠田正俊・山崎 淳・遠藤 進(1995) 日本海西部海域におけるズワイガニの資源管理. 日本水産資源保護協会, 東京, pp.89.
- 尾形哲男(1974) 日本海のズワイガニ資源. 水産研究叢書 26, 64pp. 日本水産資源保護協会, 東京.
- 上田祐司・伊藤正木・服部 努・成松庸二・藤原邦浩・吉田哲也・北川大二(2007) 東北地方太平洋岸沖におけるズワイガニの甲幅組成解析により推定された成長. 日水誌, 73, 487-494.
- 山崎 淳(1991) ズワイガニの資源管理に向けて. 日本海ブロック試験研究集録, 22, 59-71.
- 山崎 淳・篠田正俊・桑原昭彦(1992) 雄ズワイガニの最終脱皮後の生残率推定について. 日水誌, 58, 181-186.
- 渡部俊広・北川大二(2004) 曳航式深海洋ビデオカメラを用いたズワイガニ類に対する調査用トロール網の採集効率の推定. 日水誌, 70, 297-303.

図1. 太平洋北部海域(北海道を除く)におけるズワイガニの分布

図2. ズワイガニの生活史(日本海)と太平洋北部海域における沖底漁場

図 3. 日本海におけるズワイガニの脱皮齢期と甲幅の関係

図 4. 2013 年のトロール調査結果におけるズワイガニの甲幅別成熟割合

図 5. 沖底によるズワイガニの漁獲量分布(2009 年漁期 単位:トン)

図 6. ズワイガニ太平洋系群の漁獲量(漁期年：12月～翌年3月)

図 7. 福島県沖底のズワイガニに対する漁獲努力量
左：有漁全漁区 右：ズワイガニ主漁場

図 8. 福島県沖底漁船のズワイガニ主漁場におけるオッターコントロールによるズワイガニの CPUE (kg/網、1996～2009年)

図 9. 福島県沖底漁船のズワイガニ主漁場における資源量指数 (1996～2009 年)

図 10. 福島県沖底標本船の曳網 1 時間当たりの平均漁獲量(kg)
 ※2010 年は 12 月のみのデータで参考値。

図 11. 雄ガニの甲幅別資源尾数

図 12. 雌ガニの甲幅別資源尾数

図 13. トロール調査で推定されたズワイガニ資源尾数と 95%信頼区間

図 14. 面積密度法により推定した漁獲対象資源重量と漁獲割合の経年変化

図 15. 資源量と F および漁獲量の関係

図 16. ズワイガニ漁獲対象資源量の経年変化と水準の判定

図 17. 加入前の資源尾数と SSB の関係
 上段：28~42mm、中段：42~56mm
 下段：56~74mm 雄と 56~76mm の雌の合計

図 18. SSB の推移 (破線 : Blimit)

図 19. N 年の 28～42mm と N+1 年の 42～56mm の資源尾数の関係 左：雄 右：雌

図 20. トロール調査結果から推定した加入量

図 21. F の変化による YPR(上)及び%SPR(下)の変化(左:雄 右:雌)
 漁獲対象とならない小型個体の混獲後の再放流による生残率が 100%、50%、0%
 の場合で計算。

図 22. 加入量の不確実性を考慮したシミュレーションによる SSB (左列) 及び雌雄合
 計漁獲対象資源量 (右列) の変化

表 1. ズワイガニの県別漁獲量(トン)

年	漁期	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	合計	福島県割合(%)
92	1992年12月-1993年3月				72.8	15.1	87.9	82.8
93	1993年12月-1994年3月				109.3	0.8	110.1	99.3
94	1994年12月-1995年3月			2.0	125.2	1.6	128.8	97.2
95	1995年12月-1996年3月	19.6		3.7	324.7	5.1	353.1	92.0
96	1996年12月-1997年3月	31.0	0.0	43.0	209.1	0.1	283.2	73.8
97	1997年12月-1998年3月	3.8	0.2	72.3	225.2	0.1	301.6	74.7
98	1998年12月-1999年3月	1.1	0.0	19.4	172.7	0.0	193.2	89.4
99	1999年12月-2000年3月	8.8	0.0	9.9	130.0	0.0	148.7	87.4
00	2000年12月-2001年3月	1.0	0.3	2.1	104.0	0.0	107.4	96.8
01	2001年12月-2002年3月	0.1	0.2	4.0	109.4	6.6	120.3	90.9
02	2002年12月-2003年3月	0.0	1.3	5.5	141.9	0.0	148.7	95.4
03	2003年12月-2004年3月	0.3	0.1	7.5	180.6	90.2	278.7	64.8
04	2004年12月-2005年3月	0.4	0.0	4.0	121.1	6.4	131.9	91.8
05	2005年12月-2006年3月	0.3	0.1	4.0	94.0	23.5	121.8	77.2
06	2006年12月-2007年3月	0.0	0.0	3.8	136.8	9.1	149.8	91.4
07	2007年12月-2008年3月	0.0	0.2	2.9	159.1	3.2	165.4	96.2
08	2008年12月-2009年3月	0.0	0.3	15.7	212.9	15.7	244.5	87.1
09	2009年12月-2010年3月	0.0	0.1	5.5	187.3	26.2	219.1	85.5
10	2010年12月-2011年3月	0.0	0.0	1.1	154.9	3.2	159.3	97.3
11	2011年12月-2012年3月	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0
12	2012年12月-2013年3月	0.4	0.3	0.3	4.6	0.0	5.6	82.0
13	2013年12月-2014年3月	0.7	0.0	0.4	1.5	0.0	2.6	57.0

※福島県以外の各県の数値の0.0は漁獲0.05トン未満。2011年の福島県は原発事故により操業休止。1995年以前の福島県以外の数値に一部カニ類を含む。

表 2. 福島県相馬港に水揚げされたズワイガニの雌雄重量比

漁期年	♂	♀
1995	0.44	0.56
1996	0.52	0.48
1997	0.52	0.48
1998	0.42	0.58
1999	0.39	0.61
2000	0.41	0.59
2001	0.51	0.49
2002	0.54	0.46
2003	0.42	0.58
2004	0.33	0.67
2005	0.44	0.56
2006	0.52	0.48
2007	0.46	0.54
2008	0.55	0.45
2009	0.65	0.35
2010	0.57	0.43

表 3. 沖底標本船のズワイガニの漁獲努力量

漁期年	網数	曳網時間	時間/網
2001	180	401	2.2
2002	146	378	2.6
2003	120	290	2.4
2004	53	96	1.8
2005	53	87	1.6
2006	133	248	1.9
2007	78	145	1.9
2008	148	278	1.9
2009	227	408	1.8
2010	10	20	2.0

※2010年は12月のみの数値。

表 4. 面積密度法により推定したズワイガニの資源量

ズワイガニ全体		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
尾数	雄	6,395	10,804	7,183	5,261	9,155	9,401	11,243	14,003	28,005	27,325	29,281	19,571	16,987	22,210	20,151	9,719	11,208
	雌	7,627	8,616	10,398	3,735	7,326	9,681	10,101	13,129	24,077	25,561	18,346	12,177	16,517	18,318	15,038	5,133	8,006
重量	雄	597	689	925	1,289	604	1,006	1,179	1,029	1,477	2,074	3,159	2,366	1,452	1,531	1,436	1,578	610
	雌	474	530	898	434	365	814	813	841	1,039	1,538	1,295	714	985	1,088	851	335	279
尾数計		14,022	19,420	17,581	8,996	16,480	19,081	21,344	27,132	52,082	52,886	47,627	31,748	33,504	40,528	35,188	14,852	19,214
重量計		1,071	1,219	1,824	1,723	969	1,819	1,992	1,870	2,516	3,611	4,453	3,080	2,436	2,619	2,287	1,913	889

漁獲対象資源 (甲幅80mm以上の雄および成熟雌ガニ)

漁獲対象資源 (甲幅80mm以上の雄および成熟雌ガニ)		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
尾数	雄	816	1,025	1,653	2,959	1,007	1,291	1,571	1,117	1,898	1,936	4,721	4,538	1,825	1,780	1,894	3,101	953
	雌	1,556	2,559	4,457	2,350	1,239	2,979	3,908	3,239	2,876	2,749	4,017	1,574	3,940	3,143	2,375	624	811
重量	雄	260	357	469	1,043	307	417	507	315	506	600	1,220	1,313	608	498	537	1,056	269
	雌	236	394	667	346	191	410	531	434	407	392	557	213	498	437	319	84	111
尾数計		2,371	3,584	6,110	5,309	2,247	4,270	5,479	4,357	4,774	4,684	8,738	6,111	5,766	4,923	4,269	3,725	1,764
重量計		496	751	1,135	1,389	497	826	1,038	749	913	992	1,777	1,525	1,107	935	856	1,141	381
漁獲量		301.6	193.2	148.7	107.4	120.3	148.7	278.7	131.9	121.8	149.8	165.4	244.5	219.0	159.2	0.5	5.6	2.6
漁獲割合		60.8	25.7	13.1	7.7	24.2	18.0	26.9	17.6	13.3	15.1	9.3	16.0	19.8	17.0	0.1	0.5	0.7

※重量は甲幅別資源尾数と甲幅階級の平均体重から計算した値。

表 5. SSB の推移

SSB (トン)		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SSB		63	206	430	210	97	252	268	256	252	236	347	72	313	276	240	60	83

表 6. 甲幅 80mm 未満の未成熟個体の資源尾数 (千尾)

性別	甲幅	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
雌	28-42mm	1,459	6,614	450	256	3,741	1,742	1,929	4,660	14,118	5,778	3,739	3,116	4,727	7,092	4,811	1,130	1,859					
	42-56mm	1,633	1,145	1,979	255	2,511	2,012	2,942	2,634	3,327	9,568	4,409	5,139	3,570	3,982	5,871	1,474	1,485	2,058				
	56-74mm	1,602	609	1,833	1,101	305	2,155	3,248	3,651	3,160	6,532	8,690	3,932	3,927	4,006	3,328	2,122	1,038	1,046	1,450			
	74-80mm	250	83	605	421	190	653	382	252	785	444	1,573	1,095	351	707	355	697	211	183	184			
	翌年加入	1,051	387	1,521	971	343	1,731	2,006	2,077	2,366	3,710	5,918	3,061	2,314	2,710	2,019	1,758	730	706	909			
雌	28-42mm	1,279	3,379	1,109	105	3,139	1,161	2,046	4,044	12,036	4,998	2,337	2,723	4,997	4,640	3,537	878	1,639					
	42-56mm	1,370	422	1,567	324	2,243	1,304	2,219	1,916	3,104	9,797	4,307	4,533	2,993	3,789	5,629	1,363	1,219	1,721				
	56-76mm	1,542	378	1,482	722	149	3,117	1,485	2,654	2,791	6,413	5,141	2,789	2,878	4,074	2,267	1,956	841	859	1,213			

2014年、2015年は2013年からの計算値

表 7. 加入量の推定値 (千尾)

年	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014-2016 平均
雄	740	273	1,072	685	242	1,220	1,414	1,464	1,667	2,614	4,171	2,157	1,631	1,910	1,423	1,239	515	497	641	551
雌	1,086	266	1,045	509	105	2,196	1,047	1,870	1,967	4,519	3,623	1,966	2,028	2,871	1,597	1,378	596	605	855	685

※2015年は2014年調査後、2016年は2015年調査後、改訂し確定される。

表 8. 高い値を除く平均的な加入量の下での各シナリオ及びその予防的措置により漁獲を行ったときの SSB の推移

漁獲シナリオ	管理基準	SSB (トン)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
現状の漁獲圧の維持	0.012(0.003,0.035) ($F_{current}$)	83	122	153	200	221	239	252
現状の漁獲圧の維持の 予防的措置	0.010(0.002,0.028) ($0.8F_{current}$)	83	122	154	202	225	243	257
親魚量の増大	0.031(0.029,0.034) ($0.17F_{ave\ 3-yr}$)	83	122	153	200	222	239	253
親魚量の増大の予防的 措置	0.025(0.024,0.027) ($0.8 \cdot 0.17F_{ave\ 3-yr}$)	83	122	154	202	225	243	258

補足資料1 使用データと資源評価の関係

使用したデータと資源評価の関係を以下のフローに記す。

補足資料 2 調査船調査の経過及び結果

調査名：底魚類資源量調査

調査期間：

第一次航海：2013年10月6日～10月21日

第二次航海：2013年10月25日～11月9日

第三次航海：2013年11月13日～11月28日

調査海域及び調査実施点：補足図1参照

例年同様、水深150～900mで合計150点での着底トロールを計画し、実施した。

天候に恵まれず、荒天による入港、錨泊、調査中断が多くあり、予定調査点は消化できなかった。調査を実施できたのは113点で、このうちズワイガニが採集されたのは65点であった。

補足図1. 底魚類資源調査海域および2013年調査実施点

補足資料 3 資源量計算方法

調査船調査で得られたズワイガニの採集個体数、甲幅組成から面積密度法により資源量（尾数、重量）を推定した。これまでトロール網の採集効率(Q)は、曳航式深海ビデオカメラによる観察と着底トロールの漁獲試験の結果から推定した0.3（渡部・北川 2004）としてきたが、甲幅サイズ別採集効率に2013年度評価から変更した。甲幅サイズ別採集効率については補足資料5に詳細を記述した。

ズワイガニでは、最終脱皮後、成熟した雄ガニのはさみ（鋏脚）が大きくなるため、甲幅とはさみの大きさの比から成熟・未成熟の判別が行える。また、雌では成熟すると腹節が大きくなるため、腹節の大きさから熟度が判別可能である。これらの結果から、雌雄別体長別に資源尾数及び重量を推定した。

2015漁期年のABCの算出には、2013年10月の資源量をもとに2013年と2014年の漁獲量を考慮して動向を予測する必要がある。2013年の漁獲量は2.6トン、2014年の漁獲量については、2012年と2013年の雌雄別の平均漁獲量を当てはめた。

ズワイガニの漁期は12～3月の4ヶ月である。ここでは近似的に4ヶ月の中間、すなわち2月1日にパルス的な漁獲がある場合の以下の式を用いた。

$$N_{t+1}=N_t \cdot \exp(-M)-C_t \cdot \exp(-5M/6)$$

$$C_t=N_t \cdot \exp(-M/6) \cdot (1-\exp(-F))$$

ここである体長範囲内の 12 月 1 日の資源尾数を N_t 、1 年後の資源尾数は N_{t+1} 、漁獲尾数は C_t 、自然死亡係数は M 、漁獲係数は F とする。漁獲係数は下記の式により計算し、自然死亡係数は脱皮後 1 年未満を 0.35、脱皮後 1 年以降を 0.20 と仮定した。

$$F_t=-\ln(1-C_t \cdot \exp(M/6)/N_t)$$

ズワイガニの脱皮と成長過程を補足図 2 及び 3 に示す。

補足資料 5 に示したが、甲幅別採集効率を用いて推定した資源尾数から求めた年齢群の平均甲幅や成長について採集効率 0.3 の推定結果と異ならないため、これまで使用していた脱皮と成長過程をそのまま当てはめた。なお、太平洋北部海域における脱皮に関する知見がないため下記の条件を仮定した。

- ・脱皮時期は 9～10 月で、甲幅 20mm 程度までは 1 年間に複数回脱皮するが、それ以降最終脱皮まで毎年 1 回脱皮する（桑原ほか 1995）。
- ・雄ガニでは甲幅 56～74mm の最終脱皮前のは翌年脱皮して 74～86mm になり、このうち最終脱皮前のものでその翌年に脱皮して 86～98mm となる。86～98mm のうち最終脱皮をしていないものはさらに翌年脱皮を行い 98～108mm になる。太平洋北部系群では、ここに至る段階でほとんどの個体が最終脱皮を行うため、甲幅 120mm 以上の資源量は少ない。
- ・雌ガニについてみると、甲幅 56～76mm の最終脱皮前の個体は、翌年すべて脱皮して平均甲幅 72.4mm の最終脱皮後のものになり、漁獲対象資源に加入する（補足図 3）。

加入量については、ズワイガニ太平洋北部系群の再生産関係が明らかでないため次のように扱った。

- ・2014 年の加入量（2013 年 9 月）

雄：2013 年（10 月調査時）の 56～74mm の最終脱皮前のもので 2014 年 9 月に脱皮して 74～86mm となり、このうち 80mm 以上のものが最終脱皮の有無にかかわらず 2014 年の漁獲対象に加入する(A)。74～86mm の半数（甲幅 80mm 以上の個体）が漁獲対象となる。

2013 年 10 月の 74～80mm は、2012 年 10 月の 56～74mm のうちの 2013 年に加入せず漁獲対象にならなかったものである。この中の未最終脱皮個体が 2014 年 9 月に脱皮して甲幅 80mm 以上になり漁獲対象となる(B)。このことから 56～74mm の半数（上記の A）と 74～80mm の未最終脱皮ガニ（上記の B）が 2014 年の漁獲対象に加入する。

雌：2013 年（10 月調査時）に未成熟であった 56～76mm が 2014 年 9 月に脱皮して、平均甲幅 72.4mm の成熟ガニとなりすべて漁獲に加入する。

- ・2015 年の加入量：甲幅組成から 2013 年の甲幅 42～56mm のものが 2014 年に 56～74mm となり、雄ではその半数が、雌では全数が 2015 年に漁獲対象となると考えた。2014 年の 56～74mm（雌は 56～76mm）の資源尾数と 2014 年の 74～80mm の資源尾数を加えて

補足図3. ズワイガニ雌の脱皮模式

補足資料4 資源量計算における海域面積の修正

トロール調査結果からの資源量計算時に調査海域を水深により12分割、さらに南北を4分割し、合計48層に区分している。

今後の検討課題として、層区分について再検討を始めたところ、南北の区分する境界2箇所が想定よりも南にずれていたことが判明した(補足図4)。

境界線がずれたことにより、想定とは異なった面積により、密度が引き延ばされていたことになる。調査点の位置を確認したところ、本来の層には属さなくなった点が出ており、計算手法上問題となることから、境界を本来の位置に戻して、各層の面積を再計算し、過去に遡り資源量推定値を修正した。この修正により、若干資源量が変化し、年によって修正前より増加する場合も、減少する場合も見られた(補足図5)。

これにより水準の判断基準となる資源量は高位と中位境界の1,560トンが、1,777トンに、中位と低位の境界が、560トンから497トンに変化した(補足表1)、過去の評価における水準判断への影響はなく、動向についても修正はない。

SSB 平均値は260トンから275トンに、Blimitは97トンから63トンに変化した(補足表1)。この結果を用いた2013年度評価における要約表を修正前後で比較したところ、現状の漁獲圧の維持以外の2つのシナリオでは、算定されたABCが若干大きくなった。しかし、各シナリオのF値や漁獲割合、シミュレーションによる5年後の評価結果に修正前後で大きな違いはない(補足表2)。

補足図 4. 宮城県以南における南北区分の境界
赤線：正、青破線：誤

補足図 5. 境界修正前後の漁獲対象資源量の比較

補足表 1. 水準、将来予測の基準値の変化

	修正前	修正後
高-中水準の境界	1,560 トン	1,777 トン
中-低水準の境界	560 トン	497 トン
SSB 平均値	260 トン	275 トン
Blimit	97 トン	63 トン

補足表 2. 2013 年度資源評価要約表の修正前後での比較

漁獲シナリオ	F 値(雄, 雌)	漁獲割合%(雄, 雌)	将来漁獲量		評 価		2014 年 ABC
			5 年後	5 年平均(5 年後)	過去の平均親魚量を維持(5 年後)	Blimit を維持(5 年後)	
震災前の雌雄別漁獲量の維持(0.9Fave 3-yr)	0.17 (0.16, 0.18)	15 (14, 16)	192-397 (140-276 52-121)	311 (204,84)	76%	100%	167 (136,31)
〃 修正後(0.9Fave 3-yr)	0.16 (0.15, 0.18)	14 (14, 15)	200-414 (146-291 54-123)	296 (211,85)	79%	100%	198 (160,38)
震災前の雌雄別漁獲量の維持(0.9C2007-2009)	0.19 (0.12, 0.59)	16 (11, 44)	188 (105,83)	188 (105,83)	56%	91%	188 (105,83)
〃 修正後(0.9C2007-2009)	0.15 (0.10, 0.44)	13 (9, 34)	188 (105,83)	188 (105,83)	60%	96%	188 (105,83)
							算定漁獲量
平均的加入のもと SSB を一定にする漁獲量の維持(0.9・1.7Fave 3-yr)	0.27 (0.26, 0.30)	22 (22, 24)	251-533 (185-370 66-163)	385 (273,112)	47%	99%	257 (209,48)
〃 修正後(0.9・1.8Fave 3-yr)	0.27 (0.27, 0.31)	23 (22, 25)	268-584 (200-413, 68-171)	415 (295,120)	42%	99%	328 (266,62)

補足資料5 甲幅別採集効率の推定

・調査方法

先行研究等の例・知見 (Somerton et al., 1999 など) をもとに、東北水研でズワイガニ調査に使用しているトロール網に、補足図6に示すチェングラント式のカバーネットを取り付けた網を作成して曳網試験を行った。2011年11月26~27日に宮城県女川町沖で、翌年2012年4月24~25日に福島県浪江町沖において調査を実施した。なお、2012年の調査点は、前年の調査でデータが不足している大型個体を採集するため、漁業者がズワイガニ漁場として利用している水域に設置した。

曳網状態が異常と考えられる曳網を除く10曳網で採集したズワイガニは、雄が997個体、雌が931個体で、合計で1,928個体であった。

・ズワイガニ採集効率推定の統計モデリング

トロール網による採集効率が、体サイズによって変化すると仮定した先行研究(Somerton et al., 1999, Munro and Somerton, 2001, Weinberg et al., 2004)を参考に、ベルヌーイ分布を仮定したGLMMによる分析により、甲幅別採集効率推定曲線式を求めた。

採集効率 Q_{ik} にカニの甲幅サイズ(CW_{ik})及び性差を固定効果とし、曳網ID(z_k)を変量効果として扱った混合ロジスティックモデルを当てはめた。最尤法によってLの対数をとった値(対数尤度)を最大にするパラメータを推定した。 α 、 β 、 γ に雌雄の効果を入れるか入れないかの8通りを比較し、AICによってモデル選択を行った。

AICによるモデル選択の結果、ベストモデルは、

$$Q_{ik} = \frac{\gamma_1}{1 + \exp[-(\alpha_1 + \beta_1 \cdot CW_{ik} + Z_k)]}$$

$$z_k \sim g(z_k | \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(z_k - 0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

となり、雌雄の効果が落ちたモデルが選択された。

解析によって得られた採集効率の推定式は、

$$Q = 0.664 / (1 + \exp(-(-4.276 + 0.079 \cdot CW))) \quad (1)$$

となる(補足図7)。(1)式により推定した甲幅別の採集効率を補足表3に示した。これまで用いてきた0.3に相当する甲幅は51.5mmである(補足図7)

以後(1)式により推定した採集効率をQCW、採集効率0.3をQ03とする。

・甲幅組成の分解

成長過程や資源計算に用いているモデルに対応する脱皮過程について検討するため、QCWにより推定した甲幅別資源尾数に基づく甲幅組成を分解した。甲幅組成の分解では、上田ほか(2007)の方法に基づき、各年の甲幅組成に複合正規分布を当てはめた。各年齢

の平均甲幅は logistic 型の成長曲線に従い、各年齢群の甲幅の標準偏差は平均甲幅と線形関係にあると仮定した。

補足図 8 に例示したような甲幅組成の分解を、現在の調査点配置とほぼ同じになった 2004 年以降のデータについて行い、年毎に各群の甲幅平均値を補足表 4 に示した。ここでは日本海系群についての知見から約 20mm を 6 齢、以後は年 1 回の脱皮により成長するものとして脱皮齢を示した。

未成熟の雄では甲幅の平均値が、18.9～21.2mm (6 齢)、25.9～30.0mm (7 齢)、35.8～38.4mm (8 齢)、46.3～51.0mm (9 齢)、60.8～65.8mm (10 齢)、76.2～80.4mm (11 齢)、86.9～91.1mm (12 齢) の 7 群に分解できた。

雌は 18.3～22.1mm (6 齢)、25.6～30.1mm (7 齢)、35.7～38.6mm (8 齢)、47.5～52.3mm (9 齢)、61.9～65.0mm が平均値となる 5 群に分解できた。

これらは Q03 で推定した甲幅組成を分解して得られた各年齢群の平均甲幅(上田ほか 2007)と雌雄ともほぼ同じであった。

・成長

分解した組成を年級毎に整理し、年齢群を色分けして、経年変化を雌雄別に補足図 9 及び 10 に示した。個々のグラフは、それぞれある年級の成長と推定資源尾数の経年的な変化を表している。

年により若干の違いがあるが、雄の甲幅 14～24mm の 6 齢は翌年 20～36mm の 7 齢に、その翌年 28～42mm 程度の 8 齢となる。8 齢は 1 年後に 36～60mm 程度の 9 齢に成長する。9 齢はさらにその 1 年後、50～74mm 程度に脱皮成長して 10 齢となる。11 齢時には 65～90mm 程度になり、このうち 80mm 以上の個体は漁獲対象となる。11 齢の雄の 80mm 未満のうち最終脱皮前の個体はさらに脱皮して、80mm 以上となり、漁獲加入する(補足図 9)。

雌の 6 齢も雄とほぼ同じ甲幅 14～24mm で、これが翌年 20～36mm の 7 齢、その翌年 28～44mm 程度の 8 齢となる。8 齢は 1 年後 38～60mm 程度の 9 齢に成長する。9 齢はさらにその 1 年後 50～74mm の 10 齢となる。雌は 11 齢になる際に最終脱皮して成熟する(補足図 10)。

各年齢の平均甲幅は Q03 と概ね同じであり、現在、資源評価で用いている切断法による 8 齢-9 齢、9 齢-10 齢、10 齢-11 齢の境界についても、大きな差はないと考えられた(補足図 9、10 の青線)。

したがって、Q03 での評価と同様に切断法により、2 年後に加入する 9 齢を 42～56mm、1 年後に加入する 10 齢を 56～74mm として加入量を推定した。なお、ABC 算定年の加入量は、その 2 年前の調査で推定された 42～56mm 群の個体数から、翌年の 56～74mm 群の個体数を算定して求めている。

ある年級群の N 年の個体数と N+1 年個体数の関係は、移入がない場合、 $N > N+1$ となるはずであるが、Q03 では、42～56mm 群はこの群が成長したと考えられる翌年の 56～74mm 群の数よりも少ない場合が多かった。このため従来の資源評価では、両群の個体数の関係式を求めて ABC 算定年の加入量を推定していた。

QCW で推定した 42～56mm (9 齢) と翌年の 56～74mm (10 齢) の個体数の関係を見ると、雄雌ともに、2004 年 8 齢及び 2006 年 6 齢が成長した 9 齢、10 齢で個体数の関係は $N > N+1$ 年となっており、QCW 導入により、同一年級の年齢間での個体数の逆転はある

程度改善されたと考えられた。このことから、後述する ABC 試算において、ABC 算定年の加入量は、2年前の 42~56mm (9 齢) をもとに $M=0.35$ で算定した値を用いた。

・ Q03 との推定値の比較

参考のため、資源量、加入量、SSB、F 値及び漁獲割合について、採集効率 0.3 で推定した数値と甲幅別採集効率で推定した数値 (2011 年までの値) を補足表 5~9 に示した。加入前の個体も含めた QCW によって推定した全体の資源量は、雌雄とも尾数では Q03 に近い値となっており、網全体の採集効率の平均像としては、妥当な結果が得られたと考えられる。重量では、大型個体の個体数が少なくなることから、Q03 の 60~70%程度となった (補足表 5)。

漁獲対象資源では、QCW による推定値は雄で尾数、重量とも Q03 の 50%程度、雌は若干高めで 50 数%となった (補足表 6)。

加入前の資源尾数では、雌雄ともに 2 年後に加入する 42~56mm は QCW の方が多く、1 年後に加入する 56~74mm では QCW による推定値の方が少なくなっている (補足表 7)。

漁獲対象資源がおよそ半分の値に改訂されたことにより、Q03 では、0.1~0.4 程度であった F は QCW による推定値では、0.2~0.8 となった。漁獲割合も 2 倍程度の値になった (補足表 8)。

参考及び引用文献

- Munro PT, Somerton DA. (2001). Maximum likelihood and non-parametric methods for estimating trawl footrope selectivity. ICES J. Mar. Sci. 58, 220-229.
- Somerton, D. A. and R. S. Otto (1999). Net efficiency of a survey trawl for snow crab *Chionoecetes opilio* and Tanner crab *C. bairdi*. Fish. Bull. 97, 615-625.
- 上田祐司・伊藤正木・服部 努・成松庸二・藤原邦浩・北川大二 (2007). 東北地方太平洋岸沖におけるズワイガニの甲幅組成解析により推定された成長. 日水誌 73, 487-494.
- Weinberg KL, Otto RS, Somerton D. A. (2004). Capture probability of a survey trawl for red king crab (*Paralithodes camtschaticus*). Fish. Bull. 102, 740-749.

補足図 6. 採集効率調査用トロール網の模式図 (Somerton and Otto 1999 を改変)

補足図 7. 得られたモデルからの予測値

破線は、100 回曳網を行った際に 95 回の曳網が収まる範囲 (推定された σ に ± 1.96 を掛けた値を、式 5 の Z_k に代入して描いた。

白抜ききの点は実データ、y 軸値は 0 が補助網に入ったカニ、1 が通常網に入ったカニを表す。点の位置が固まらないように上下に少し散らせた。

補足図 8. ズワイガニ未成熟個体の甲幅組成分解結果の例 (2010年調査結果)

補足図 9. 年齢分解によって推定したズワイガニ雄未成熟の成長
数字は脱皮齢を青線は、現在の資源評価で ABC 算定年の資源量推定に用
いる甲幅区分の境界を示す

補足図 10. 年齢分解によって推定したズワイガニ雌未成熟の成長
 数字は脱皮齢を青線は、現在の資源評価で ABC 算定年の資源量推定の際
 に用いている甲幅区分の境界を示す

補足表 3. 推定式より求めた甲幅別採集効率

CW(mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	1230
QCW	0.02	0.04	0.09	1.17	0.28	0.41	0.52	0.59	0.63	0.65	0.66	0.66

補足表 4. 未成熟ズワイガニの脱皮齢期と平均甲幅

雄	6	7	8	9	10	11	12
2004	18.9	28.8	37.1	49.1	63.7	80.4	
2005	20.2	30.0	38.4	50.8	61.6	76.7	90.7
2006	19.0	27.6	37.0	51.0	63.7	77.8	90.0
2007	18.8	25.9	36.1	48.5	65.8	78.7	89.8
2008	19.4	30.4	37.5	46.3	61.7	79.1	91.1
2009	21.2	28.5	38.1	47.7	60.8	76.2	92.6
2010	20.2	28.6	36.8	49.8	63.0	78.0	90.0
2011	20.6	27.5	35.8	48.0	62.8	78.0	86.9
上田他(2007)	—	27.4	37.7	50.2	64.3	79.0	93.1

雌	6	7	8	9	10
2004	19.8	28.8	36.8	48.8	63.8
2005	22.1	30.1	38.6	52.3	65.0
2006	19.7	28.8	38.1	51.3	64.3
2007	18.6	25.6	35.9	48.2	64.2
2008	18.3	27.7	36.9	47.5	63.0
2009	20.9	29.0	37.7	47.9	61.9
2010	22.0	28.2	38.3	51.2	63.9
2011	17.8	26.5	35.7	49.4	63.8
上田他(2007)	—	30.1	39.8	51.2	63.9

補足表 5. 採集効率別のズワイガニ全体の推定資源量

全資源(千尾、トン)		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
雄																
尾数	Q03	7,150	8,239	9,971	9,524	7,322	11,385	13,948	13,908	19,263	21,956	37,691	25,430	17,490	20,636	17,854
	QCW	6,395	10,804	7,183	5,261	9,155	9,401	11,243	14,003	28,005	27,325	29,281	19,571	16,987	22,210	20,151
	QCW/Q03(%)	85.1	146.6	74.0	56.0	118.4	84.8	83.8	97.6	130.0	94.8	80.6	78.4	95.0	107.8	105.1
重量	Q03	981	1,103	1,625	2,600	968	1,770	2,046	1,615	2,043	2,559	5,569	4,284	2,418	2,497	2,096
	QCW	597	689	925	1,289	604	1,006	1,161	1,029	1,477	2,074	3,159	2,366	1,452	1,531	1,436
	QCW/Q03(%)	59.3	63.6	57.4	50.0	60.6	56.9	60.2	62.9	65.1	64.5	57.3	56.0	60.2	62.6	63.6
雌																
尾数	Q03	7,380	7,607	12,366	5,846	5,945	12,036	12,278	13,331	16,420	26,226	20,375	12,197	16,052	18,260	13,750
	QCW	7,627	8,616	10,398	3,735	7,326	9,681	10,101	13,129	24,077	25,561	18,346	12,177	16,517	18,318	15,038
	QCW/Q03(%)	98.5	116.9	84.2	63.8	114.9	81.8	88.9	95.9	133.3	96.9	92.7	100.0	102.5	101.3	100.6
重量	Q03	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	QCW	474	530	898	434	365	814	813	841	1,039	1,538	1,295	714	985	1,088	851
	QCW/Q03(%)	64.0	61.3	58.6	56.4	69.3	61.1	66.4	66.0	73.9	72.2	66.6	74.8	69.6	69.0	72.8

補足表 6. 採集効率別のズワイガニ漁獲対象資源量

漁獲対象資源(千尾、トン)

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
雄																
尾数	Q03	1,624	2,197	3,308	6,163	2,135	2,699	3,415	2,312	3,539	3,578	9,688	9,438	3,820	3,707	3,509
	QCW	816	1,025	1,653	2,959	1,007	1,291	1,571	1,117	1,898	1,936	4,721	4,538	1,825	1,780	1,894
	QCW/Q03(%)	50.1	48.6	50.4	48.2	47.5	47.8	47.2	48.5	48.7	48.0	48.7	48.1	47.9	48.3	48.5
重量	Q03	519	771	947	2,196	657	881	1,083	658	951	1,132	2,522	2,756	1,290	1,046	992
	QCW	260	357	469	1,043	307	417	489	315	506	600	1,220	1,313	608	498	537
	QCW/Q03(%)	50.0	48.0	50.0	48.0	47.0	47.0	47.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0	48.0	48.0
雌																
尾数	Q03	2,902	4,760	8,163	4,299	2,308	5,398	7,105	5,706	4,630	4,996	7,124	2,795	6,864	5,688	3,957
	QCW	1,556	2,559	4,457	2,350	1,239	2,979	3,908	3,239	2,876	2,749	4,017	1,574	3,940	3,143	2,375
	QCW/Q03(%)	54.3	54.0	54.6	54.5	53.5	57.6	59.9	57.0	55.7	57.6	56.6	58.1	57.9	55.9	57.3
重量	Q03	446	744	1,237	641	360	748	971	777	665	723	1,002	383	888	803	536
	QCW	236	394	667	346	191	410	531	434	407	392	557	213	498	437	319
	QCW/Q03(%)	53.4	52.8	53.9	53.9	52.8	55.3	57.1	55.9	54.5	54.7	55.5	56.4	56.4	55.0	56.1

補足表 7. 加入前の資源尾数(千尾)

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
雄	42-56mm	1,377	878	1,838	267	1,878	1,863	2,551	2,345	2,571	6,352	3,867	4,248	3,083	3,671	5,110
	QCW	1,633	936	1,931	226	2,220	1,991	4,260	2,681	3,027	8,547	4,554	5,542	3,517	3,867	5,919
	56-74mm	2,383	917	2,788	1,718	459	3,320	4,900	5,523	4,359	6,773	13,825	5,927	5,787	6,379	4,769
	QCW	1,602	609	1,833	1,101	305	2,155	3,248	3,651	3,160	6,532	8,690	3,932	3,927	4,006	3,328
雌	42-56mm	1,281	340	1,325	317	1,805	1,002	1,790	1,690	2,449	9,223	3,796	3,845	2,545	3,536	5,232
	QCW	1,370	422	1,567	324	2,243	1,304	2,219	1,916	3,104	9,797	4,307	4,533	2,993	3,789	5,629
	56-76mm	2,274	579	2,357	1,099	247	4,997	2,315	3,976	3,923	9,436	7,931	4,162	4,141	6,469	3,190
	QCW	1,542	378	1,482	722	149	3,117	1,485	2,654	2,791	6,413	5,141	2,789	2,878	4,074	2,267
雄	加入量		1,182	435	1,789	1,137	416	2,039	2,232	2,283	2,486	2,871	6,970	3,559	2,509	3,233
	QCW		740	273	1,072	685	242	1,220	1,414	1,464	1,667	2,614	4,171	2,157	1,631	1,910
雌	加入量		1,603	408	1,661	774	174	3,521	1,632	2,802	2,764	6,649	5,589	2,933	2,918	4,558
	QCW		1,086	266	1,045	509	105	2,196	1,047	1,870	1,967	4,519	3,623	1,966	2,028	2,871

補足表 8. 漁獲割合と F 値

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
漁獲割合(%)	QCW	60.7	25.7	13.1	7.7	24.2	17.8	26.8	17.6	13.3	15.0	9.3	16.0	19.8	17.0	0.1
	Q03	31.3	12.7	6.8	3.8	11.8	9.1	13.6	9.2	7.5	8.1	4.7	7.8	10.1	8.6	0.0
F 雄+雌	QCW	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
F 雄+雌	Q03	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
F 雄	QCW	1.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0
F 雄	Q03	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
F 雌	QCW	1.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.0
F 雌	Q03	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0

補足表 9. SSB (トン)

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Q03		221	469	861	433	224	503	593	514	445	484	682	200	606	551	402
QCW		63	206	430	210	97	252	268	256	252	236	347	72	313	276	240

補足資料 6 マダラによるズワイガニの捕食について

2011年3月以降の震災と原発事故により、ズワイガニ太平洋北部系群の漁獲の大部分を占める福島県の操業が休止した。その後2012年11月から試験操業が開始されたが、漁獲圧は大きく減少している。このことから、資源増加が期待されていたが、2012年、2013年の調査結果では、資源量は大きく減少し、今後の加入も少ない結果となった。この資源の減少要因については、移動、海洋環境等の影響等が考えられるが、良く分からないのが現状である。

震災全後での沖合底魚漁場で見られている顕著な変化は、マダラ資源の急増である。マダラによるズワイガニの捕食に関しては、ベーリング海における小型のズワイガニの捕食例(Livingston 1989)、大西洋マダラによる捕食状況(Chabot et al. 2008)、マダラの資源変動がエビ・カニ類などの大型ベントスの資源量に影響していること(Frank et al. 2005)などが報告されている。このことから、マダラによる捕食がズワイガニの資源量減少に係する可能性が考えられた。そこで、2013年底魚類資源量調査において、2歳以上のマダラを対象に胃内容物を調査した。

その結果、測定した1,905個体から空胃と反転を除く胃内容物が観察できた1,618個体のマダラのうち73個体からズワイガニが出現した。捕食率(ズワイガニを捕食していたマダラの割合)は約7%で、ズワイガニを捕食していたマダラ1個体あたりのズワイガニの被食個体数は約1.5個体であった。胃内容から出現したズワイガニの甲幅組成を見ると補足図11に示したように甲幅20~40mmが主体となっていた。甲幅測定が可能であったズワイガニを捕食後間もない調査日に捕食された個体と仮定し、1日あたりのズワイガニ被食個体数を大まかに算定してみると、2011年、2012年の2歳以上のマダラ資源尾数から、それぞれ約60万尾/日、470万尾/日となった。このことから、マダラによるズワイガニの捕食は資源減少の一因である可能性がうかがえた。この詳細は東北底魚研究34号に掲載予定である。

補足表 10. 2013年秋季のトロール調査におけるマダラの胃内容物調査結果

()内は甲幅測定可能な捕食後間もないと考えられるズワイガニについての数値

測定数	空胃・反転	胃内容物有	ズワイガニを捕食した個体数	出現したズワイガニの個体数	1個体あたりの捕食数	捕食率
1,905	287	1,618	73 (36)	106 (67)	1.45 (1.86)	6.6% (2.2)

引用文献

- Chabot, D., B. Sainte-Marie, K. Briand, and J. M. Hanson (2008) Atlantic cod and snow crab predator-prey size relationship into Gulf of St. Lawrence, Canada. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 363, 227-240.
- Frank, K., B. Petrie, J. S. Choi, and W.C Leggett (2005) Trophic cascades in a formerly cod-dominant ecosystem. *Science*, 308, 1621-1623.

Livingston, P. A.(1989) Interannual trends in Pacific cod, *Gadus macrocephalus*, predation on three commercially important crabs species in the eastern Bering Sea. Fish. Bull., 87,807-827.

補足図 11. 2歳以上のマダラの胃内容物から出現したズワイガニの甲幅組成

補足資料 7 将来予測における加入量について

2013年までの資源評価では、1998年～調査実施年の数値から資源量推定値が過小推定の可能性がある2008年の値を除いた予想加入量の平均（決定論的予測）及びランダムリサンプリング値（確率論的予測）を用いていた。しかし、漁業が休止している状態で2012、2013年と予想加入量と資源量が大きく減少し、甲幅組成からも今後の加入が少ない可能性がある。このため、将来予測を行う際には低めの加入量を与えるべきであると考えた。

予想加入量は、2008年以降減少傾向、2014年に急減してその後は低い値で横ばいとなっている。

2014年以降の低い加入水準が数年は続くことを想定し、決定論的将来予測に用いる加入量を2014～2016年の予測値（雌雄別）の平均とした。また、加入の不確実性を考慮した確率論的予測では、この加入量の平均値に、標準偏差V、平均を1とした正規乱数を乗じた値をとした。ここで、標準偏差Vは日本海系群に準じ、加入前2年の資源尾数と加入前1年の資源尾数の比率の平均及び標準偏差から求めたCVを用いた。尾数比率の計算には雌雄ともに加入が減少傾向となった2009年以降の加入量予測値を用いた。

補足表 11. トロール調査による加入2年前と加入1年前の同一年級の個体数比

甲幅 年	42-56mm		個体数比	42-56mm 56-76mm		個体数比
	雄	雄		雌	雌	
1997	1,633	1,602		1,370	1,542	
1998	1,145	609	0.37	422	378	0.28
1999	1,979	1,833	1.60	1,567	1,482	3.51
2000	255	1,101	0.56	324	722	0.46
2001	2,511	305	1.20	2,243	149	0.46
2002	2,012	2,155	0.86	1,304	3,117	1.39
2003	2,942	3,248	1.61	2,219	1,485	1.14
2004	2,634	3,651	1.24	1,916	2,654	1.20
2005	3,327	3,160	1.20	3,104	2,791	1.46
2006	9,568	6,532	1.96	9,797	6,413	2.07
2007	4,409	8,690	0.91	4,307	5,141	0.52
2008	5,139	3,932	0.89	4,533	2,789	0.65
2009	3,570	3,927	0.76	2,993	2,878	0.63
2010	3,982	4,006	1.12	3,789	4,074	1.36
2011	5,871	3,328	0.84	5,629	2,267	0.60
2012	1,474	2,122	0.36	1,363	1,956	0.35
2013	1,485	1,038	0.70	1,219	841	0.62
2009～2013平均			0.76			0.71
SD			0.27			0.38
CV			0.36			0.54

※個体数比はN年の42-56mmに対するN+1年の56-76mm

補足資料 8 モデルの検証

太平洋北部系群では、10～11月のトロール調査で得られた漁獲対象サイズの現存量、翌年及び翌々年の加入予定サイズの現存量から2年先までの資源量を推定し、ABCを算定している。1997～20112年のトロール調査データを用いて、N年のトロール調査から推定された漁獲対象資源量（観測値）とそのN-1年及びN-2年のトロール調査から推定された漁獲対象資源量をもとにして加入量、漁獲や自然死亡による減耗を考慮して計算したN年の漁獲対象資源量（以下、「計算値」という）との比較を行い、その整合性について検討した。

雄では2004～2006年、2008～2011、雌は2005年以降の計算値は観測値よりも大きい傾向が認められ、ABC算定の基礎となる2年後の漁獲対象資源量が過大に見積もられている可能性がある。震災前の雄は2009年、2010年、雌は2008年で観測値と計算値との差が特に大きい（補足図12）。震災後では雄の2012年は観測値と計算値の差は小さいが、2013年は観測値が計算値の3分の1程度の低い値であった。雌は3年連続して観測値は計算値より小さく、特に2012年はその差が顕著である。

この傾向は甲幅別採集効率0.3でも殆ど変わらなかったことから、採集効率以外の要因が関係していると考えられる。

いまのところ、要因については把握できていないが、加入までの死亡率の変化などに着目して検討を進めることが重要と考えられた。

補足図 12. 資源量推定値の比較 上段：雄 下段：雌
 観測値：その年のトロール調査により推定された資源量（千尾）及び95%信頼区間
 計算値1：前年のトロール調査結果から計算した資源量（千尾）
 計算値2：前々年のトロール調査結果から計算した資源量（千尾）