

## 平成 26（2014）年度イトヒキダラ太平洋系群の資源評価

責任担当水研：東北区水産研究所（成松庸二、伊藤正木、服部 努、柴田泰宙）

参 画 機 関：北海道区水産研究所、青森県産業技術センター水産総合研究所、岩手県水産技術センター、宮城県水産技術総合センター

## 要 約

本系群の日ロ両国の漁船による漁獲量は、2000 年に 48 千トン記録したが、以降減少し、2013 年には東日本大震災の影響もあり 16 千トンとなっている。トロール調査で求めた東北海域と北海道太平洋沿岸の現存量、沖合底びき網漁業およびロシア船の CPUE から、資源水準は中位、資源動向は横ばい傾向にあると考えられる。イトヒキダラは成長が遅く成熟まで 5 年以上を要し、一度親魚が減少してしまうと回復するのが難しい種であることから、親魚量を維持することが資源管理において最も重要である。平成 26 年度 ABC 算定のための基本規則 2-1) に基づき ABC を算定した。資源水準と現存量の変動傾向から得た式（平松（2004）の 4 式）を 2008～2010 年の平均漁獲量に乗じたものを ABClimit とし、ABCtarget=ABC limit ×  $\alpha$  とした。

水準：中位 動向：横ばい

|           | 2015 年 ABC | 資源管理基準                                           | F 値 | 漁獲割合 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|-----|------|
| ABClimit  | 27 千トン     | $0.9 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.11$           | —   | —    |
| ABCtarget | 22 千トン     | $0.8 \cdot 0.9 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.11$ | —   | —    |

ABC は 1,000 トン未満で四捨五入した。

| 年    | 資源量（トン） | 漁獲量（千トン） | F 値 | 漁獲割合 |
|------|---------|----------|-----|------|
| 2012 | —       | 17       | —   | —    |
| 2013 | —       | 16       | —   | —    |

年は暦年で、2013 年の漁獲量は暫定値である。

本件資源評価に使用するデータセットは以下のとおり

| データセット       | 基礎情報、関係調査など                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 年別漁獲量        | 県別漁獲統計（農林水産省）<br>太平洋北区 沖合底びき網漁業漁獲成績報告書（水産庁）<br>ロシア漁獲月報集計（水産庁）<br>月別体長組成（宮城県）<br>・市場測定 |
| 資源量指数<br>現存量 | 底魚類資源量調査（東北海域、10～11月、水研セ）<br>底魚類共同資源調査（北海道太平洋岸、6～7月、水研セ）<br>・着底トロール                   |

## 1. まえがき

イトヒキダラはすり身原料として利用、加工され、北海道および東北地方の沿岸で主に沖合底びき網により漁獲されている。本種の漁獲量は 1980 年代まで少なかったが 1990 年代に入りスケトウダラの代替資源として利用されるようになった。それとともに主対象魚として漁獲されるようになり、それ以降、本種の漁獲データが集計されるようになった。

近年、イトヒキダラはロシアに対して漁獲が割り当てられている。日本水域内のロシア船の漁獲量は、1998 年まで 7 千トン以下だったが、1999 年には 19 千トンと増加し、2000～2007 年には 24～27 千トンで推移してきた。その後、2008～2010 年には 20 千トンを下回った。2011～2013 年には東日本大震災の影響もあり、9 千～17 千トンになった。このように国内外における注目度が高くなってきており、漁獲量にも減少の兆しが見られていることから、資源の動向には注意を払う必要がある。

## 2. 生態

### (1) 分布・回遊

イトヒキダラは、駿河湾から東北・北海道太平洋沿岸を経て、オホーツク海およびベーリング海西部までの陸棚斜面域（水深約 300～1500 m）に分布する。中でも東北・北海道太平洋沿岸から千島列島周辺の水深 300～800m に高密度に分布し（Pautov 1980、服部ほか 1997）、日本およびロシアの漁場となっている（図 1）。本州東方の外洋域（黒潮～黒潮続流域）で産み出された卵はふ化後、数ヶ月の間は表中層生活を送り、北へと移送される。その後の稚魚は、東北海域の陸棚斜面域へと移動し、そこで若齢期を過ごす。成魚になると北日本以北の広い海域に分布するようになる。東北海域では分布水深帯に雌雄差があることが知られ、500m 以浅には雄が多く、500m 以深には雌が多い。また、底層から近底層（底から数 10m）に広く分布する。

### (2) 年齢・成長

イトヒキダラの年齢は耳石（扁平石）に見られる透明帯を数えることによって査定することができる（野別 2002）。東北海域のイトヒキダラの成長は図 2 のとおりで、8 歳ごろまでは 1 年当たり 5cm ほど成長する。その後、雄はほとんど成長せず、最大 47cm 前後であるが、雌はわずかながらも成長を続け、最大 57cm 程度に達する。また、これまでに確認された最高年齢は雄で 18 歳、雌で 24 歳であり、寿命にも性差がある可能性が高い。成長式は以下のとおりである。

雄： $SL=491(1-\exp(-0.192(t+0.261)))$

雌： $SL=601(1-\exp(-0.126(t+0.449)))$

ここで SL は標準体長(mm)、t は年齢（年齢の起算日は 4 月 1 日）。

### (3) 成熟・産卵生態

本種は、2～4 月を中心に本州関東・東北南部沿岸から本州東方の外洋域（黒潮～黒潮続流域）で産卵する。生殖腺の組織観察から成熟年齢は雄で 5 歳以上、雌で約 7 歳以上であると推測されている（野別 2002）。また、一繁殖期に複数回産卵するものの、成熟に達した個体が必ずしも毎年産卵するわけではないことが示されている（野別 2002）。

#### (4) 被捕食関係

本種は、オキアミ類やカイアシ類などの甲殻類およびハダカイワシ科魚類を主に捕食する (Yamamura and Inada 2001)。索餌期は周年で、索餌場は分布する各海域である。また本種は、ムネダラなどの大型ソコダラ類およびオットセイやマッコウクジラ等の海産哺乳類に餌生物として利用されている (和田 1971、 Kawakami 1980、 本多ほか 2000)。

### 3. 漁業の状況

#### (1) 漁業の概要

日本におけるイトヒキダラの漁獲は 1970 年代から始まっていたが、当時の漁獲量は毎年 10 千トン以下であった。その後 1990 年代に入り本格的に漁獲されるようになった。本種は主に沖合底びき網漁業によって漁獲されており、太平洋北部 (青森県～茨城県沖) における漁獲は金華山海区で最も多い (図 3)。スケトウダラの代替で練り製品の原料として利用されており、漁獲圧はスケトウダラやその他魚類の漁獲状況によって変化する。

一方、ロシア船による漁獲は 1974 年に始まり、東北海域を中心に漁獲されていた (Kodolov and Pautov 1986)。また、ロシアに対し日本水域内における漁獲量が割り当てられており、2000 年以降はロシア船による漁獲量が増加し、日本船の漁獲量よりも多い。ロシア船は日本の排他的経済水域内で中層トロール網を用いて漁獲を行っている。2007 年にロシア船に同乗したオブザーバーからの報告によると、曳網は底から 45～60m 離れた近底層の水域で行われており、1 回の曳網は 4～10 時間で平均 7 時間程度とのことである。

#### (2) 漁獲量の推移

日本水域内における近年の日ロ両国漁船の漁獲量は 1992～1999 年には 22～38 千トンで推移していたが、2000 年には 48 千トンと過去最高を記録した。その後、2008 年までは 30 千トン以上漁獲されていたが、2009 および 2010 年にはそれぞれ 27 千トン、24 千トンと減少している。その後は東日本大震災の影響もあり、2011 年は 10 千トン、2012 年は 17 千トンおよび 2013 年は 16 千トンになっている (図 4、表 1)。

#### (3) 漁獲努力量

東北海域の沖底の漁獲の大部分を占める金華山および常磐海区の有漁網数の合計は、1999～2010 年には 6 千～13 千で推移している (図 5)。この値は同海区のマダラやスケトウダラの 1/4～1/6 程度であり、キチジやサメガレイといった漁獲量があまり多くない種よりも少ない。なお、2011～2013 年は東日本大震災の影響で 2 千～2.7 千網となっている。

日本の排他的経済水域内で中層トロール網を用いて漁獲を行っているロシア船の網数は、東北海域および道東海域ともに減少傾向にある。東日本大震災以降は特に道東海域での網数が減っている (図 6)。

### 4. 資源の状態

#### (1) 資源評価の方法

資源の水準および動向は、沖底およびロシア船の CPUE (有漁網数あたり漁獲量) とト

ロール調査による現存量推定値から判断した。1996 年以前の沖底漁獲成績報告書では本種はソコダラ類と合わせて集計されている。1997 年以降のイトヒキダラとソコダラ類の漁獲割合を見ると、イトヒキダラとソコダラ類の比率はおおむね 9:1 であるものの、年変動もあるため、その比率から過去のイトヒキダラのみを抽出することはできない。そこで、1996 年以前はソコダラ類を含む漁獲量を本種の漁獲量として扱った。

トロール網による底魚類資源量調査を実施し（2013 年の東北海域では水深 150～900m の計 113 点、2014 年の北海道太平洋沿岸では水深 350～900m の計 18 点、補足図 1）、面積－密度法を用いてイトヒキダラの現存量を推定した（遭遇率を含む採集効率は 0.256 とした）。襟裳以西では、刺網などの漁具が多く曳網できなかったため、道東海域の水深別分布密度に襟裳以西の海域面積を乗じたものを襟裳以西の水深別の現存量とし、その合計を襟裳以西の現存量とした。なお、調査の結果は、着底トロールによるものであり、海底から 4～5m までに分布するイトヒキダラの密度や体長組成を示している。これまでにイトヒキダラは海底より 20～50m ほど上方にも分布することが知られており(Yokota and Kawasaki 1990)、この着底トロール調査から本種の資源量を推定することは現状では困難である。そのため、調査で求めた値（ここでは「現存量」と表記する）は資源量の相対的な指標値とした。

## (2) 資源量指標値の推移

イトヒキダラは比較的最近になってから開発された資源であり、漁獲量の多い東北海域でも CPUE 値があるのは 1990 年以降である。1990 年以降でも、単価が安く分布水深帯も深いことから本種を対象とした網数は多くない。

主要な漁場である金華山と常磐海区合計の CPUE を見ると、1993、1994 年に一網あたり 1,000kg 以下に落ち込んだが、1997 年にかけて上昇した。その後は増減を繰り返し、2006～2010 年は 1,100～1,700kg で推移していたが、2011～2013 年は東日本大震災の影響で十分な漁獲がなかったこともあり、大幅に下落している（図 7）。

日本の排他的経済水域内で中層トロール網を用いて漁獲を行っているロシア船の CPUE は、東北海域では比較的安定しており、2010 年は 16.3 トン/網で平均よりも高かった（図 8）。2011 年は東日本大震災以降、9 月まで操業していなかった。10～12 月における CPUE は 20.2 トン/網と 2000 年以降で最も高くなっている（2001～2010 年 10～12 月の平均 CPUE±SD は 17.3±6.2）。また、2012 および 2013 年は周年に渡って操業しており、それぞれ 15.4 トン/網、16.5 トン/網で平均値に近い値になっている。なお、調査による現存量の推移については「(4) 資源量と漁獲割合の推移」で後述する。

## (3) 漁獲物の年齢組成の推移

水揚げ物の体長組成を見ると、小型個体はほとんど水揚げされていないことがわかる。漁獲対象となるのは体長 30cm 以上で、主対象となっているのは 37、38cm 前後からである（図 9）。また震災以前にはロシア船の漁獲物もほぼ 35cm 以上であり、40～50cm が主体であることがオブザーバーの報告から明らかになっている（未発表試料）。

成長式から推定すると体長 30cm の個体は 5 歳、37～38cm の個体は 7 もしくは 8 歳に相当し（図 2）、成魚が漁獲対象となっていると考えられる。

#### (4) 資源量と漁獲割合の推移

底魚類資源量調査の結果、東北海域のイトヒキダラ現存量は 2013 年 10～11 月時点で 39,240 トン (CV=0.145) と推定された。この値は過去 19 年で 15 番目に多い値となっている (表 2)。調査を行っている 1995～2013 年の現存量は 33～73 千トンで推移しており、変動は小さい。

1999 年以降、毎年 6～7 月に道東海域でトロール調査を行ってきたが、2011 年は東日本大震災で調査船が被災したため、調査を行うことができなかった。2013 年 6 月に行った調査では、道東海域の現存量は 50,150 トンと推定された。また襟裳以西の現存量は 41,404 トンと推定され、北海道太平洋沿岸における現存量は合わせて 91,554 トンと推定された。2014 年 6 月には、道東海域では 14,592 トン、襟裳以西では 9,746 トンで合計 24,338 トンと推定された。この現存量は、最近 5 年間では最も少なく、1999 年以降の 15 回の調査で 14 番目に多い (表 2)。

調査で得られた東北海域の体長組成の経年変化から、豊度の高い年級は数年に一度しか発生しないことが示された (2002 年、2003 年は続けて発生)。1996 年に発生した体長 5～12cm の個体は経年的に徐々に成長し、2003 年になってようやく親魚の集団に含まれた (補足図 2)。近年では 2009 年に 5～12cm の小型魚が出現した。2013 年には体長 25cm を中心とした山として、体長組成の中に見ることができる。このことからイトヒキダラの成長は遅く、数年に一度発生する豊度の高い年級が資源を支えていると考えられた。

#### (5) 資源の水準・動向

イトヒキダラは漁業の歴史が浅いことから、利用できる漁獲データは、本格的な漁獲が始まった 1990 年代以降のものである。そのため、1990 年以降の沖底およびロシア船の CPUE、さらに東北海域では 1995～2013 年の 19 年分、北海道太平洋沿岸では 1999～2014 年の 15 年分 (2011 年は未操業) の調査による現存量結果をもとに資源状態を判断した (表 1、表 2、図 7、図 8)。資源水準はそれぞれのパラメータの平均値に対する比率で求め、平均値を 100%とし、60%未満を低位、60 以上 140%未満を中位、140%以上を高位とした。

東北海域と北海道太平洋沿岸における現存量調査結果によると、1999～2010 年の現存量は 70 千トン～202 千トンで推移しており、2008 年の現存量が最も少なく、2010 年には 93 千トンとなりやや増加していた (表 2、図 10)。2013 年の現存量は 131 千トンで、1999～2013 年の現存量平均値の 105%であった。また、2011～2013 年の金華山海区と常磐海区の沖底の CPUE は 275～408kg/網で、平均値のわずか 21～30%であった (図 7)。一方、北海道、東北太平洋沿岸を合わせた 2013 年のロシア船の CPUE は 16.5 トン/網で、平均値の 107%であった (図 8)。2013 年は、沖底の CPUE が極めて低く、平均の 60%を下回ったが、漁獲量がわずか 400 トン足らずと震災以前の 1/20 程度であること、震災以前から狙い操業が少なかった上に東日本大震災の影響によりすり身の加工場などが被災し、さらに狙い操業が減ったことから震災以降の沖底 CPUE は資源量指標値としての代表性が低いと判断し、水準と動向の判断には用いなかった。トロール調査から求めた現存量およびロシア船の CPUE は平均程度か、それよりも高いレベルにあったことから、資源は中位水準と判断した。

また、最近 2009～2013 年の現存量とロシア船の CPUE は増加傾向であるがわずかなこと、2014 年北海道海域の現存量は減少傾向にあることから、資源は横ばい傾向にあると判断した。

## 5. 資源管理の方策

資源量や再生産関係は明らかになっておらず、加入量を決定する要因も明らかになっていない。成長が遅く成魚になるまで年数がかかることから、親魚を取り残すことが重要であると考えられる。

## 6. 2015 年 ABC の算定

### (1) 資源評価のまとめ

我が国におけるイトヒキダラの漁獲は、スケトウダラの漁獲状況や沖底の対象となる他の魚種の漁獲状況などに影響を受けやすい。また、底層に多く分布するものの、底層から離れた中底層にも分布すると考えられているため、着底トロール調査では絶対値としての資源量の把握が難しい。そこで、トロール調査による現存量の変化を資源量の指標値とし、ABC 算定ルール 2-1)を用いた。漁獲量には 2011 年の東日本大震災の影響を避けるため、2008～2010 年の平均値を用いた。その値にトロール調査による現存量の変化から求めた変化率を乗じて 2015 年の ABC を算定した。

### (2) ABC の算定

親魚を取り残すことを管理目標とし、漁獲量とトロール調査で求めた資源量指標値が使用できることから、平成 26 年度の基本規則 2-1)に基づいて ABC を算定した。

$$ABClimit = \delta_1 \times Ct \times \gamma_1$$

$$ABCtarget = ABClimit \times \alpha$$

ここで、 $\delta_1$  は係数である。中位水準であること、中位水準の幅を広く取っていることから ABC 算定のための基本規則に従い 0.9 とした。2011～2013 年の漁獲量は震災の影響で非常に少なかったため、 $Ct$  には 2008～2010 年における平均漁獲量(Cave3-yr)を用いた。 $\gamma_1$  は平松(2004)で示された管理方策( $\gamma_1 = (1+k(b/I))$ )とした。 $k$  は係数で標準値の 1 を採用した。 $b$  は資源量指標値の傾きで、ここでは 2010～2013 年の現存量の傾きを用いた。なお、 $b$  を求める際には、2013 年の東北地方太平洋沿岸の現存量と 2013 年の北海道太平洋沿岸の現存量の和を 2013 年の現存量としてあつかった。また、資源量指標値の平均値である  $I$  には調査で求めた現存量の過去 3 年間の平均値を用いた。以上の条件で ABC を求めると、

$$ABClimit = 0.9 \times 27,056 \times (1 + 1(13,402/117,599)) = 27,125 \text{ トン}$$

また不確実性を考慮した安全率  $\alpha$  を 0.8 とすると、

$$ABCtarget = 27,125 \times 0.8 = 21,700 \text{ トン}$$

となる。

|                       | 2015 年 ABC | 資源管理基準                                           | F 値 | 漁獲割合 |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|-----|------|
| ABC <sub>limit</sub>  | 27 千トン     | $0.9 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.11$           | —   | —    |
| ABC <sub>target</sub> | 22 千トン     | $0.8 \cdot 0.9 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.11$ | —   | —    |

ABC は 1,000 トン未満で四捨五入した。

### (3) ABC の再評価

| 昨年度評価以降追加されたデータセット | 修正・更新された数値                               |
|--------------------|------------------------------------------|
| 2012 年漁獲量確定値       | 2012 年漁獲量の確定                             |
| 2013 年漁獲量          | 2013 年漁獲量の暫定値                            |
| 2013 年現存量指標値の確定    | 2013 年現存量指標値の確定<br>ABC 算定規則 2-1) で用いる変化率 |

| 評価対象年 (当初・再評価)     | 管理基準                                   | ABC <sub>limit</sub><br>(千トン) | ABC <sub>target</sub><br>(千トン) | 漁獲量<br>(千トン) |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 2013 年 (当初)        | $1.0 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.13$ | 32                            | 25                             |              |
| 2013 年 (2013 年再評価) | $1.0 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.13$ | 32                            | 25                             |              |
| 2013 年 (2014 年再評価) | $1.0 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.13$ | 32                            | 25                             | 16           |
| 2014 年 (当初)        | $1.0 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.13$ | 31                            | 25                             |              |
| 2014 年 (2014 年再評価) | $1.0 \cdot \text{Cave3-yr} \cdot 1.13$ | 31                            | 25                             |              |

2013 年 (当初、2013 年再評価) および 2014 年 (当初) の ABC 値は、平成 26 年 7 月 4 日に訂正された ABC 算定のための基本規則に基づき計算した。2013 年の漁獲量は ABC の値に比べて少なかった。これは 2013 年の資源が少なかったと言うよりも、東日本大震災の影響で東北海域におけるイトヒキダラ狙いの漁業があまり行われなかったためであると考えられる。今後は、常磐海域での漁業の可否やすり身工場の復旧などの状況により、東北海域における日本船の漁獲は変化すると考えられる。

### 7. ABC 以外の管理方策への提言

イトヒキダラは成熟年齢に達しても毎年産卵に参加するわけではないことが明らかになっており (野別 2002)、実際に良い加入は不定期に複数年に 1 回程度の頻度で起きている。そのため加入動向には注意を払う必要がある。

### 8. 引用文献

- 服部 努・野別貴博・北川大二 (1997) 東北太平洋沿岸沖におけるイトヒキダラの分布様式. 東北底魚研究, 17, 38-46.
- 平松一彦 (2004) オペレーティングモデルを用いた ABC 算定ルールを検討. 日水誌, 70, 879-883.
- 本多 仁・山下秀幸・梨田一也・阪地英男 (2000) 大陸斜面における底魚類の分布と食物

- 関係. GSK 底魚部会報, 3, 23-33.
- Kawakami, T. (1980) A review of sperm whale food. Sci. Rep. Whales Res. Inst., 32, 199-218.
- Kodolov, L. S. and G. P. Pautov (1986) ソ連の水産研究, (25) 太平洋の生物資源－イトヒキダラ. (高昭宏訳 (1988) 水産の研究, 34, 90-93.) .
- 野別貴博 (2002) イトヒキダラ *Laemonema longipes* (Schmidt) の生活史および生態に関する研究. 北海道大学博士論文, 145pp.
- Pautov, G. P. (1980) Distribution and biology of *Laemonema* (*Laemonema longipes* Schmidt, 1938). *Izv. Tikhookean, NII Ryb. Khoz-va i okeanografii.*, 104, 157-162.
- 田中昌一 (1960) 水産生物の Population Dynamics と漁業資源管理. 東海区水研報, 28, 1-200.
- 和田一雄 (1971) 三陸沖のオットセイの食性について. 東海区水研報, 64, 1-37.
- Yamamura, O. and T. Inada (2001) Importance of micronecton as food of demersal fish assemblages. Bull. Mar. Sci., 68, 13-25.
- Yokota, M. and T. Kawasaki (1990) Population biology of the forked hake, *Laemonema longipes* (Schmidt), off the eastern coast of Honshu, Japan. Tohoku J. Agri. Res., 40, 65-80.




図 1. イトヒキダラの分布




図 2. イトヒキダラの雌雄の成長




図 3. 2012 年の漁獲量分布 (トン)




図 4. イトヒキダラの漁獲量と CPUE  
2013 年は暫定値。




図 5. 沖底による網数の経年変化




図 6. ロシア船の網数




図 7. 常磐および金華山海区の沖底による CPUE の経年変化 破線は高中位と中低位の境界を示す。




図 8. ロシア船の CPUE の経年変化 破線は高中位と中低位の境界を示す。




図 9. 宮城県石巻港に水揚げされたイトヒキダラの体長組成 (cm)




図 10. イトヒキダラ太平洋系群の現存量の時系列変化  
 横線は水準の境界を示す。  
 2011 年および 2014 年はそれぞれ北海道海域および東北  
 北海域の調査はできていない。

表1. 日本周辺におけるイトヒキダラの漁獲量の経年変化（単位：トン）

| 漁獲量  |        |        |           |        |
|------|--------|--------|-----------|--------|
| 年    | 東北     | 北海道    | ロシア（日本水域） | 計      |
| 1989 | 1,619  | -      | 4,914     | 6,533  |
| 1990 | 9,192  | -      | 3,500     | 12,692 |
| 1991 | 27,029 | -      | 3,999     | 31,028 |
| 1992 | 7,758  | 14,530 | 6,225     | 28,513 |
| 1993 | 6,882  | 13,942 | 4,978     | 25,802 |
| 1994 | 5,498  | 9,061  | 7,034     | 21,593 |
| 1995 | 12,427 | 20,819 | 2,104     | 35,350 |
| 1996 | 9,381  | 15,272 | 0         | 24,653 |
| 1997 | 19,556 | 11,000 | 0         | 30,556 |
| 1998 | 14,799 | 6,647  | 7,073     | 28,519 |
| 1999 | 9,583  | 9,890  | 18,624    | 38,097 |
| 2000 | 21,216 | 2,569  | 24,287    | 48,072 |
| 2001 | 15,268 | 3,096  | 26,998    | 45,362 |
| 2002 | 9,781  | 2,754  | 24,655    | 37,190 |
| 2003 | 12,438 | 1,060  | 24,654    | 38,152 |
| 2004 | 8,333  | 478    | 24,145    | 32,956 |
| 2005 | 11,624 | 294    | 26,217    | 38,135 |
| 2006 | 14,747 | 472    | 26,271    | 41,490 |
| 2007 | 13,391 | 517    | 25,562    | 39,470 |
| 2008 | 10,185 | 72     | 19,845    | 30,102 |
| 2009 | 10,526 | 113    | 16,008    | 26,647 |
| 2010 | 6,637  | 40     | 17,489    | 24,166 |
| 2011 | 730    | 3      | 9,499     | 10,232 |
| 2012 | 1,035  | 9      | 15,913    | 16,957 |
| 2013 | 405    | 82     | 15,806    | 16,293 |

注1) 北海道漁獲量は北海道沖合底曳網漁業漁場別漁獲統計年報による。

注2) 日本水域内ロシア漁獲量は水産庁資料による。

注3) 東北漁獲量は1992-1996年は主要港水揚量、1989-1991年および1997年以降は太平洋北区沖底漁場別漁獲統計資料による。

注4) 1989-1991年の東北漁獲量は他のソコダラ類も若干含む。

表2. 日本周辺におけるイトヒキダラの現存量の経年変化（単位：トン）

| 現存量  |        |         |           |         |
|------|--------|---------|-----------|---------|
| 年    | 東北     | 北海道（道東） | 北海道（襟裳以西） | 計       |
| 1995 | 40,671 | -       | -         | -       |
| 1996 | 40,757 | -       | -         | -       |
| 1997 | 72,813 | -       | -         | -       |
| 1998 | 38,791 | -       | -         | -       |
| 1999 | 46,154 | 72,382  | 48,222    | 166,758 |
| 2000 | 53,827 | 54,871  | 38,936    | 147,634 |
| 2001 | 36,979 | 70,448  | 39,708    | 147,135 |
| 2002 | 43,437 | 35,664  | 19,333    | 98,434  |
| 2003 | 46,515 | 18,440  | 34,187    | 99,142  |
| 2004 | 55,032 | 44,387  | 48,848    | 148,267 |
| 2005 | 46,589 | 61,155  | 18,882    | 126,626 |
| 2006 | 71,054 | 41,828  | 88,887    | 201,769 |
| 2007 | 32,958 | 37,688  | 32,528    | 103,174 |
| 2008 | 50,185 | 11,159  | 9,078     | 70,422  |
| 2009 | 35,783 | 34,020  | 18,646    | 88,449  |
| 2010 | 43,253 | 32,340  | 17,332    | 92,925  |
| 2011 | 47,641 |         |           |         |
| 2012 | 43,534 | 46,645  | 38,900    | 129,079 |
| 2013 | 39,240 | 50,150  | 41,404    | 130,794 |
| 2014 |        | 14,592  | 9,746     |         |

注1) 現存量はトロール調査（採集効率＝0.256）により算出した。ただし2005および2006年の北海道は異なる網を用いたため採集効率0.45で算出。


注2) 1999、2000年の襟裳以西現存量は海域面積に道東の水深別分布密度を乗じて推定した値。

注3) 2001年の襟裳以西現存量の600m以深は調査結果、600m以浅は海域面積に道東西部の水深別分布密度を乗じて推定した値。

注4) 2002年以降の襟裳以西現存量の600m以深は調査結果、600m以浅は海域面積に道東西部の水深別分布密度を乗じて推定した値。

## 補足資料 1

データと資源評価の関係を示すフロー



## 補足資料 2

## 資源計算方法

イトヒキダラ太平洋系群の現存量は、調査船による着底トロール調査の結果（補足資料 3）を用いた面積－密度法により行われている。船上では漁獲されたイトヒキダラの尾数と重量を測定した。東北海域を対象とした調査では北緯 38°50′で調査海域を南北に分け、北海道太平洋沿岸では東経 143°15′で海域を東西に分けた。100～200m、200～300m、300～400m、400～500m、500～600m、600～700m、700～800m および 800～1,000m の 8 水深帯、16 層に海域を層化した。南北もしくは東西および水深帯で層化した層 (i) ごとに各調査点 (j) における網着底から網離底までの距離を求め、それを曳網距離として用いた。オッターレコーダー（フルノ社製、CN-22A）でオッターボード間隔を測定し、漁具構成から得られたオッターボード間隔と袖先間隔の比 (1 : 0.258) により袖先間隔を推定し、曳網距離に袖先間隔を乗じて i 層 j 地点の曳網面積 ( $a_{ij}$ ) を求めた。i 層 j 地点の漁獲重量あるいは漁獲尾数 ( $C_{ij}$ ) を  $a_{ij}$  で除し、i 層 j 地点の密度 ( $d_{ij}$ ) を算出し、その平均を i 層における密度  $d_i$  とした。なお、 $n_i$  は i 層の調査地点数を表す。

$$d_{ij} = \frac{C_{ij}}{a_{ij}} \quad (1)$$

$$d_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} d_{ij} \quad (2)$$

さらに、i 層の平均密度 ( $d_i$ ) に i 層の海域面積 ( $A_i$ ) を乗じ、i 層の現存量あるいは現存尾数 ( $B_i$ ) を求め、これらを合計することにより東北海域および北海道太平洋沿岸の現存量あるいは現存尾数 (B) とした。

$$B_i = A_i \cdot d_i \quad (3)$$

$$B = \sum B_i \quad (4)$$

現存尾数については、体長 1 cm ごとの計算も行い、海域全体の年齢別体長組成を求めた。また、採集効率には 0.256 を用いた。

i 層の密度の標準偏差 ( $SD_{di}$ ) を求め、 $n_i$  と  $A_i$  により i 層における現存量あるいは現存尾数の標準誤差 ( $SE_{Bi}$ ) を計算し、調査海域全体における資源の標準誤差 (SE) および変動係数 (CV, %) を下式により求めた。なお、ここで得られる CV とは現存量および現存尾数の指標値に対する値であり、採集効率の推定誤差は含んでいない。

$$SE_{B_i} = \frac{A_i \cdot SD_{d_i}}{\sqrt{n_i}} \quad (5)$$



$$SE = \sqrt{\sum SE_{B_i}^2} \quad (6)$$

$$CV = \frac{SE \times 100}{B} \quad (7)$$


### 補足資料 3

#### 調査船調査の経過及び結果

若鷹丸による底魚類資源量調査ならびに底魚類共同資源調査は、それぞれ秋季 (10～11 月) ならびに夏季 (6～7 月) に着底トロールを用いて実施されている。これらの調査で使用している着底トロール網の構成は、袖網長 13.0m、身網長 26.1m、網口幅が 5.4m であり、コッドエンドの長さは 5.0m である。コッドエンドは 3 重構造となっており、内網の目合が 50mm、外網の目合が 8mm 角、すれ防止用の最も外側を覆う網の目合が 60mm であり、小型個体も外網により採集可能な構造となっている。1 回の曳網時間は原則として 30 分間とし、全ての曳網は日の出から日没までの間に船速 2.5～3.5 ノットで行われている。船上で各々の曳網で採集されたイトヒキダラの尾数と重量を計数・計量した後、体長を計測している。トロール調査の調査点と現存量で引き延ばした漁獲物の体長組成を示した。



補足図 1. 北海道太平洋沿岸と東北海域の調査点図




補足図2. 東北海域（左）および北海道太平洋沿岸（右）の調査で漁獲されたイトヒキダラの体長組成


補足資料 4

採集効率と現存量ならびに現在の漁獲圧


イトヒキダラは必ずしも底層のみに生息するわけではなく、底から浮いていることも多い。この広範囲に広がる垂直的な分布域をトロール網だけではカバーできないため、トロール調査による本種の現存量推定が困難になっている。本評価では、底層域で得られた個体の密度と一般に知られている採集効率( $Q=0.256$ )をもとに現存量指標値を求めている。底から浮いた個体がいる場合、底に依存している種に比べて遭遇率が低くなる。ここでは遭遇率も加味したものを採集効率( $Q$ )とし、 $Q$ を変化させたときの現存量を求めた。また、寿命が20年前後であることから、自然死亡を田内・田中の式(田中1960)から0.125とし、現存量、自然死亡および漁獲量から漁獲方程式を用いて探索的に漁獲係数 $F$ を求めた。その結果、1999年から2013年の現存量は、 $Q=0.256$ では7万～20



補足図 3. 採集効率  $Q$  を変化させたときの現存量変化



補足図 4. 採集効率  $Q$  を変化させたときの漁獲係数 ( $F$ ) の変化




補足図 5. 等漁獲量曲線 (左＝雌、右＝雄)  
漁獲開始年齢を7歳とし、採集効率 ( $Q$ ) を0.2および0.256としたときの2013年の $F$ 値を図中に示した。

万トンであったのに対し、 $Q=0.15$  では 12 万トン～34 万トン、 $Q=0.20$  では 9 万トン～26 万トンとなる（補足図 3）。底層域と底層よりも上に分布する個体の比率は明らかになっていないが、仮に  $Q=0.20$ （浮いている個体の割合は 14%）から  $Q=0.15$ （同 35%）とすると、1999 年から 2013 年の現存量はそれぞれ 9 万トン～26 万トン（ $Q=0.20$ ）、12 万～34 万トン（ $Q=0.15$ ）となる（補足図 3）。漁獲係数（ $F$ ）の値も同時に変化し、1999 年から 2013 年の  $F$  は、 $Q=0.256$  では  $0.26 \sim 0.57$ （平均 $\pm$ SD= $0.37 \pm 0.14$ ）であったのに対し、 $Q=0.20$  では  $0.20 \sim 0.42$ （ $0.28 \pm 0.098$ ）、 $Q=0.15$  では  $0.14 \sim 0.30$ （ $0.20 \pm 0.068$ ）であった（補足図 4）。

雌雄の等漁獲量曲線を補足図 5 に示した。YPR は、漁獲開始年齢に伴い大きく変化する。前述のようにイトヒキダラが本格的に漁獲され始めるのは体長 35cm の 7 歳前後であると考えられる。仮に調査の採集効率を 0.2 とした場合、2013 年の  $F$  は 0.109 であり、そのときの加入量当たり漁獲量は雌雄ともに  $F_{max}$  よりも低く、現状の資源を余裕を持って漁獲しているといえる。また、採集効率を 0.256 とすると 2013 年の  $F$  は 0.142 となり、その場合でも  $F_{max}$  を下回っている。

補足図 6 に初回成熟年齢を 7 歳としたときの等%SPR 曲線を示した。仮に調査の採集効率を 0.2 および 0.256 とした場合、2013 年の%SPR は 46.9% および 39.1% であり、いずれの場合でも現状の漁獲圧は十分に余裕を持っていると判断される。

2013 年の資源状況で 7 歳から漁獲に加入と仮定し、 $F_{30\%SPR}$  および  $F_{20\%SPR}$  で漁獲したときの漁獲量を推定した。 $Q$  を 0.2 とすると、 $F_{30\%SPR}$  および  $F_{20\%SPR}$  となる漁獲圧では、漁獲量はそれぞれ 28,199 トンおよび 41,385 トンと推定される。また、 $Q$  を 0.256 としたときの  $F_{30\%SPR}$  および  $F_{20\%SPR}$  では、それぞれ 22,030 トンおよび 32,331 トンと推定される。



補足図 6. 等%SPR 曲線

漁獲開始年齢を 7 歳とし、採集効率 ( $Q$ ) を 0.20 および 0.256 としたときの 2013 年の  $F$  値を図中に示した。