

平成17年度資源評価票(ダイジェスト版)

標準和名 マアナゴ

学名 *Conger myriaster*



系群名 伊勢・三河湾

担当水研 中央水産研究所




生物学的特性

寿命: 不明
 成熟開始年齢: 不明、雌雄とも成熟個体が見つかっていない
 産卵期・産卵場: 東シナ海等の我が国の南方海域が産卵場と想定されている、産卵期は不明
 索餌期・索餌場: 周年、伊勢・三河湾
 食性: 小型の底生生物、エビ類、魚類、軟体類など、成長につれ多様化
 大型化
 捕食者: 不明



漁業の特徴


伊勢・三河湾における漁獲は主として、小型底びき網漁業、かご漁業により行われている。伊勢湾の三重県海域での小型底びき網の漁場は、湾奥部と湾口部を中心に、伊勢湾全域に形成される。かご漁業の漁場は、沿岸に沿って広く形成される。愛知県においては、知多地区の漁獲量が多い。また、本種の仔魚であるレプトケパルス(のれそれ)は、船びき網などで混獲されている。



マアナゴの仔魚(レプトケパルス)は「のれそれ」と呼ばれ、春季に湾内に来遊して船びき網などで混獲される。沿岸域に来遊する以前の生態は不明である。

漁獲の動向

愛知県と三重県の1980年以降の漁獲量は753～1,745トンの範囲で変動しているが、概ね1,000～1,500トンで推移している。2001年には814トンに漁獲量が落ち込んだのち、2002、2003年は1,000トンを超える漁獲が見られたが、2004年の速報値は753トンと大きく減少した。




資源評価法

1980年以降の愛知県と三重県の合計漁獲量の経年変化及び三重県の小型底びき網CPUEを主体に、各県の生物情報収集調査、標本船調査および漁場一斉調査の結果をもとに現在の資源状態を判断した。

資源状態

2004年の漁獲量は大きく減少しており、2004年秋冬漁期の漁獲も低調で加入量も少ないと判断されることから、資源水準は低位にあるものと推定される。



管理方策

伊勢・三河湾のマアナゴは、水産庁が推進する資源回復計画の対象魚種に指定されており、小型底びき網に入網した小型魚の水揚げ禁止、再放流等の措置がとられている。本評価対象は、春季に仔魚として伊勢・三河湾内に来遊したものが、その年の秋～冬季に漁獲加入し始め、翌年の春～夏季に漁獲の中心となることから、加入量あたりの漁獲量増大を管理目標とした場合、秋冬漁期の小型魚を保護することが管理方策となる。さらに、「のれそれ」の漁獲はマアナゴ資源に対して影響を与える可能性があることから、仔魚も含めた資源管理措置についても今後検討する必要がある。

資源評価のまとめ

- 漁獲量の経年変化等から判断して、伊勢・三河湾のマアナゴ資源は低位水準にある
- 伊勢・三河湾のマアナゴ資源量は、湾外から来遊する仔魚(のれそれ)の多寡により変動するものと推測される

管理方策のまとめ

- 加入量あたり漁獲量の増大が目標
- 秋冬漁期の小型魚の保護が管理方策
- 「のれそれ」も含めた資源管理措置についても今後検討する必要

資源評価は毎年更新されます。