

平成17年度資源評価票(ダイジェスト版)

標準和名 カタクチイワシ

学名 *Engraulis japonicus*


系群名 対馬暖流系群

担当水研 西海区水産研究所



生物学的特性

寿命: 2～3歳
成熟開始年齢: 6カ月
産卵期・産卵場: 春～夏季、能登以南では秋季にも産卵、沿岸～沖合の広範囲
索餌期・索餌場: 詳細は不明
食性: カイアシ類を中心とした動物プランクトン
捕食者: 大型の魚介類、海産ほ乳類、海鳥類など




漁業の特徴

本資源は、日本海北区(石川県～新潟県)では主に定置網と敷網により漁獲され、日本海西区(山口県～福井県)では主に大中型まき網、中型まき網、定置網、敷網により漁獲されている。東シナ海区(福岡県～鹿児島県)では、主に中型まき網により漁獲される。なお、日本海および東シナ海では一部の海域を除いて、太平洋や瀬戸内海のようなシラスを対象とした漁業は発達していない。

漁獲の動向

対馬暖流域では東シナ海区での漁獲量が最も多く、次いで日本海西区である。日本海北区ではさほど漁獲されない。近年では1998～2000年のこの海域での漁獲量は100千トンを超えたが、2001年以降はやや減少傾向にある。2004年の漁獲量は60千トンであり、前年の77千トンを下回った。




資源評価法

月齢別コホート解析により資源量を推定した。他に、卵稚仔調査による卵豊度推定や、計量魚群探知機による現存量推定なども実施している。月齢別コホート解析は、月別漁獲量から銘柄別漁獲量と体長組成をもとに月齢別漁獲尾数を推定した。自然死亡係数は生活史初期で高くなるようにした。

資源状態

卵稚仔調査により推定した卵豊度の経年変化では、1998～2000年は高い水準で推移していたが、2001年は大幅に減少した後、2002年以降はやや増加した。計量魚群探知機調査による現存量推定値は、1997年を最低として1998～2001年は高水準であったが、2002年は減少した。月齢別コホートの結果、資源量は1997～1999年は高水準にあったが、2000年以降は減少したものの、2004年は2003年よりやや増加した。





管理方策

本資源の資源量と漁獲量は、加入の程度によって決定される。産卵親魚量と加入量に明瞭な関係はみられなかった。ABCの算定は2002～2004年の平均程度の加入量を見込み、現状のFでも資源は増加するのでFcurrentで良いと判断された。予防的措置から0.8FcurrentをFtargetとした。

	2006年漁獲量	管理基準	F値	漁獲割合
ABClimit	95千トン	Fcurrent	0.31	13%
ABCTarget	93千トン	0.8Fcurrent	0.25	11%

資源評価のまとめ

- 月齢組成を月別に求め、月齢別コホート解析を行った
- 2003年の秋季発生群の加入が悪かった
- 卵稚仔調査の結果、2004年の卵豊度は2003年よりも増加した
- 2000年以降資源は減少したが、近年では横ばいから増加で推移している

管理方策のまとめ

- 加入が現状程度であれば、現状の漁獲圧のもとでも資源は増加する

資源評価は毎年更新されます。