

令和7（2025）年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価

水産研究・教育機構

水産資源研究所 水産資源研究センター（八木佑太・山田徹生・真鍋明弘・
片町太輔・金谷彩友美・栗原寛明）

参画機関：和歌山県水産試験場、大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センター、兵庫
県立農林水産技術総合センター水産技術センター、岡山県農林水産総合セ
ンター水産研究所、広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター、山口県
水産研究センター内海研究部、福岡県水産海洋技術センター豊前海研究所、
大分県農林水産研究指導センター水産研究部、愛媛県農林水産研究所水産研
究センター栽培資源研究所、香川県水産試験場、徳島県立農林水産総合技術
支援センター水産研究課、全国豊かな海づくり推進協会

要 約


本系群の資源量を、小型底びき網 CPUE を資源量指標値としたチューニング VPA（コ
ホート解析）により計算した。漁獲量は 1988 年から 2002 年にかけて 1,000 トン前後で推
移した後減少し、2016 年に 482 トンとなった。2017 年以降は増加に転じ 2020 年には 615
トンとなったが、その後やや減少し、2024 年は 527 トン（暫定値）であった。資源量は
1998 年に 29 百トンに達した後減少し、2010 年には 20 百トンとなった。その後は増加し
ており、2024 年の資源量は 32 百トンと推定された。親魚量は、2000 年の 16 百トンから
2011 年の 12 百トンにかけて緩やかに減少した。その後は増加傾向が続いており、2024 年
は 25 百トンと推定された。

本種は栽培対象種であり、2023 年は 279 万尾の人工種苗が放流された。2023 年の 0 歳
魚漁獲物における人工種苗放流魚の混入率は 7.8%、添加効率（放流魚の漁獲加入までの
生残率）は 0.03 であった。天然由来の加入量（0 歳魚資源尾数）は概ね 50 万～370 万尾の
範囲で推移し、2021 年以降は横ばい傾向で推移しており、2024 年は 105 万尾と推定され
た。漁獲圧は 2000 年代後半頃から低下傾向を示しており、特に 2015 年頃からは 0 歳およ
び 1 歳に対する漁獲圧が低い値で推移している。本系群においては、これらの低い漁獲圧
と比較的安定した加入により、資源量の増加がもたらされていると推察される。

令和 3 年 9 月に開催された「管理基準値等に関する研究機関会議」において、本系群の
再生産関係にはホッカー・スティック型が適用されており、これに基づき推定された最大
持続生産量（MSY）を実現できる親魚量（SBmsy）は 24 百トンである。この基準に従う
と、本系群の 2024 年の親魚量は、MSY を実現する水準を上回る。また、本系群に対する
2024 年の漁獲圧は SBmsy を維持する漁獲圧（Fmsy）を下回る。親魚量の動向は直近 5 年
間（2020～2024 年）の推移から「増加」と判断される。

本系群では、管理基準値や将来予測など、資源管理方針に関する検討会の議論をふまえて
最終化される項目については、管理基準値等に関する研究機関会議・資源管理方針に関す
る検討会等において議論された値を暫定的に示した。

要 約 図 表



最大持続生産量 (MSY)、親魚量の水準と動向、および ABC	
MSYを実現する水準の親魚量(SBmsy)	24 百トン
2024 年の親魚量の水準	MSY を実現する水準を上回る(1.02 倍)
2024 年の漁獲圧の水準	SBmsy を維持する水準を下回る(0.66 倍)
2024 年の親魚量の動向	増加
MSY	806トン
2026 年の ABC	-
コメント: ・ABC は、本系群の漁獲シナリオが「資源管理方針に関する検討会」で取り纏められ、「水産政策審議会」を経て定められた後に算定される。	

直近5年と将来2年の資源量、親魚量、漁獲量、F/Fmsy、および漁獲割合					
年	資源量 (百トン)	親魚量 (百トン)	漁獲量 (百トン)	F/Fmsy	漁獲割合 (%)
2020	30	22	6	0.92	20.6
2021	30	23	6	0.83	19.3
2022	30	23	5	0.78	18.0
2023	31	23	5	0.65	16.9
2024	32	25	5	0.66	16.4
2025	33	26	6	0.66	17.4
2026	34	26	-	-	-

・2024年の漁獲量は暫定値。
・2025年、2026年の値は将来予測に基づく平均値である。

English title (authors)

Stock assessment and evaluation of the Seto Inland Sea stock of bastard halibut (fiscal year 2025).
(Yuta Yagi, Tetsuo Yamada, Akihiro Manabe, Daisuke Katamachi, Ayumi Kanaya, Kurihara Hiroaki)

1. データセット

本件資源評価に使用したデータセットは以下のとおり。

データセット	基礎情報、関係調査等
年齢別・年別漁獲尾数 人工種苗放流個体の採捕情報	瀬戸内海区および太平洋南区における漁業動向(中国四国農政局、2005年まで) 漁業・養殖業生産統計年報(水産庁、和歌山～大分の11府県) 生物情報収集調査(大阪、兵庫、広島、山口、香川、愛媛、大分) ・全長組成測定 ・精密測定(全長、体重、年齢査定、無眼側色素異常個体の検出)
加入量指数	山口県殖生沿岸加入量予備調査(水産研究・教育機構)
自然死亡係数(M)	M=0.31/年を仮定(田内・田中の方法)
漁獲努力量	瀬戸内海区および太平洋南区における漁業動向(中国四国農政局、2005年まで) 漁業・養殖業生産統計年報(水産庁、和歌山～大分の11府県) 標本船調査(山口、大分)* 漁場別漁獲状況調査(和歌山～大分の11府県、標本漁協の小型底びき網漁獲量と努力量を収集)*
人工種苗放流尾数、標識装着率(人工種苗放流時における黒化個体混入率)等	栽培漁業用種苗等の生産・入手・放流実績(水産庁増殖推進部、水産研究・教育機構、公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会) 放流時の黒化率情報(2024年実績:和歌山、大阪、兵庫、山口、香川、愛媛)

*はチューニング VPA (コホート解析) におけるチューニング指数である。

2. 生態

(1) 分布・回遊

本系群のヒラメ (*Paralichthys olivaceus*) は瀬戸内海の沿岸を中心に分布しており(図 2-1)、春に瀬戸内海で生まれた仔稚魚はごく沿岸域で成長したのち徐々にその沖合域へと移動する。成魚になると、瀬戸内海に留まるものと外海へ移出するものがあり、移出する個体は東部海域(紀伊水道、大阪湾、播磨灘、備讃瀬戸)では紀伊水道へ、中部(燧灘、備後・芸予瀬戸、安芸灘)および西部海域(伊予灘、周防灘)では豊後水道へ向かう(愛媛県 1995、徳島県 1995、山口県 1995)。

(2) 年齢・成長

本種は雌雄により成長に顕著な差が見られる。雌は雄よりも大きく成長し、5歳では雌は雄の2倍以上の体重となる。寿命については不明であるが、1994～2024年における精密測定個体の最高齢は16歳であった。

1995～2004年に精密測定を行った個体の全長、体重と耳石切断法による年齢査定値を使用し、雌雄別の年齢 t と全長 L_t (cm) の von Bertalanffy 成長式と、全長 L (cm) と体重 W (g) のアロメトリー式を推定した(図 2-2)。

$$\text{年齢-全長関係式} \quad \text{雄: } L_t = 62.78 (1 - \exp(-0.29(t + 0.96))) \quad (1)$$

$$\text{雌: } L_t = 92.94 (1 - \exp(-0.24(t + 0.59))) \quad (2)$$

全長－体重関係式 雄： $W=0.0072 L^{3.10}$ (3)

雌： $W=0.0047 L^{3.23}$ (4)

なお、この年齢－全長関係式における t では年齢の起算日を 4 月 1 日に設定しており、「4. 資源の状態」にて示すコホート解析における年齢起算日：1 月 1 日とは異なる。

(3) 成熟・産卵

産卵場は、東部海域では徳島県の太平洋海域、中西部海域では周防灘および伊予灘、愛媛県斎灘、燧灘西部および島嶼部に分散していると考えられている（図 2-1）（愛媛県 1995、徳島県 1995、山口県 1995）。産卵期は東部海域では 2～5 月、中西部海域では 3～6 月である。年齢別成熟割合（図 2-3）は雌が 1 歳で 4%、2 歳で 75%、3 歳で 82%、4 歳以上では 100%、雄は 1 歳で 4%、2 歳で 52%、3 歳で 91%、4 歳以上では 100%である（愛媛県 1995、山口県 1995）。

(4) 被捕食関係

沿岸の成育場に着底した稚魚は、アミ類を主に捕食し、成長とともにエビジャコや魚類の割合が増加する。漁獲加入後の個体は主に魚類を捕食し、甲殻類やイカ類も捕食する（愛媛県 1995、徳島県 1995、山口県 1995）。被食については、人工種苗の放流後稚魚がヒラメやマゴチ、スズキ等大型の魚類に捕食された報告があるが（愛媛県 1995、広島県 1995、山口県 1995）、天然魚については不明である。

3. 漁業の状況

(1) 漁業の概要

主に小型底びき網（以下、「小底」と表記）、刺網、定置網、釣漁業（はえ縄を含む）で漁獲される。漁法別漁獲量では小底が中心であり、2024 年における漁法別の割合は小底：55%、刺網：21%、定置網：18%、釣漁業：6%であった（図 3-1）。秋には未成魚、冬から春にかけては成魚が漁獲の主体である。

なお、周防灘の小底では、2004 年以降、「周防灘小型機船底びき網漁業対象種の資源管理に関する覚書」により全長 25 cm 以下のヒラメの採捕を禁じている。また、各県においても漁協単位で同様の水揚げサイズ制限（多くは全長 25 cm）や休漁日の設定を行っているところもある。水域によっては全長 25～30 cm 以下の小型魚は単価が低いため、船上で選別した小型魚を水揚げせずに再放流するケースも存在するとの情報もある（関係各県水試からの情報）。

(2) 漁獲量の推移

漁獲量は 1970 年代前半までは 100～500 トン未満の範囲であったが、1970 年代後半から 1990 年代にかけて増加し、1999 年に 1,118 トンに達した（図 3-1、表 3-1）。1988 年から 2002 年にかけては 1,000 トン前後で推移したが、2003 年以降は 1,000 トンを下回り、2016 年には 482 トンまで減少した。以降は 2020 年の 615 トンにかけて増加したが、その後はやや減少しており、2024 年の漁獲量は 527 トン（暫定値）であった。

1994年から現在に至るまでの年別年齢別漁獲尾数とその割合の推移を図3-2に、年別年齢別漁獲量とその割合の推移を図3-3にそれぞれ示した。年齢別漁獲尾数は1995年に273万尾の最高値に達した後、2016年までは減少傾向を示した。その後、2017～2019年は増加したが、2020年以降はやや減少している（図3-2、補足表2-2）。1歳魚および2歳魚の漁獲が全漁獲尾数の6～8割を占め、これに0歳魚を加えると、2005年以前では多くの年で漁獲尾数全体の9割以上を2歳魚以下の個体が占めていたが、その後は若齢魚、特に0、1歳魚の漁獲が減少した。年齢別漁獲量（図3-3、補足表2-2）においても、2歳以下の漁獲重量は2017年まで減少傾向にあったが、3歳以上では大きな変化は生じていない。漁獲重量割合をみると、1995年、1996年では1歳以下の割合が全体の約50%を占めたが、その割合は長期的に低下傾向にあり、2024年では11%となった。

なお、遊漁による採捕量は、1992年は2トン、1997年および2001年は7トンとごく少量に留まっていたが（農林水産省統計情報部1993、1998、2003）、2008年には81トンとなり漁獲量全体に対する割合も9.7%まで増加した（農林水産省統計部2009）。これ以降は漁区別の遊漁採捕量情報は公表されていない。

(3) 漁獲努力量

1968～2006年の小底および刺網の努力量（延べ出漁日数）については、小底では1979年以降、刺網では1983年以降減少した（図3-4、表3-2）。小型定置網（以下、「小定置」と表記）の努力量（漁労体数）は、1970年代後半から1990年代前半にかけて2,000～2,200統で横ばいであったが、その後減少した。2007年以降、漁業・養殖業生産統計年報では同型式による努力量の集計は行われなくなった。

2002年以降、瀬戸内海沿岸の小底標本船（大分県、山口県）および小底標本漁協（泉佐野、五色町、高砂、日生、庵治、東讃、内海、河原津、上灘、伊予）においてヒラメの月別漁獲量ならびに月別延べ出漁隻数の情報を収集している（図3-5、表3-3）。なお、一部の漁協については2000年から努力量を収集しているが、対応する漁獲量の収集は2002年以降のみである。これら標本船・標本漁協における延べ出漁隻数の年計は、2004年に現在情報を収集している標本漁協が出揃って以降、減少傾向にある。2024年は1.6万隻・日であり、ピーク時の2004年（4.5万隻・日）の36%となっている。

4. 資源の状態

(1) 資源評価の方法

1994～2024年の年齢別漁獲尾数（補足表2-2）の情報を用いて、標本船および標本漁協の小底漁船のCPUEを資源量指標値としたチューニングVPA（Virtual Population Analysis、コホート解析の一種）を行い、年別年齢別資源尾数、資源量、親魚量などを推定した（補足資料1、2）。なお、2019～2024年の年齢別漁獲尾数は、近年の年齢構造の変化を考慮するため、同期間の年齢査定結果に基づくAge-Length keyを用いて算出した（補足資料2）。チューニングVPAにおいては、資源量指標値と漁獲対象資源量のそれぞれの対数値の推移が最も一致するよう、両者の非線形関係も考慮して最近年のFを推定した。

(2) 資源量指標値の推移

漁業・養殖業生産統計年報に基づく1970～2006年の小底、刺網、小定置の単位努力量当たり漁獲量（CPUE、小底と刺網はkg/出漁日数、小定置はトン/漁労体数）の推移を図4-1および表3-2に示した。いずれの漁法においても、1980年代から1990年代にかけて増加傾向が見られた後、2000年以降一旦横ばい傾向を示した。その後小定置では2005年と2006年に、刺網では2006年に再び増加した。2006年の小底、刺網、小定置のCPUEはそれぞれ0.77、0.41、0.07であり、1970年のCPUE（0.09、0.05、0.01）と比較してそれぞれ8.6、8.2、7.0倍まで増加していた。

標本船・標本漁協より収集した2002年以降の小底CPUEの加重平均値（kg/隻・日）の推移を図4-2および表4-1に示した。加重平均CPUEは、2005年以降は減少傾向を示し、その後は年による変動はあるものの0.7前後で推移していたが、2019～2020年に急増して1.94となった後やや減少し、2024年は1.35であった。

(3) 資源量と漁獲圧の推移

資源尾数（図4-3、補足表2-2）は1995年に805万尾、資源量（図4-4、表4-2）では1998年に29百トンのピークの後、緩やかに減少した。資源尾数は2016年以降、資源量は2014年以降増加傾向にあり、2024年の資源尾数は375万尾、資源量は32百トンと推定された。親魚量は2000年に16百トンまで増加した後減少し、2003年以降は12百～13百トン程度で推移していたが、2012年以降は増加傾向にある（図4-5、表4-2）。2024年の親魚量は25百トンと推定された。加入量（0歳資源尾数）は、1995年の425万尾をピークにその後は減少傾向を示し、2015年に100万尾となった（図4-5、表4-2、補足表2-2）。その後は横ばい傾向にあり、2024年の加入量は114万尾であった。

自然死亡係数Mについて本評価で設定した0.31から0.1増減させたときに生じる資源量、親魚量、加入量（0歳魚資源尾数）の変化を図4-6に示した。このとき、資源量指標値と漁獲対象資源量間の非線形関係パラメータについては、 $M=0.31$ の時の1.48に固定した。Mの増減に伴う資源量、親魚量、加入量の増減は概ね30%以下であった。

漁獲係数Fの推移では、2000年代以降、0～3歳魚の各年齢のFが低下傾向にあり、2010年頃からは4、5歳魚以上も低下傾向を示している（図4-7、補足表2-2）。各年齢のFを比較すると、2008年頃までは概ね2歳魚のFが最も高かったが、その後は3歳魚のFと同程度で推移しており、2015年頃以降では4、5歳魚以上のFも同程度で推移している。また、2009年以前は1歳魚のFが最高齢群にあたる4、5歳魚以上のFを上回っていたが、その後は概ね4、5歳魚以上のFを下回っており、2016年以降では1歳のFは0.2未満で推移している。0歳のFも同様に近年は低い水準にあり、2019年以降では0.04未満で推移している。これらのことから、2000年代以降では漁獲圧自体が低下傾向にあり、かつ漁獲対象年齢が以前の若齢魚主体から高齢魚主体へと移行していると考えられる。漁獲割合もFと同様に2000年代以降で低下傾向が続いており、2010年頃までは40%前後で推移していたがその後低下し、2024年は16.4%であった（図4-8、表4-2）。

(4) 種苗放流と加入量

本種は栽培漁業の代表的な対象種であり、瀬戸内海では1970年代後半から人工種苗放

流が実施されている。放流尾数は 1990 年代後半～2008 年は年間約 400 万～500 万尾で推移したが、それ以降は減少傾向となっている。2024 年の放流尾数は前年（245 万尾）をやや上回る 279 万尾であった（図 4-9、表 4-3）。

ここで、本系群の加入尾数については、チューニング VPA（コホート解析）で求められた 0 歳資源尾数を黒化個体の混入率を用いて天然由来の加入尾数と人工種苗由来の加入尾数に分離している（詳細は補足資料 2（3））。人工種苗放流時の黒化率データならびに各府県水試により実施された生物情報収集調査（精密測定）による 0 歳漁獲尾数中の黒化個体混入率調査の結果、1995～2024 年の 0 歳資源尾数における人工種苗個体の（補正済み）混入率は 7～52%の間で変動した（表 4-3）。

人工種苗由来の加入尾数は 8 万～130 万尾の範囲で推移しており、最大は 1998 年、最少は 2015 年であった（図 4-5、表 4-2）。天然由来の加入尾数は概ね 50 万～370 万尾の範囲で推移し、2021 年以降は横ばい傾向にあり、2024 年は 105 万尾と推定された。なお、近年では 2020 年の天然由来の加入尾数が比較的低位で推定されているが、これは 2020 年において混入率が 52%と非常に高く推定されているためである。この 2020 年の高い混入率については、瀬戸内海東部の 0 歳魚の標本において人工種苗放流魚が非常に高い頻度で確認されたことの影響が大きく、瀬戸内海全体としての状況は反映できていない可能性が高いと考えられる。

(5) 加入量当たり漁獲量（YPR）、加入量当たり親魚量（SPR）および現状の漁獲圧

選択率の影響を考慮して漁獲圧を比較するため、加入量当たり親魚量（SPR）を基準に、その漁獲圧が無かった場合との比較を行った。図 4-10 と表 4-2 に、年ごとに漁獲が無かったと仮定した場合の SPR に対する、漁獲があった場合の SPR の割合（%SPR）の推移を示す。%SPR は漁獲圧が低いほど大きな値となる。%SPR は長期的に増加傾向にあり、2024 年は 39.6%であった。

Fmsy に対する YPR と %SPR の関係を図 4-11 に示す。ここで、現状の漁獲圧（F2024）は、選択率に令和 3 年 9 月に開催された「管理基準値等に関する研究機関会議」において最大持続生産量 MSY を実現する F（Fmsy）の推定に用いた値（山下ほか 2021）を用い、%SPR が 2024 年の値（39.6%）となる F とした。また、年齢別平均体重および成熟割合についても Fmsy 算出時の値を使用した。Fmsy は %SPR に換算すると 28%に相当する。現状の漁獲圧（F2024）は Fmsy や F0.1、F30%SPR を下回る。

(6) 再生産関係

親魚量（重量）と加入量（尾数）の関係（再生産関係）を図 4-12 に示す。上述の「管理基準値等に関する研究機関会議」において、本系群の再生産関係式にはホッケー・ステイック型再生産関係が適用されている（山下ほか 2021）。ここで、再生産関係式のパラメータ推定に使用するデータは令和 3（2021）年度の資源評価（山下ほか 2022）に基づく 1994～2019 年の親魚量・加入量とした。また、加入量としては天然由来の加入尾数のみを使用した。最適化方法には最小二乗法を用い、加入量の残差の自己相関を考慮した。令和 3 年度の「再生産関係の決定に関するガイドライン」（FRA-SA2021-ABCWG01-03. 水産研究・教育機構 2021）に従い、観測範囲の最小親魚量を変曲点とした。再生産関係式の

各パラメータを補足表 6-1 に示す。

(7) 現在の環境下において MSY を実現する水準

令和 3 年 9 月に公開された管理基準値等に関する研究機関会議資料（山下ほか 2021）で示された現在（1994 年以降）の環境下における最大持続生産量 MSY、MSY を実現する親魚量（SBmsy）、および SBmsy を維持する F（Fmsy）を補足表 6-2 に示す。

(8) 資源の水準・動向および漁獲圧の水準

MSY を実現する親魚量（SBmsy）と SBmsy を維持する漁獲圧（Fmsy）を基準にした神戸プロットを図 4-13 に示す。また、2024 年の親魚量と漁獲圧、それらの値と管理基準値案との比較結果を補足表 6-3 に示した。本系群における 2024 年の親魚量は SBmsy を上回っており、SBmsy の 1.02 倍である。また、2024 年の漁獲圧は Fmsy を下回っており、Fmsy の 0.66 倍である。なお、神戸プロットに示した漁獲圧の比（F/Fmsy）とは、各年の F の選択率の下で Fmsy の漁獲圧を与える F を %SPR 換算して求めた値と、各年の F 値との比である。親魚量の動向は、直近 5 年間（2020～2024 年）の推移から増加と判断される。

5. 資源評価のまとめ

2024 年の親魚量は、1994 年以降で最大であった 2023 年からさらに増加し、MSY を実現する親魚量（SBmsy）を上回っている。本系群に対する漁獲圧は長期的に低下傾向にあり、近年の 0 歳資源尾数には不確実性が高いものの、特に若齢魚に対する漁獲圧は低い水準にあると考えられる。漁獲圧は 2016 年以降継続して SBmsy を維持する漁獲圧（Fmsy）を下回っており、本系群においては、これらの低い漁獲圧と安定した加入により資源量の増加がもたらされていると推察される。

6. その他

今年度推定された 2022 年と 2023 年の資源量と親魚量および加入量は、令和 6（2024）年度の資源評価結果（八木ほか 2025）と比較して、いずれも下方修正となっている。これには、年齢分解に用いた Age-Length key を見直したこと（補足資料 2）による年齢組成（年齢別漁獲尾数）の変化が関与している。今年度は年齢分解方法の見直しを行うに留まったが、本系群で使用している年齢別成熟率や年齢別平均体重については過去の情報に基づいており、資源状態の変化に伴う生物特性の変化も想定される。資源評価の精度向上に向けて、成長様式の更なる精査・検討を含めて、生物特性を見直していくことが重要と考えられる。

0、1 歳魚といった小型かつ未成魚に対する F の低下は、成長乱獲、加入乱獲の両方を避ける上で有効である。現状ではいくつかの水域、漁協で漁獲サイズの規制措置が実施され、また別の水域では小型魚の魚価安による自主的な小型魚獲り控えが行われている模様である。これらの措置が小型魚における F の低下に寄与している可能性は高い。漁獲努力量および F が年々減少、低下する傾向にある現状においては（図 3-5、4-7）、小型魚に対する漁獲サイズ規制を全海域で導入する、あるいは各地でまちまちな漁獲規制サイズをより大きい側で統一するなどのテクニカル・コントロールを行うことで、本資源を引き続き

健全な状態で利用できることが期待される。

加入量の早期把握に関しては、1995～2020年において燧灘における着底ピーク時と考えられる6月に天然由来ヒラメ稚魚の採集調査が実施されたが、その後の資源の加入の傾向と一致しなくなったため当該調査は終了となった。加入量の把握のためのこれに代わる調査については現在検討中であり、2021年より予備的に山口県埴生沿岸においてヒラメ0歳魚の周年調査を実施し情報の蓄積に努めている。

ヒラメ人工種苗の放流事業は、瀬戸内海沿岸の各府県において盛んに実施されており（図4-9、表4-3）、その人工種苗由来の資源は年によって0歳資源尾数の1～5割を占め、天然由来の資源を補完していると考えられる（図4-5）。しかし、放流効果判定の基礎資料となる人工種苗放流時の標識装着率の把握については、現状ではいくつかの限られた府県からしか情報が得られていないため、灘、県といったより詳細な水域単位での添加効率の計算を行うに至っていない。更にはヒラメ人工種苗の生産技術向上に伴い、近年では無眼側黒化個体が全く発生しない生産ロットも実現できるようになったとの情報もあるが、このように種苗として成績の良いロットは、従来の放流効果判定法では検出することが出来ず、将来的には放流効果判定が全く出来なくなるといった恐れもある。まずは人工種苗の放流を実施する団体や上部機関、あるいはその種苗を生産する組織や業者において、放流に用いる種苗の黒化率の把握を確実に実施すること、そしてその数値を各府県あるいは水産機構を通じて確実に報告し、より正確な黒化率情報を収集・解析することが、ヒラメ人工種苗放流が各水域において、どの程度資源の維持に関与しているかを判定する上で非常に重要である。

2009年以降の遊漁による採捕量に関する情報が欠如しており、本系群の資源評価では遊漁については考慮していない。今後、遊漁による採捕が資源に与える影響を検討するためには、遊漁による採捕情報の収集、整備が必要である。

7. 引用文献

- 愛媛県 (1995) 愛媛. 平成2～6年度放流技術開発事業総括報告書資料編, 瀬戸内海・九州海域ブロックヒラメ班, 1-58.
- 広島県 (1995) 広島. 平成2～6年度放流技術開発事業総括報告書資料編, 瀬戸内海・九州海域ブロックヒラメ班, 1-31.
- 農林水産省統計情報部 (1993) 遊漁採捕量調査報告書. 112 pp.
- 農林水産省統計情報部 (1998) 平成9年遊漁採捕量調査報告書. 115 pp.
- 農林水産省統計情報部 (2003) 平成14年遊漁採捕量調査報告書. 72 pp.
- 農林水産省統計部 (2009) 平成20年遊漁採捕量調査報告書, https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/yugyo_horyo/index.html.
- 岡村 寛 (2023) 水産資源の持続的利用をめざして：最大持続生産量と計量生物学. 計量生物学, **43**, 189-230.
- 水産研究・教育機構 (2021) 再生産関係の決定に関するガイドライン (令和3年度). FRA-SA2021-ABCWG01-03, 水産研究・教育機構, 横浜, 14 pp. https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2021-ABCWG01-03.pdf (last accessed 27 July 2023)
- 徳島県 (1995) 徳島. 平成2～6年度放流技術開発事業総括報告書資料編, 瀬戸内海・九州海

域ブロックヒラメ班, 1-38.

八木佑太・山田徹生・真鍋明弘・金谷彩友美・阪地英男 (2025) 令和 6 (2024) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価. FRA-SA2025-AC061, 令和 6 年度我が国周辺水域の漁業資源評価, 水産庁・水産研究・教育機構, 東京, 59 pp. https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2025/03/details_2024_61.pdf (last accessed 14 August 2025)

山口県 (1995) 山口. 平成 2~6 年度放流技術開発事業総括報告書資料編, 瀬戸内海・九州海域ブロックヒラメ班, 1-28.

山下夕帆・山田徹生・真鍋明弘・金谷彩友美・阪地英男 (2021) 令和 3 (2021) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2021-BRP04-001, 水産研究・教育機構, 横浜, 40 pp. http://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/20210928/doc_hirame_setonaikai_RIM.pdf (last accessed 29 July 2024)

山下夕帆・山田徹生・真鍋明弘・金谷彩友美・阪地英男 (2022) 令和 3 (2021) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価. FRA-SA2021-RC03-3, 令和 3 年度我が国周辺水域の漁業資源評価, 水産庁・水産研究・教育機構, 東京, 45 pp. https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2021/details_2021_61.pdf (last accessed 29 July 2024)




図 2-1. ヒラメ瀬戸内海系群の分布




図 2-2. 雌雄別の年齢と全長、体重の関係 (年齢は4月1日起算)




図 2-3. 雌雄別年齢別成熟割合




図 3-1. 漁業種類別漁獲量の推移 1978 年以前は全漁業合計値を示す。




図 3-2. 年齢別漁獲尾数（上図）および割合（下図）の推移




図 3-3. 年齢別漁獲量（上図）および割合（下図）の推移




図 3-4. 農林水産統計による瀬戸内海区の小底、刺網、小定置の努力量の推移（2006年まで）




図 3-5. 小底標本船・標本漁協の出漁隻数の推移




図 4-1. 農林水産統計による瀬戸内海区の小底、刺網、小定置の CPUE の推移（2006年まで）1970年を1とした。




図 4-2. 小底標本船・標本漁協 CPUE の加重平均値 (2002 年以降)




図 4-3. 年齢別資源尾数の推移




図 4-4. 年齢別資源量の推移




図 4-5. 親魚量および 0 歳魚資源尾数（加入尾数）の推移




図 4-6. 自然死亡係数 M を変化させたときの資源量（上）、親魚量（中）、加入量（下）の
変化




図 4-7. 年齢別漁獲係数 F の推移




図 4-8. 漁獲割合の推移




図 4-9. 1979 年以降の人工種苗放流尾数の推移




図 4-10. %SPR 値の経年推移 %SPR は漁獲がないときの親魚量に対する漁獲があるときの親魚量の割合を示し、漁獲圧が高い（低い）と%SPR は小さく（大きく）なる。




図 4-11. Fmsy に対する YPR、%SPR の関係




図 4-12. 親魚量と加入量の関係（再生産関係）

再生産関係には自己相関を考慮しないホッケー・スティック（HS）型再生産関係式を用い、最小二乗法によりパラメータ推定を行った。緑色丸印は再生産関係の分析に使用した令和 3 年度評価時の 1994～2019 年の親魚量と加入量を示す。図中の数字は加入群の年級（生まれ年）を示す。図中の再生産関係式（青実線）の上下の点線は、仮定されている再生産関係において観察データの 90%が含まれると推定される範囲である。白丸印は本年（2025 年）度評価における 1994～2019 年の親魚量と加入量を、赤丸印は直近 5 年間（2020～2024 年）の親魚量と加入量を示し、黒色は天然のみ、灰色は種苗放流を加味した加入量である。




図 4-13. 最大持続生産量（MSY）を実現する親魚量（SBmsy）と SBmsy を維持する漁獲圧（Fmsy）に対する過去の親魚量および漁獲圧の関係（神戸プロット）

表 3-1. ヒラメ瀬戸内海系群の漁獲量（トン）

年	紀伊 水道	大阪 湾	播磨 灘	備讃 瀬戸	燧灘	備後 芸予*	安芸 灘	伊予 灘	周防 灘	合計
1952	18	10	102	106	43		14	45	39	377
1953	9	4	54	77	40		7	36	38	265
1954	16	5	111	84	88		8	69	72	453
1955	8	2	79	90	74		15	79	84	431
1956	25	3	110	61	38		13	46	95	391
1957	11	2	44	27	38		22	39	16	199
1958	7	1	39	2	23		19	47	3	141
1959	4	1	20	12	28		13	75	48	201
1960	0	0	18	10	19		13	66	77	203
1961	7	0	12	0	14		19	31	100	183
1962	3	1	8	7	18		17	37	45	136
1963	6	1	11	2	19		11	15	23	88
1964	4	0	16	1	14		16	33	8	92
1965	11	1	18	3	13		14	37	1	98
1966	10	1	9	27	18		11	30	8	114
1967	12	1	5	16	25		3	21	5	88
1968	16	1	11	52	24		4	34	10	152
1969	28	0	6	32	31		8	34	9	148
1970	15	1	10	13	88		6	49	21	203
1971	37	0	12	16	96		29	15	23	228
1972	28	0	4	17	96		21	22	19	207
1973	27	4	9	26	117		10	27	9	229
1974	21	3	43	29	119		7	26	15	263
1975	23	7	64	18	87		7	16	9	231
1976	24	4	13	15	119		15	118	15	323
1977	38	6	19	43	158		10	85	14	373
1978	34	6	16	51	39	126	62	49	33	416
1979	30	9	21	69	60	144	58	56	19	468
1980	65	8	22	58	76	120	44	24	15	431
1981	63	9	24	58	87	100	19	35	21	415
1982	67	6	22	40	76	107	42	55	21	435
1983	56	9	57	49	92	132	73	98	11	577
1984	78	15	44	41	109	154	62	125	27	655
1985	80	32	207	54	127	155	77	207	9	948
1986	74	22	204	50	134	182	93	119	10	888
1987	71	19	71	50	145	198	102	93	8	757
1988	76	9	222	49	181	255	100	102	23	1,017
1989	65	44	155	58	206	304	114	92	4	1,042
1990	65	34	106	57	141	240	96	89	4	832
1991	80	25	185	56	155	221	103	108	3	936
1992	91	26	144	53	155	181	116	117	5	888
1993	95	40	135	56	138	168	118	135	16	901
1994	106	37	126	76	160	114	127	122	8	876
1995	118	26	151	95	238	179	104	83	8	1,000
1996	101	21	159	99	167	222	107	111	12	1,000
1997	87	23	157	108	143	230	108	96	20	973
1998	87	44	185	99	113	276	96	108	31	1,039
1999	86	40	209	88	93	258	116	191	37	1,118
2000	74	25	167	92	104	266	93	158	44	1,023
2001	76	27	153	74	89	333	92	156	33	1,033
2002	71	52	135	109	242	174	93	142	21	1,039
2003	58	39	155	92	230	137	93	70	37	912
2004	69	44	158	120	106	234	71	59	50	911
2005	81	41	142	107	120	280	73	58	31	934

表 3-1. (続き)

年	和歌山	大阪	兵庫	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	福岡	大分	合計
2006	26	8	130	28	65	46	36	125	410	1	44	918
2007	13	8	118	33	72	35	31	100	383	1	41	835
2008	17	6	106	32	122	28	23	108	350	1	39	831
2009	13	7	119	31	109	29	24	102	288	1	27	750
2010	12	5	124	30	97	31	28	90	301	1	32	751
2011	14	7	118	32	98	31	27	90	274	1	36	728
2012	11	7	132	31	84	28	28	79	259	1	32	691
2013	9	8	129	32	80	28	22	76	239	1	30	654
2014	13	5	143	35	70	29	28	80	180	1	30	613
2015	10	6	88	29	63	29	22	79	168	0	27	520
2016	9	6	90	29	57	24	20	75	146	1	25	482
2017	12	7	104	27	38	26	24	74	142	1	49	504
2018	15	7	119	30	38	29	25	79	147	1	30	519
2019	13	18	156	35	30	33	31	85	144	1	41	588
2020	11	25	180	37	32	32	31	87	137	1	42	615
2021	18	24	166	28	32	33	47	78	107	2	43	576
2022	13	18	148	28	30	37	42	77	114	2	34	543
2023**	13	9	144	34	25	36	43	80	109	2	52	521
2024***	13	16	142	32	25	30	36	92	91	2	72	527

* 備後芸予瀬戸の漁獲量は1977年まで燧灘に含まれており、1978年以降分離した。

** 2023年の漁獲量は確定値となり、昨年の概数値から修正された。

*** 2024年の漁獲量は概数値による暫定値である。

表 3-2. 2006 年までの小底、刺網の CPUE (kg/出漁日数) と努力量 (出漁日数)、小定置の CPUE (トン/漁労体数) と努力量 (漁労体数)

年	小底		刺網		小定置	
	CPUE	出漁日数	CPUE	出漁日数	CPUE	漁労体数
1968	0.04	1,373,678	0.01	834,635	0.00	1,924
1969	0.04	1,261,958	0.04	852,001	0.00	2,068
1970	0.09	1,196,851	0.05	873,766	0.01	1,767
1971	0.12	1,226,470	0.03	889,297	0.00	1,863
1972	0.10	1,275,259	0.02	857,899	0.01	1,740
1973	0.12	1,173,183	0.02	806,015	0.01	1,705
1974	0.19	1,231,561	0.02	830,603	0.01	1,961
1975	0.16	1,259,258	0.02	877,888	0.01	1,959
1976	0.20	1,250,443	0.06	940,174	0.01	2,141
1977	0.24	1,257,197	0.04	960,817	0.01	1,974
1978	0.20	1,285,936	0.07	973,048	0.02	1,985
1979	0.25	1,277,913	0.05	998,513	0.01	2,328
1980	0.22	1,222,827	0.06	1,014,695	0.02	2,007
1981	0.21	1,221,183	0.06	1,027,415	0.01	2,033
1982	0.22	1,219,748	0.07	1,034,989	0.02	2,156
1983	0.31	1,187,619	0.11	1,000,991	0.02	2,150
1984	0.37	1,196,887	0.11	979,294	0.03	2,071
1985	0.62	1,148,855	0.15	933,918	0.03	2,289
1986	0.54	1,123,191	0.16	946,653	0.04	2,224
1987	0.43	1,151,227	0.16	919,477	0.03	2,162
1988	0.63	1,129,380	0.20	909,193	0.04	2,077
1989	0.65	1,114,723	0.21	876,758	0.04	2,130
1990	0.48	1,092,348	0.20	829,300	0.04	2,118
1991	0.55	1,064,092	0.24	833,030	0.05	2,153
1992	0.52	1,058,620	0.26	815,062	0.04	2,054
1993	0.56	1,023,712	0.25	783,039	0.03	2,255
1994	0.56	994,086	0.25	753,895	0.04	2,067
1995	0.68	1,006,915	0.25	741,748	0.04	2,008
1996	0.70	950,983	0.27	720,932	0.04	2,030
1997	0.65	952,662	0.29	729,140	0.04	1,980
1998	0.71	938,420	0.31	683,685	0.05	1,956
1999	0.77	909,769	0.38	665,695	0.05	1,883
2000	0.76	885,218	0.29	658,172	0.05	1,943
2001	0.75	868,645	0.32	635,932	0.05	1,902
2002	0.78	831,926	0.35	599,106	0.05	1,828
2003	0.74	796,401	0.28	593,780	0.05	1,789
2004	0.75	775,278	0.35	528,797	0.05	1,720
2005	0.77	748,152	0.37	529,370	0.07	1,639
2006	0.77	718,757	0.41	506,802	0.07	1,562

*漁獲統計の集計内容変更に伴い、2007年以降ではこの形式での努力量の収集と CPUE の計算を継続することが出来なくなった。これに伴い、2002年以降は表 3-3 および表 4-1 に示した標本船・標本漁協所属漁船の努力量および CPUE を参照する形へ移行した。

表 3-3. 小底標本漁協・標本船の延べ出漁隻数（隻・日）の推移

年	泉佐野	五色	高砂	日生	県内 標本船 8隻計	庵治	東讃	内海	河原津	伊予	上灘	杵築 ・ 日出	合計
	大阪	兵庫	兵庫	岡山	山口	香川	香川	香川	愛媛	愛媛	愛媛	大分	
2002	8,223			1,559	1,843	12,052	4,201	1,955	6,731	2,110	2,225	865	41,764
2003	8,526			2,093	1,925	11,606	3,856	1,571	5,932	2,206	2,304	993	41,012
2004	8,957	1,049	3,570	1,824	1,995	11,510	3,530	1,463	5,921	2,337	2,296	985	45,437
2005	8,460	1,157	3,152	1,467	1,644	13,014	3,319	1,536	5,839	2,165	2,335	931	45,019
2006	7,592	1,243	2,878	1,175	1,962	13,932	3,857	1,429	5,155	2,299	1,970	855	44,347
2007	7,722	1,101	2,773	1,224	2,035	13,693	3,887	1,397	5,171	2,313	2,091	879	44,286
2008	7,331	1,071	2,189	1,262	1,904	12,398	3,507	1,513	4,466	2,129	1,940	919	40,629
2009	7,302	1,039	2,052	1,420	2,090	11,339	3,406	1,084	4,260	2,050	2,122	906	39,070
2010	7,281	977	1,978	1,177	1,841	11,499	2,973	1,153	3,937	1,614	1,768	897	37,095
2011	7,403	1,002	1,487	1,226	1,083	10,580	3,210	1,285	4,096	1,661	1,858	897	35,788
2012	7,138	1,194	1,540	1,090	1,107	9,744	2,669	1,470	3,537	1,457	2,155	852	33,953
2013	6,846	1,241	1,454	880	1,091	8,582	2,191	1,558	3,201	1,484	1,614	811	30,953
2014	6,541	1,087	1,314	1,125	1,099	8,358	1,842	1,308	3,051	1,530	1,663	766	29,684
2015	5,709	1,035	1,546	1,224	1,086	6,977	1,567	1,510	2,622	1,257	1,630	722	26,885
2016	5,698	1,131	1,573	1,145	1,019	6,853	1,530	1,571	2,138	1,787	1,475	737	26,657
2017	5,070	1,229	1,303	1,022	992	6,132	1,077	1,250	1,857	1,467	1,346	710	23,455
2018	6,448	1,104	953	1,160	931	5,682	967	958	1,823	1,447	1,226	667	23,366
2019	5,165	982	1,089	890	921	5,357	956	787	1,416	1,251	849	783	20,446
2020	4,724	909	835	974	833	4,693	809	1,004	1,297	1,194	546	562	18,380
2021	4,360	1,013	648	1,309	810	3,937	755	705	1,087	1,129	716	655	17,124
2022	4,462	670	419	1,593	844	4,401	532	589	1,042	866	703	553	16,674
2023	4,336	835	589	1,469	808	4,378	409	466	952	1,235	861	1,056	17,394
2024	4,592	938	548	1,556	761	3,945	214	661	882	1,144	605	598	16,444

表 4-1. 小底標本漁協・標本船の加重平均 CPUE (kg/隻・日) の推移

年	泉佐野	五色	高砂	日生	県内 標本船 8隻計		庵治	東讃	内海	河原津	伊予	上灘	杵築 ・ 日出	加重 平均 CPUE
	大阪	兵庫	兵庫	岡山	山口	香川	香川	香川	愛媛	愛媛	愛媛	大分		
2002	0.31			1.25	0.38	1.14	0.07	0.14	0.22	0.90	0.74	0.42	0.91	
2003	0.36			1.18	0.31	1.29	0.09	0.15	0.25	1.17	0.62	0.29	1.02	
2004	0.30	0.67	0.36	1.09	0.45	1.68	0.05	0.25	0.43	0.91	0.24	0.37	1.22	
2005	0.25	0.45	0.36	1.09	0.49	1.38	0.05	0.25	0.41	0.77	0.30	0.34	1.03	
2006	0.34	1.19	0.49	0.50	0.39	1.26	0.05	0.23	0.49	1.10	0.25	0.60	0.99	
2007	0.37	1.51	0.45	0.55	0.39	1.06	0.04	0.11	0.24	0.86	0.44	0.20	0.86	
2008	0.18	1.00	0.23	0.87	0.27	0.90	0.03	0.06	0.30	0.86	0.68	0.19	0.75	
2009	0.23	0.92	0.36	0.88	0.38	0.77	0.06	0.05	0.21	0.45	0.28	0.55	0.62	
2010	0.18	0.41	0.33	1.17	0.24	0.66	0.04	0.06	0.37	0.61	0.35	0.55	0.58	
2011	0.20	0.40	0.20	1.35	0.45	0.85	0.02	0.08	0.36	0.52	0.17	0.50	0.71	
2012	0.22	0.25	0.42	0.98	0.66	0.82	0.02	0.08	0.29	0.71	0.37	0.22	0.66	
2013	0.31	0.31	0.37	1.33	0.57	0.95	0.02	0.07	0.57	0.50	0.30	0.31	0.75	
2014	0.31	0.76	0.45	1.14	0.50	1.12	0.02	0.10	0.76	0.77	0.42	0.38	0.87	
2015	0.32	0.85	0.41	1.17	0.63	0.68	0.01	0.10	0.78	0.57	0.82	0.36	0.69	
2016	0.29	0.95	0.32	1.18	0.60	0.59	0.01	0.06	0.80	0.43	0.51	0.27	0.64	
2017	0.34	0.37	0.22	1.17	0.69	0.66	0.02	0.06	0.62	0.71	1.15	0.62	0.70	
2018	0.38	0.37	0.57	1.60	0.69	0.80	0.00	0.04	0.91	0.74	0.58	0.58	0.79	
2019	1.33	0.57	0.88	2.80	1.25	0.79	0.02	0.05	1.10	0.71	0.93	0.22	1.27	
2020	2.73	0.51	1.16	1.76	0.90	1.13	0.04	0.07	1.22	0.93	1.17	0.52	1.94	
2021	2.68	0.34	1.42	0.89	1.55	1.24	0.08	0.15	1.30	0.81	0.79	0.38	1.91	
2022	1.77	0.80	1.47	0.90	1.53	1.02	0.08	0.13	1.77	1.03	1.49	0.71	1.42	
2023	1.18	0.80	0.82	0.74	1.18	1.33	0.29	0.26	1.89	1.05	2.42	0.68	1.33	
2024	1.51	0.59	0.58	0.62	1.05	1.56	0.33	0.09	1.49	0.93	1.17	0.41	1.35	

表 4-2. ヒラメ瀬戸内海系群の資源解析結果

年	漁獲量 (トン)	資源量 (トン)	親魚量 (トン)	加入尾数(千尾)		漁獲割合 (%)	%SPR	F/Fmsy
				天然由来	人工種苗由来			
1994	876	2,451	1,154	2,871	509	35.7	7.9	2.51
1995	1,000	2,773	1,186	3,667	580	36.1	6.6	2.56
1996	1,000	2,884	1,312	2,059	726	34.7	7.5	2.28
1997	973	2,803	1,490	2,787	324	34.7	10.4	2.02
1998	1,039	2,926	1,606	1,269	1,305	35.5	10.2	2.08
1999	1,118	2,851	1,626	1,508	630	39.2	9.9	2.12
2000	1,023	2,682	1,644	1,713	401	38.1	11.3	2.06
2001	1,033	2,621	1,470	2,354	516	39.4	8.0	2.28
2002	1,039	2,555	1,365	1,678	813	40.7	7.5	2.41
2003	912	2,444	1,292	1,995	940	37.3	8.6	2.25
2004	911	2,487	1,270	1,300	1,110	36.6	8.6	2.21
2005	934	2,420	1,319	1,126	977	38.6	9.2	2.18
2006	918	2,326	1,314	1,146	921	39.5	10.2	2.09
2007	835	2,233	1,266	1,125	491	37.4	11.0	2.01
2008	831	2,133	1,271	1,109	553	39.0	10.6	2.05
2009	750	2,003	1,194	1,038	424	37.5	12.4	1.86
2010	751	1,968	1,207	1,033	517	38.2	13.9	1.79
2011	728	1,983	1,188	1,425	121	36.7	14.4	1.73
2012	691	2,008	1,234	817	481	34.4	15.1	1.65
2013	654	1,994	1,280	1,117	126	32.8	17.7	1.47
2014	613	2,005	1,333	922	184	30.6	20.8	1.31
2015	520	2,030	1,395	924	79	25.6	27.6	1.01
2016	482	2,168	1,543	980	136	22.2	32.0	0.86
2017	504	2,363	1,677	1,045	232	21.3	33.3	0.83
2018	519	2,615	1,843	1,385	157	19.8	33.5	0.83
2019	588	2,893	2,050	1,212	86	20.3	29.6	0.94
2020	615	2,988	2,204	523	567	20.6	30.1	0.92
2021	576	2,985	2,259	1,032	176	19.3	32.9	0.83
2022	543	3,019	2,273	1,024	220	18.0	35.1	0.78
2023	521	3,089	2,336	1,046	89	16.9	39.7	0.65
2024	527	3,211	2,464	1,046	89	16.4	39.6	0.66


加入尾数は0歳魚資源尾数。

表 4-3. 人工種苗の放流尾数および標識装着率、混入率と添加効率

放流年	放流尾数 (千尾)	補正なし 混入率(%)	標識装着率	補正済み 混入率(%)	添加効率 (0歳)
1979	161				
1980	227				
1981	140				
1982	171				
1983	719				
1984	1,431				
1985	966				
1986	1,462				
1987	1,840				
1988	1,314				
1989	1,897				
1990	2,616				
1991	2,293				
1992	3,486				
1993	3,031				
1994	2,919				
1995	4,134	13.7	1.00	13.7	0.14
1996	3,817	26.1	1.00	26.1	0.19
1997	4,078	10.4	1.00	10.4	0.08
1998	3,982	50.7	1.00	50.7	0.33
1999	4,695	27.0	0.92	29.5	0.13
2000	4,332	19.0	1.00	19.0	0.09
2001	4,327	18.0	1.00	18.0	0.12
2002	3,537	29.5	0.90	32.6	0.23
2003	4,001	28.8	0.90	32.0	0.24
2004	5,102	40.0	0.87	46.1	0.22
2005	5,079	41.0	0.88	46.5	0.19
2006	5,062	34.3	0.77	44.5	0.18
2007	4,817	22.9	0.75	30.4	0.10
2008	4,440	22.9	0.69	33.3	0.12
2009	3,856	22.4	0.77	29.0	0.11
2010	3,015	26.9	0.81	33.3	0.17
2011	3,144	6.1	0.79	7.8	0.04
2012	2,823	25.1	0.68	37.0	0.17
2013	2,789	7.2	0.71	10.1	0.05
2014	2,884	12.4	0.75	16.6	0.06
2015	2,516	4.8	0.60	7.9	0.03
2016	2,693	7.3	0.60	12.2	0.05
2017	2,592	6.1	0.34	18.1	0.09
2018	2,452	7.4	0.73	10.2	0.06
2019	2,702	3.0	0.46	6.6	0.03
2020	2,447	24.8	0.48	52.0	0.23
2021	2,323	5.7	0.39	14.6	0.08
2022	2,453	6.0	0.34	17.7	0.09
2023	2,786	3.7	0.47	7.8	0.03
2024		3.4	0.44	7.9	—

2024年は放流尾数が未確定であるため、添加効率は算出していない。

補足資料 1 資源評価の流れ



※ 点線枠内は資源管理方針に関する検討会における管理基準値や漁獲管理規則等の議論をふまえて作成される。

(https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html)

補足資料 2 計算方法

(1) 年別年齢別漁獲尾数の推定

1994 年以降、瀬戸内海各地の標本漁協において月別漁業種別の全長測定を行い、それぞれの月別漁獲量で加重平均した瀬戸内海全体の年別期別全長階級別頻度組成を求めた。また、標本漁協の期別の合計漁獲量の割合を用いて、瀬戸内海の漁獲量を期別漁獲量に振り分けた値と、雌雄別全長体重関係、さらに期別全長階級別雌雄割合を用いて、年別期別全長階級別頻度組成を年別期別雌雄別全長階級別重量組成に変換した。

1995 年以降、瀬戸内海各地において耳石による年齢査定と全長・体重測定を行い、期別（1～4 月、5～8 月、9～12 月）雌雄別の Age-Length key（ALK）（山田・本田 2020）と期別全長階級別雌雄比および雌雄別全長体重関係を求めた。年別期別雌雄別全長階級別重量組成に期別雌雄別 ALK を適用して期別雌雄別年齢別全長階級別重量組成を算出し、これに瀬戸内海の期別漁獲量を乗じ、雌雄別各期の全長階級別平均体重で除することによって期別雌雄別年齢別漁獲尾数を算出した。最後に各期の雌雄の漁獲尾数を足し合わせ、年齢別漁獲尾数とした。なお、2019～2024 年については、当該期間中に得られた年齢査定結果に基づき作成した ALK（下表）を適用し、上記と同様の手順にて年齢別漁獲尾数を求めた。

全長階級 (mm)	1～4月						5～8月						9～12月						
	1歳	2歳	3歳	4歳	5+歳	雌の割合	1歳	2歳	3歳	4歳	5+歳	雌の割合	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5+歳	雌の割合
200～240	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
240～280	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
280～320	0.91	0.09	0.00	0.00	0.00	0.35	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.91	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
320～360	0.46	0.54	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.13	0.67	0.20	0.00	0.00	0.00	0.33
360～400	0.11	0.79	0.09	0.00	0.00	0.23	0.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.86	0.14	0.00	0.00	0.00	0.40
400～440	0.02	0.72	0.19	0.08	0.00	0.49	0.24	0.34	0.41	0.00	0.00	0.51	0.00	0.63	0.27	0.03	0.07	0.00	0.57
440～480	0.00	0.62	0.24	0.10	0.05	0.76	0.17	0.33	0.42	0.00	0.08	0.70	0.00	0.46	0.23	0.23	0.08	0.00	0.75
480～520	0.00	0.54	0.14	0.11	0.21	0.77	0.00	0.52	0.29	0.13	0.06	0.73	0.00	0.18	0.27	0.36	0.09	0.09	0.82
520～560	0.00	0.27	0.41	0.14	0.18	0.76	0.00	0.40	0.40	0.10	0.10	0.76	0.00	0.07	0.52	0.26	0.07	0.07	0.75
560～600	0.00	0.00	0.61	0.13	0.26	0.77	0.00	0.00	0.60	0.30	0.10	0.77	0.00	0.00	0.36	0.27	0.27	0.09	0.77
600～640	0.00	0.00	0.39	0.26	0.35	0.82	0.00	0.00	0.33	0.50	0.17	0.82	0.00	0.00	0.09	0.45	0.36	0.09	0.82
640～680	0.00	0.00	0.16	0.26	0.58	0.90	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.40	0.90
680～720	0.00	0.00	0.00	0.08	0.92	0.96	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.67	0.96
720～760	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98
760～800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
800～840	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
840～880	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
880～920	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
920～960	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
960～	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

また、1996～2005 年については、年齢別漁獲尾数の算定に際し、中部海域（統計値の集計範囲としては、広島県、香川県燧灘、愛媛県燧灘）の定置網とその他によるものを分けて求め、それらを足し合わせて全体の年齢別漁獲尾数とした。中部海域の定置網による年齢別漁獲尾数は前述の方法によらず、香川県燧灘の定置網漁獲物から得られた漁獲物の年齢別重量組成と年齢別平均体重、および中部海域の定置網漁獲量から算出した。その他によるものの年齢別漁獲尾数は、東部海域（統計値の集計範囲としては、和歌山県、大阪府、兵庫県、岡山県、徳島県、燧灘を除く香川県）、定置網を除く中部海域、西部海域（統計値の集計範囲としては、山口県、愛媛県伊予灘、福岡県、大分県）についてそれぞれ前述の方法で年齢別漁獲尾数を求めた。

これまでにデータ採集を行った標本漁協と漁業種類は、泉佐野（大阪府）、仮屋・神戸市・塩田・由良・浅野浦・坊勢・室津浦・高砂・五色（兵庫県）、河原津（愛媛県燧灘）および伊予・上灘（愛媛県伊予灘）のそれぞれの小底、伊吹・大浜・仁尾（香川県燧灘）および弓削（愛媛県燧灘）のそれぞれの定置網、西条（愛媛県燧灘）の刺網、徳山・宇

部・防府（山口県）の小底・他、姫島・国見・安岐（大分県）の刺網・建網・一本釣である。

(2) 資源計算方法

1994～2024年までの30年間の0～4歳と5歳以上をプラスグループとした年別年齢別漁獲尾数を用い、チューニングVPA（コホート解析）で資源量推定を行った。1歳魚以上については1月1日を年齢の起算日とした。また0歳魚は秋頃から漁獲加入することから10月1日時点での資源量を推定した。これらを全年齢について合計したものをy年の資源量とした。

チューニングVPA（コホート解析）に用いた生物パラメータを補足表2-2に示す。自然死亡係数（M）の推定には田内・田中の方法（田中1960）を用い、最高年齢を8歳（渡辺ほか2004）と仮定し算出した。なお0歳魚については10月1日時点での加入を想定し、Mを1/4にした値を用いた。

資源尾数から資源量への変換には、1995～2020年の漁獲物精密測定結果（年齢査定済）から求めた雌雄込みの年齢別平均体重を使用した。ここで、当系群の資源評価においては1995年から最新年までの年齢査定済個体の体重データを用いて、新たに年齢別平均体重を更新し、その値を最新年から過去に遡って毎年の年齢別資源尾数に乗じて年齢別資源量を計算し直していた。しかし、当該パラメータが毎年変化することについては問題が指摘されていたため、令和3（2021）年度の資源評価において、今後5年間程度はこの更新を行わないこととした（山下ほか2022）。

実漁獲物における平均体重については、年毎に補足資料2（1）で求めた年齢別重量組成を年齢別漁獲尾数で割ることで算出した。ただし2003年以前については、補足表2-1の平均体重の値に、（漁獲尾数×体重）の和が実漁獲量と等しくなる係数をかけた値とした。

最新年を除くy年a歳（0～3歳）の資源尾数（ $N_{a,y}$ ）および漁獲係数（ $F_{a,y}$ ）は、それぞれ以下の式で求めた（平松2001）。

$$N_{a,y} = N_{a+1,y+1} \exp(M_a) + C_{a,y} \exp\left(\frac{M_a}{2}\right) \quad (0 \leq a \leq 3) \quad (1)$$

$$F_{a,y} = -\ln\left(1 - \frac{C_{a,y} \exp\left(\frac{M_a}{2}\right)}{N_{a,y}}\right) \quad (0 \leq a \leq 3) \quad (2)$$

なお、 M_a はa歳の自然死亡係数、 $C_{a,y}$ はy年a歳の漁獲尾数である。

5歳以上はプラスグループ（5+）であり、4歳と5+歳の漁獲係数は等しいと仮定して、4歳魚以上の資源尾数を以下の式で求めた。

$$N_{4,y} = \left(\frac{C_{4,y}}{(C_{4,y} + C_{5+,y})}\right) N_{5+,y+1} \exp(M_4) + C_{4,y} \exp\left(\frac{M_4}{2}\right) \quad (3)$$

$$N_{5+,y} = \left(\frac{C_{5+,y}}{C_{4,y}}\right) N_{4,y} \quad (4)$$

最新年の資源尾数は、以下の式で求めた。

$$N_{a,y} = \frac{C_{a,y}}{1 - \exp(-F_{a,y})} \exp\left(\frac{M_a}{2}\right) \quad (1 \leq a \leq 5^+) \quad (5)$$

最新年の F (ターミナル F) は F_{4,y} を未知パラメータとし F_{5+,y}=F_{4,y}、また F_{0,y}~F_{3,y} は、4+歳の F との比が F の過去 3 年平均値 (2021~2023 年平均値) の比に等しいと仮定した。

$$F_{a,y} = \left(\frac{\sum_{b=1}^3 F_{a,y-b}}{\sum_{b=1}^3 F_{4,y-b}} \right) F_{4,y} \quad (1 \leq a \leq 3) \quad (6)$$

F_{4,y} は、y 年における CPUE の観測値 (標本港および標本船の漁獲量と延べ出漁隻数から求めた CPUE (kg/隻・日)、数値は表 4-1 参照) を各港または各船の漁獲量で加重平均した値 (u_y) を資源量指標値として使用したチューニング VPA (コホート解析) により推定した (平松 2001)。対数変換した u_y は、次のような正規分布の確率変数であると仮定した。

$$\ln(u_y) = \ln q \sum_a (s_{a,y} N_{a,y} W_a)^b + \varepsilon_y \quad \text{なお、} \varepsilon_y \sim N(0, \sigma^2) \quad (7)$$

s_{a,y}、W_a はそれぞれ y 年 a 歳の選択率 (その年の年齢別 F の最大値に対する a 歳の比) と a 歳の平均体重であり、b はチューニング指標値と対象資源量との非線形関係を表すパラメータである。

q は漁具能率であり、チューニングに使用した調査の年数を T 年とすると (8) 式により求められる。

$$q = \exp\left(\frac{\sum_y \ln(u_y) - b \sum_y \ln(\sum_a (s_{a,y} N_{a,y} W_a)^b)}{T}\right) \quad (8)$$

チューニング VPA (コホート解析) で推定する資源量より求めた CPUE の理論値と CPUE の観測値のトレンドが最も一致するように、(9) 式を最小とするパラメータ F_{4,y} と b を推定した。

$$SS = \sum_y \left(\ln(u_y) - \ln\left(q \sum_a (s_{a,y} N_{a,y} W_a)^b\right) \right)^2 \quad (9)$$

その結果、非線形パラメータ b は 1.48 と推定された。

親魚量は 1 歳以上の資源尾数に平均体重と成熟率 (fra、補足表 2-1) をかけることで求めた。なお、ここで用いている成熟率は雌の値である。

$$SB_y = \sum_{a=1}^{5+} N_{a,y} W_a f r_a \quad (10)$$

以上の計算から推定されたチューニング VPA（コホート解析）の結果の詳細は補足表 2-2 に示した。

(3) 混入率および天然由来、人工種苗由来の加入尾数の推定

0 歳魚漁獲物における人工種苗放流個体の混入率の推定、および 0 歳資源尾数 $N_{0,y}$ の天然由来加入尾数 R_{ny} と人工種苗由来加入尾数 R_{ay} への分解は以下の方法で行った。

ヒラメ人工種苗の多くの個体で無眼側に黒色素の沈着異常が発生する。これを人工種苗における標識の代わりに用い、人工種苗放流時の黒化個体混入率（=標識装着率）を、各県を通じて収集した。黒化個体混入率は年や生産施設・業者によって様々に異なり、また放流尾数も異なるため、瀬戸内海全体を代表する標識装着率の計算に際しては、本来であれば各県・海域毎の放流尾数の大小で加重平均する、あるいは海域を区分してそれぞれの場所における標識装着率を別々に取り扱うのが望ましい。しかし、全ての放流海域において標識装着率を調査・把握するには至らず（2024 年実績は和歌山・大阪・兵庫・山口・香川・愛媛の 6 府県）、海域毎に分けた詳細な検討を行うのに十分なデータが揃っていないため、現状ではデータのある府県の標識装着率を単純平均した値を瀬戸内海全域の標識装着率として利用している。

続いて、生物情報収集調査で各府県より得られるヒラメ漁獲物の精密測定結果を用い、無眼側黒化の判定が行われた 0 歳魚漁獲物中の黒化個体混入率を推定する。瀬戸内海を東部（紀伊水道、大阪湾、播磨灘、備讃瀬戸）、中部（燧灘、備後・芸予瀬戸、安芸灘）、西部（伊予灘、周防灘）の 3 海域に分割し、それぞれの海域における測定標本数とその中に含まれる黒化個体数を求め、海域毎の（見かけ上の）混入率を計算する。2024 年実績で 0 歳魚における黒化個体の判定結果が得られている府県は、大阪、兵庫、山口、香川、愛媛（東予）、大分の 6 府県であった（なお 1 歳魚以上まで含めると精密測定で黒化個体を調査している県は増加するが、現時点では毎年異なる標識装着率を複数年級群に反映させるための計算準備が整っておらず、0 歳魚に限った判定に留まっている）。その後、3 海域の混入率の単純平均を取り（=瀬戸内海全体としての見かけ上の混入率）、この値を人工種苗放流時に求めた標識装着率で割ることで瀬戸内海全体としての補正済みの人工種苗混入率を求める。

y 年における人工種苗由来の加入尾数 R_{ay} は、以下の式で計算される。

$$R_{ay} = N_{0,y} \times \text{補正済み人工種苗混入率} \quad (11)$$

また、添加効率とは全ての放流尾数のうち生き残り、資源に添加された尾数の割合で、以下の式で計算される。

$$\text{添加効率} = \frac{R_{ay}}{y\text{年の人工種苗放流尾数}} \quad (12)$$

よって、(12) 式は添加効率と人工種苗放流尾数との積に書き直すことが出来る。

$$Ra_y = y\text{年の人工種苗放流尾数} \times \text{添加効率} \quad (13)$$

その後、 $N_{0,y}$ から Ra_y を減じることで、各年の天然由来加入尾数 Rn_y を求めた。

$$Rn_y = N_{0,y} - Ra_y \quad (14)$$

(4) YPR、SPR の解析

加入あたり漁獲量 (YPR) と加入あたり親魚量 (SPR) は、以下の式で求めた。

$$YPR = \sum_{a=1}^{\infty} S_a W_a \exp(-M_a/2) (1 - \exp(-F_a)) \quad (15)$$

$$SPR = \sum_{a=0}^{\infty} fra S_a W_a \quad (16)$$

$$S_{a+1} = S_a \exp(-F_a - M_a) \quad (\text{ただし } S_0=1) \quad (17)$$

ここで、 S_a は a 歳における生残率、 fra は a 歳の雌の成熟割合を示す。

なお、本系群における M の推定では寿命を 8 歳と仮定しているが、YPR および SPR の計算においては MSY 算定の際の設定に合わせて寿命を与えずに計算を行った。

(5) モデル診断結果


「令和 7 (2025) 年 資源評価におけるモデル診断の手順と診断結果の提供指針. FRA-SA2025-ABCWG02-03. 水産研究・教育機構 (2025)」に従い、本系群の評価に用いた VPA の統計学的妥当性や仮定に対する頑健性について診断した。

チューニングにおける残差を補足図 2-1 に示す。2018 年までは負の残差となることが多かったが、2020、2021 年に比較的高い正の残差を示した。2022 年は正の残差、2023 年以降は再び負の残差となっている。レトロスペクティブ解析 (補足図 2-2) においては、データの追加・更新が行われることで、加入量 (0 歳魚資源尾数) を過少に推定する傾向が認められる。今後、生物特性の見直しや加入量指標値の探索・検討を含めチューニング指数に関する検討を通じて、改善を図ることが重要である。

引用文献


- 平松一彦 (2001) VPA (Virtual Population Analysis). 平成 12 年度資源評価体制確立推進事業 報告書—資源解析手法教科書—, 日本水産資源保護協会, 104-128.
- 水産研究・教育機構 (2025) 令和 7 (2025) 年 資源評価におけるモデル診断の手順と診断結果の提供指針. FRA-SA2025-ABCWG02-03, 水産研究・教育機構, 横浜, 13 pp. https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2025-ABCWG02-03.pdf (last accessed 29 July 2024)
- 田中昌一 (1960) 水産生物の population dynamics と漁業資源管理. 東海水研報, 28, 1-200.
- 渡辺昭生・武智昭彦・前原 務・福田雅明 (2004) 濠洲西部海域におけるヒラメの着底密度と加入尾数の関係. 2004 年度水産海洋学会研究発表大会講演要旨集, 16.

- 山田徹生・本田聡 (2020) 令和元 (2019) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価. 令和元年度我が国周辺水域の漁業資源評価, 水産庁・水産研究・教育機構, 東京, 43 pp. https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2023/07/details_2019_061.pdf (last accessed 22 July 2025)
- 山下夕帆・山田徹生・真鍋明弘・金谷彩友美・阪地英男 (2022) 令和3 (2021) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価. FRA-SA2021-RC03-3, 令和3年度我が国周辺水域の漁業資源評価, 水産庁・水産研究・教育機構, 東京, 45 pp. https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2021/details_2021_61.pdf (last accessed 22 July 2025)



補足図 2-1. チューニング VPA における残差プロット

Sigma は観測誤差、rho は残差の自己相関係数、薄い灰色は 1.96σ 区間（95%区間）、濃い灰色は 1.28σ 区間（80%区間）を示す。



補足図 2-2. 資源量 (biomass、トン)、資源尾数 (fish number、千尾)、漁獲係数 (fishing_mortality)、0 歳資源尾数 (Recruitment、千尾)、親魚量 (SSB、トン) のレトロスペクティブ解析結果

補足表 2-1. VPA 計算に用いた年齢別平均体重、成熟率および自然死亡係数

年齢	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5+ 歳
平均体重 (g)	107	349	848	1,660	2,651	3,853
成熟率	0.000	0.042	0.750	0.818	1.000	1.000
自然死亡係数	0.0781	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125

補足表 2-2. 資源解析結果 (1994~2003 年)

年齢別漁獲尾数(千尾)										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	468	899	484	612	230	415	141	532	462	513
1歳	923	1,297	1,542	749	915	808	462	764	974	752
2歳	374	395	412	443	434	386	466	398	338	369
3歳	78	98	96	95	121	121	138	112	91	89
4歳	26	24	24	29	37	40	41	32	31	25
5+歳	30	16	10	21	24	31	32	22	35	25
合計	1,899	2,728	2,569	1,948	1,762	1,801	1,280	1,861	1,931	1,774

年齢別漁獲量(トン)										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	44	82	43	63	23	46	15	58	49	53
1歳	281	387	447	250	300	292	159	271	338	254
2歳	277	286	291	360	346	340	392	343	285	303
3歳	113	139	133	151	189	209	227	188	151	143
4歳	60	53	53	73	93	109	107	87	83	65
5+歳	101	52	34	77	88	122	123	87	133	95
合計	876	1,000	1,000	973	1,039	1,118	1,023	1,033	1,039	912

年齢別漁獲係数										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	0.16	0.25	0.20	0.23	0.10	0.23	0.07	0.21	0.21	0.20
1歳	0.69	0.84	0.89	0.54	0.63	0.58	0.42	0.67	0.76	0.64
2歳	0.85	0.88	0.84	0.82	0.82	0.71	0.95	0.95	0.87	0.89
3歳	0.74	0.65	0.63	0.53	0.65	0.67	0.70	0.73	0.69	0.69
4歳	0.77	0.61	0.36	0.44	0.47	0.53	0.58	0.39	0.54	0.47
5+歳	0.77	0.61	0.36	0.44	0.47	0.53	0.58	0.39	0.54	0.47
%SPR	7.92	6.62	7.49	10.39	10.15	9.89	11.28	8.04	7.46	8.60
F/Fmsy	2.51	2.56	2.28	2.02	2.08	2.12	2.06	2.28	2.41	2.25

年齢別資源尾数(千尾)										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	3,380	4,246	2,785	3,111	2,574	2,138	2,115	2,870	2,491	2,935
1歳	2,159	2,676	3,062	2,110	2,288	2,159	1,578	1,820	2,142	1,860
2歳	766	790	849	922	903	891	888	759	678	734
3歳	174	241	240	268	296	290	322	251	215	207
4歳	56	61	92	93	115	113	108	117	88	79
5+歳	65	41	41	68	76	87	86	80	98	79
合計	6,600	8,054	7,069	6,572	6,252	5,678	5,097	5,898	5,713	5,896

年齢別資源量(トン)										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	360	453	297	331	274	228	225	306	265	313
1歳	753	933	1,068	736	798	753	550	635	747	649
2歳	650	669	719	781	766	756	753	644	575	622
3歳	289	399	399	445	491	481	534	417	357	344
4歳	149	161	245	247	305	299	287	311	234	210
5+歳	251	158	156	261	291	335	331	308	376	306
合計	2,451	2,773	2,884	2,803	2,926	2,851	2,682	2,621	2,555	2,444
漁獲割合(%)	35.7	36.1	34.7	34.7	35.5	39.2	38.1	39.4	40.7	37.3

年齢別親魚量(トン)										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1歳	32	39	45	31	34	32	23	27	31	27
2歳	487	502	540	586	575	567	565	483	431	467
3歳	236	327	326	364	402	394	437	341	292	281
4歳	149	161	245	247	305	299	287	311	234	210
5+歳	251	158	156	261	291	335	331	308	376	306
合計	1,154	1,186	1,312	1,490	1,606	1,626	1,644	1,470	1,365	1,292

漁獲物平均体重(g)										
年	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0歳	93	91	89	102	100	111	106	108	106	103
1歳	305	298	290	334	328	362	345	354	347	337
2歳	741	726	705	813	797	880	840	861	844	820
3歳	1,451	1,420	1,380	1,591	1,560	1,723	1,645	1,686	1,651	1,606
4歳	2,318	2,269	2,205	2,542	2,492	2,752	2,627	2,693	2,638	2,565
5+歳	3,369	3,297	3,205	3,694	3,622	4,000	3,819	3,914	3,834	3,728

補足表 2-2. (続き)

年齢別漁獲尾数(千尾)										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	310	295	201	103	158	162	137	126	72	107
1歳	962	735	607	665	505	473	349	405	387	272
2歳	371	412	388	312	335	244	238	218	243	232
3歳	93	96	109	104	102	90	91	89	96	85
4歳	21	24	21	26	29	28	30	31	29	25
5+歳	21	21	23	23	21	22	27	23	18	22
合計	1,778	1,583	1,349	1,232	1,150	1,019	873	893	845	743

年齢別漁獲量(トン)										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	60	57	35	20	23	28	16	19	14	16
1歳	275	262	237	185	170	174	140	157	136	129
2歳	268	295	304	256	265	204	199	198	214	200
3歳	160	167	192	196	189	168	174	167	185	151
4歳	58	70	57	79	84	85	88	91	78	69
5+歳	89	83	93	99	100	92	134	95	63	89
合計	911	934	918	835	831	750	751	728	691	654

年齢別漁獲係数										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	0.14	0.16	0.11	0.07	0.10	0.12	0.10	0.09	0.06	0.09
1歳	0.71	0.59	0.56	0.60	0.55	0.51	0.42	0.45	0.42	0.33
2歳	0.93	0.92	0.87	0.74	0.84	0.66	0.61	0.58	0.63	0.57
3歳	0.67	0.78	0.79	0.70	0.68	0.66	0.65	0.56	0.65	0.55
4歳	0.40	0.42	0.44	0.50	0.49	0.46	0.56	0.55	0.40	0.39
5+歳	0.40	0.42	0.44	0.50	0.49	0.46	0.56	0.55	0.40	0.39
%SPR	8.63	9.17	10.16	11.01	10.65	12.44	13.91	14.40	15.12	17.70
F/Fmsy	2.21	2.18	2.09	2.01	2.05	1.86	1.79	1.73	1.65	1.47

年齢別資源尾数(千尾)										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	2,410	2,103	2,067	1,616	1,661	1,463	1,550	1,545	1,298	1,243
1歳	2,222	1,930	1,661	1,718	1,396	1,384	1,197	1,301	1,308	1,131
2歳	718	802	784	697	688	589	608	577	605	626
3歳	221	208	235	241	243	217	222	242	235	235
4歳	76	83	70	78	87	90	82	85	101	90
5+歳	73	73	75	68	65	69	73	65	63	80
合計	5,718	5,199	4,891	4,418	4,141	3,812	3,733	3,814	3,610	3,405

年齢別資源量(トン)										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	257	224	220	172	177	156	165	165	138	132
1歳	775	673	579	599	487	483	417	454	456	394
2歳	608	680	665	591	583	500	516	489	513	531
3歳	367	345	389	400	404	361	369	401	391	390
4歳	201	219	185	207	232	239	218	224	267	238
5+歳	280	280	288	263	251	264	283	250	243	308
合計	2,487	2,420	2,326	2,233	2,133	2,003	1,968	1,983	2,008	1,994
漁獲割合(%)	36.6	38.6	39.5	37.4	39.0	37.5	38.2	36.7	34.4	32.8

年齢別親魚量(トン)										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1歳	33	28	24	25	20	20	18	19	19	17
2歳	456	510	498	443	438	375	387	367	385	398
3歳	300	282	319	327	330	295	302	328	320	319
4歳	201	219	185	207	232	239	218	224	267	238
5+歳	280	280	288	263	251	264	283	250	243	308
合計	1,270	1,319	1,314	1,266	1,271	1,194	1,207	1,188	1,234	1,280

漁獲物平均体重(g)										
年	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0歳	192	192	172	197	144	171	119	155	194	149
1歳	286	356	391	278	337	367	400	388	352	475
2歳	723	716	783	823	792	837	835	905	883	860
3歳	1,731	1,745	1,756	1,881	1,844	1,873	1,904	1,885	1,923	1,775
4歳	2,718	2,895	2,720	3,008	2,927	2,986	2,898	2,960	2,730	2,792
5+歳	4,345	3,914	4,110	4,299	4,671	4,232	4,960	4,071	3,494	4,012

補足表 2-2. (続き)

年齢別漁獲尾数(千尾)											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	47	26	14	32	62	19	14	16	9	9	10
1歳	252	166	109	147	165	310	195	113	158	107	108
2歳	183	150	145	125	142	145	173	163	117	105	128
3歳	82	71	72	64	70	80	94	103	90	78	86
4歳	30	30	30	30	29	36	43	44	40	40	37
5+歳	25	22	22	30	28	39	46	41	44	48	44
合計	619	465	394	427	496	628	566	480	458	387	413

年齢別漁獲量(トン)											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	11	5	3	5	11	5	3	4	2	2	2
1歳	92	66	53	55	76	132	84	59	60	46	56
2歳	161	139	132	113	129	130	170	178	125	115	132
3歳	159	139	135	120	125	117	142	155	149	130	133
4歳	88	88	82	85	75	80	88	87	87	89	78
5+歳	102	83	78	126	103	125	128	93	121	138	126
合計	613	520	482	504	519	588	615	576	543	521	527

年齢別漁獲係数											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	0.05	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1歳	0.33	0.22	0.15	0.18	0.18	0.31	0.21	0.14	0.18	0.12	0.13
2歳	0.44	0.38	0.35	0.30	0.31	0.28	0.32	0.32	0.24	0.20	0.22
3歳	0.46	0.35	0.37	0.29	0.31	0.33	0.33	0.37	0.33	0.29	0.29
4歳	0.43	0.35	0.28	0.29	0.24	0.29	0.34	0.29	0.27	0.28	0.25
5+歳	0.43	0.35	0.28	0.29	0.24	0.29	0.34	0.29	0.27	0.28	0.25
%SPR	20.75	27.61	32.03	33.29	33.54	29.55	30.08	32.93	35.09	39.69	39.55
F/Fmsy	1.31	1.01	0.86	0.83	0.83	0.94	0.92	0.83	0.78	0.65	0.66

年齢別資源尾数(千尾)											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	1,106	1,004	1,117	1,276	1,542	1,299	1,090	1,207	1,244	1,134	1,136
1歳	1,046	978	903	1,019	1,149	1,367	1,183	994	1,101	1,142	1,041
2歳	595	550	574	567	620	700	735	698	631	671	744
3歳	260	279	274	295	308	332	388	390	371	361	401
4歳	99	120	144	139	161	166	175	203	198	194	198
5+歳	84	87	107	138	152	180	189	190	215	230	235
合計	3,190	3,017	3,118	3,435	3,933	4,043	3,760	3,683	3,760	3,733	3,754

年齢別資源量(トン)											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	118	107	119	136	164	138	116	129	133	121	121
1歳	365	341	315	355	401	476	412	347	384	398	363
2歳	505	466	486	481	526	593	623	592	535	569	631
3歳	431	463	455	490	512	551	645	647	616	600	665
4歳	263	317	381	368	427	440	464	539	524	515	525
5+歳	324	335	411	533	586	693	728	731	828	887	906
合計	2,005	2,030	2,168	2,363	2,615	2,893	2,988	2,985	3,019	3,089	3,211
漁獲割合(%)	30.6	25.6	22.2	21.3	19.8	20.3	20.6	19.3	18.0	16.9	16.4

年齢別親魚量(トン)											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1歳	15	14	13	15	17	20	17	15	16	17	15
2歳	378	350	365	361	394	445	467	444	401	427	473
3歳	352	379	372	401	419	451	527	530	504	491	544
4歳	263	317	381	368	427	440	464	539	524	515	525
5+歳	324	335	411	533	586	693	728	731	828	887	906
合計	1,333	1,395	1,543	1,677	1,843	2,050	2,204	2,259	2,273	2,336	2,464

漁獲物平均体重(g)											
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0歳	226	177	197	168	183	251	195	219	193	226	234
1歳	367	397	484	372	465	425	431	528	379	435	518
2歳	883	926	910	907	905	897	986	1,091	1,068	1,093	1,028
3歳	1,936	1,975	1,857	1,871	1,794	1,471	1,506	1,506	1,645	1,677	1,538
4歳	2,959	2,937	2,707	2,862	2,531	2,217	2,047	1,987	2,162	2,209	2,123
5+歳	4,019	3,796	3,485	4,251	3,693	3,211	2,747	2,263	2,774	2,893	2,866

補足資料3 管理基準値案と禁漁水準案等


令和3年9月に開催された「管理基準値等に関する研究機関会議」により、目標管理基準値 (SBtarget) には MSY 水準における親魚量 (SBmsy : 24 百トン)、限界管理基準値 (SBlimit) には MSY の 60% が得られる親魚量 (SB0.6msy : 9 百トン)、禁漁水準 (SBban) には MSY の 10% が得られる親魚量 (SB0.1msy : 1 百トン) を用いることが提案されている (山下ほか 2021、補足表 6-2)。この推定に用いたパラメータ値は補足表 3-1 に示す。

目標管理基準値案と、SBmsy を維持する漁獲圧 (Fmsy) を基準にした神戸プロットを補足図 3-1 に示す。コホート解析により得られた 2024 年の親魚量 (SB2024 : 25 百トン) は目標管理基準値案、限界管理基準値案および禁漁水準案を上回る。2024 年の漁獲圧は Fmsy を下回る (補足表 6-3)。


平衡状態における平均親魚量と年齢別平均漁獲量との関係を補足図 3-2 に示す。親魚量が SBlimit 以下では 1~3 歳魚が多くを占めるが、親魚量が増加するにつれて高齢魚の比率が高くなる傾向がみられ、SBmsy 達成時においては 3 歳以上の漁獲が主体となっている。

引用文献

山下夕帆・山田徹生・真鍋明弘・金谷彩友美・阪地英男 (2021) 令和 3 (2021) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2021-BRP04-001, 水産研究・教育機構, 横浜, 40 pp. http://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/20210928/doc_hirame_setonaikai_RIM.pdf (last accessed 22 July 2025)



補足図 3-1. 管理基準値案と親魚量・漁獲圧との関係 (神戸プロット)



補足図 3-2. 平衡状態における平均親魚量と年齢別平均漁獲量との関係（漁獲量曲線）

補足表 3-1. 最大持続生産量 MSY を実現する水準の推定に用いたパラメータ値

年齢	選択率	Fmsy	現状の漁獲圧 (F2020)	平均体重 (g)	自然死亡 係数	成熟 割合
0 歳	0.034	0.014	0.010	107	0.078	0.000
1 歳	0.467	0.187	0.143	349	0.313	0.042
2 歳	0.922	0.369	0.283	848	0.313	0.750
3 歳	1.000	0.400	0.307	1,660	0.313	0.818
4 歳	0.949	0.380	0.291	2,651	0.313	1.000
5 歳以上	0.949	0.380	0.291	3,853	0.313	1.000

補足資料 4 漁獲管理規則案に対応した将来予測

(1) 将来予測の設定

資源評価で推定した 2024 年の資源量から、コホート解析の前進法を用いて 2025～2056 年の将来予測計算を行った（補足資料 5）。将来予測における加入量は、各年の親魚量から予測される値を再生産関係式から与えた。加入量の不確実性として、対数正規分布に従う誤差を仮定し、1 万回の繰り返し計算を行った。また本系群においては継続して種苗放流が行われているため、現状の放流が継続される場合として、2021～2023 年平均の添加効率と 2023 年の放流尾数を乗じた値を人工種苗由来の加入尾数として毎年の加入量に加算した条件での予測も行った。

2025 年の漁獲量は、予測される資源量と現状の漁獲圧（F2024）から仮定した。現状の漁獲圧は、管理基準値案を算出した時と同じ選択率や生物パラメータ（平均体重等）の条件下で、今年度評価における 2024 年の漁獲圧に対応する %SPR（39.6%）を与える F 値とした。2026 年以降の漁獲圧には、各年に予測される親魚量をもとに下記の漁獲管理規則案で定められる漁獲圧を用いた。

(2) 漁獲管理規則案

漁獲管理規則案は、目標管理基準値案以上に親魚量を維持・回復する達成確率を勘案して、親魚量に対応した漁獲圧（F）等を定めたものである。「漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針」では、親魚量が限界管理基準値案を下回った場合には禁漁水準案まで直線的に漁獲圧を削減するとともに、親魚量が限界管理基準値案以上にある場合には F_{msy} に調整係数 β を乗じた値を漁獲圧の上限とするものを提示している。補足図 4-1 に本系群の「管理基準値等に関する研究機関会議」により提案された漁獲管理規則を示す。ここでは例として調整係数 β を 0.8 とした場合を示した。なお、研究機関会議提案では「親魚量が限界管理基準値を下回るリスクは低いが、本資源は資源評価対象期間が短く再生産関係等に不確実性が懸念されるため、 β は標準値である 0.8 以下にすることが望ましい」とされている。

(3) 2026 年の予測値

漁獲管理規則案に基づき試算された 2026 年の平均漁獲量は、加入量として再生産関係による加入のみを想定した場合、現状の放流を想定した場合ともに β を 0.8 とした場合には 699 トン（90%予測区間は 681～725 トン）であった（補足表 4-4、6-4、6-5）。2026 年に予測される親魚量は、いずれの繰り返し計算でも目標管理基準値案を上回り、どちらの場合でも平均 26 百トンと見込まれた（補足表 6-4、6-5、6-8）。この親魚量は限界管理基準値案以上であるため、2026 年の漁獲圧は $\beta \times F_{msy}$ として求めた。

(4) 2027 年以降の予測


2027 年以降も含めた将来予測の結果を補足図 4-2、4-3 および補足表 4-1～4-4 に示す。

漁獲管理規則案に基づく管理を 10 年間継続した場合、将来の加入量として再生産関係による加入のみを想定した場合（補足図 4-2、補足表 4-1a～4-4a）では 2036 年の親魚量の予測値は β を 0.8 とした場合には平均 28 百トン（90%予測区間は 18 百～41 百トン）であ


り、 β を1.0とした場合には平均23百トン（90%予測区間は15百～34百トン）である（補足表6-6）。予測値が目標管理基準値案を上回る確率は β が0.9以下で50%を上回る。限界管理基準値案を上回る確率は1以下のいずれの β においても100%である。現状の漁獲圧（F2024）を継続した場合の2036年の親魚量の予測値は平均33百トン（90%予測区間は21百～47百トン）であり、目標管理基準値案を上回る確率は81%、限界管理基準値案を上回る確率は100%である。

同様に、現状の放流を想定した場合（補足図4-3、補足表4-1b～4-4b）では、2036年の親魚量の予測値は β を0.8とした場合には平均32百トン（90%予測区間は22百～44百トン）であり、 β を1.0とした場合には平均26百トン（90%予測区間は18百～37百トン）である（補足表6-7）。予測値が目標管理基準値案および限界管理基準値案を上回る確率は、1以下のいずれの β においても50%を上回る。現状の漁獲圧（F2024）を継続した場合の2036年の親魚量の予測値は平均37百トン（90%予測区間は26百～51百トン）であり、目標管理基準値案を上回る確率は93%、限界管理基準値案を上回る確率は100%である。

a) 縦軸を漁獲圧にした場合




b) 縦軸を漁獲量にした場合




補足図 4-1. 漁獲管理規則案

目標管理基準値 (SBtarget) 案は HS 再生産関係に基づき算出した SBmsy である。限界管理基準値 (SBlimit) 案および禁漁水準 (SBban) 案には、それぞれ標準値を用いている。調整係数 β には標準値である 0.8 を用いた。黒破線は Fmsy、灰色破線は 0.8Fmsy、黒太線は HCR 案、赤破線は禁漁水準案、黄破線は限界管理基準値案、緑破線は目標管理基準値案を示す。a) は縦軸を漁獲圧にした場合、b) は縦軸を漁獲量で表した場合である。b) については、漁獲する年の年齢組成によって漁獲量は若干異なるが、ここでは平衡状態における平均的な年齢組成の場合の漁獲量を示した。



補足図 4-2. 将来の加入量として再生産関係による加入のみを想定し、漁獲管理規則案に従って漁獲を続けた場合（赤線）と現状の漁獲圧（F2024）で漁獲を続けた場合の将来予測（青色）

太実線は平均値、網掛けはシミュレーション結果の 90%が含まれる予測区間、細線は 5 通りの将来予測の例示である。親魚量の図の緑破線は目標管理基準値案、黄一点鎖線は限界管理基準値案、赤点線は禁漁水準案を示す。漁獲量の図の黒破線は最大持続生産量 MSY を、漁獲割合の図の黒破線は目標管理基準値案を維持する漁獲割合の水準 (Umsy) を示す。漁獲管理規則案での調整係数 β には 0.8 を用いた。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧 (F2024) により仮定した。



補足図 4-3. 現状の放流を想定し、漁獲管理規則案に従って漁獲を続けた場合（赤線）と現状の漁獲圧（F2024）で漁獲を続けた場合の将来予測（青色）
 太実線は平均値、網掛けはシミュレーション結果の 90%が含まれる予測区間、細線は 5 通りの将来予測の例示である。親魚量の図の緑破線は目標管理基準値案、黄一点鎖線は限界管理基準値案、赤点線は禁漁水準案を示す。漁獲量の図の黒破線は最大持続生産量 MSY を、漁獲割合の図の黒破線は目標管理基準値案を維持する漁獲割合の水準（Umsy）を示す。漁獲管理規則案での調整係数 β には 0.8 を用いた。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧（F2024）により仮定した。現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021～2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足表 4-1. 将来の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率

a) 再生産関係による加入のみを想定した場合 (%)

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1.0	100	100	39	21	22	24	28	30	34	36	37	40		
0.9			69	36	34	35	37	40	44	47	49	52		
0.8			93	58	52	52	52	54	57	60	63	63		
0.7			100	81	71	68	66	68	69	73	75	76		
0.6			100	96	87	82	81	81	82	83	85	85		
0.5			100	100	97	93	91	91	92	92	93	93		
0.4			100	100	100	98	97	97	97	98	98	98		
0.3			100	100	100	100	99	99	99	99	99	99		
0.2			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
0.1			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
0.0			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
現状の漁獲圧					100	88	77	74	72	73	75	77	79	81

b) 現状の放流を想定した場合 (%)

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1.0	100	100	40	27	30	35	41	45	48	52	55	56		
0.9			70	46	46	52	56	58	61	64	68	68		
0.8			93	69	67	68	70	73	76	78	80	82		
0.7			100	89	83	82	85	86	87	89	89	91		
0.6			100	99	96	93	93	95	95	96	96	96		
0.5			100	100	100	98	98	98	99	99	99	99		
0.4			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
0.3			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
0.2			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
0.1			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
0.0			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
現状の漁獲圧					100	94	88	88	88	89	91	92	92	93

β を 0.0~1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧 (F2024) から予測される 578 トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧 (F2024、 $\beta=0.66$ に相当) で漁獲を続けた場合の結果も示した。現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021~2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足表 4-2. 将来の親魚量が限界管理基準値案を上回る確率

a) 再生産関係による加入のみを想定した場合 (%)

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
0.9			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.8			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.7			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.6			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.5			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.4			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.3			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.2			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.1			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.0			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
現状の漁獲圧			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

b) 現状の放流を想定した場合 (%)

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.9			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.8			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.7			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.6			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.5			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.4			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.3			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.2			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.1			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0.0			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
現状の漁獲圧			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

β を 0.0~1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧 (F2024) から予測される 578 トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧 (F2024、 $\beta = 0.66$ に相当) で漁獲を続けた場合の結果も示した。現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021~2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足表 4-3. 将来の親魚量の平均値の推移

a) 再生産関係による加入のみを想定した場合（トン）

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1.0	2,567	2,637	2,416	2,235	2,152	2,134	2,151	2,191	2,234	2,273	2,310	2,335		
0.9			2,500	2,375	2,327	2,329	2,356	2,404	2,454	2,499	2,542	2,570		
0.8			2,588	2,526	2,519	2,546	2,589	2,648	2,707	2,759	2,808	2,842		
0.7			2,678	2,687	2,731	2,791	2,854	2,928	2,999	3,061	3,117	3,157		
0.6			2,773	2,860	2,965	3,067	3,156	3,250	3,337	3,411	3,478	3,526		
0.5			2,870	3,046	3,222	3,377	3,502	3,624	3,731	3,822	3,901	3,960		
0.4			2,971	3,245	3,507	3,727	3,899	4,056	4,192	4,305	4,403	4,476		
0.3			3,076	3,458	3,821	4,123	4,355	4,560	4,734	4,877	5,000	5,093		
0.2			3,185	3,687	4,168	4,571	4,881	5,149	5,374	5,559	5,715	5,837		
0.1			3,298	3,933	4,552	5,078	5,488	5,839	6,133	6,376	6,580	6,741		
0.0			3,415	4,197	4,976	5,653	6,190	6,650	7,038	7,361	7,633	7,851		
現状の漁獲圧					2,714	2,752	2,817	2,892	2,964	3,045	3,121	3,187	3,247	3,291

b) 現状の放流を想定した場合（トン）

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1.0	2,567	2,637	2,418	2,302	2,288	2,338	2,403	2,467	2,522	2,568	2,609	2,636		
0.9			2,503	2,444	2,469	2,544	2,627	2,703	2,769	2,822	2,869	2,900		
0.8			2,590	2,596	2,667	2,775	2,881	2,974	3,052	3,114	3,168	3,205		
0.7			2,681	2,758	2,884	3,034	3,169	3,284	3,378	3,452	3,516	3,560		
0.6			2,775	2,933	3,124	3,324	3,497	3,640	3,755	3,845	3,921	3,975		
0.5			2,873	3,120	3,389	3,651	3,872	4,051	4,193	4,305	4,397	4,464		
0.4			2,974	3,320	3,680	4,020	4,301	4,526	4,705	4,845	4,959	5,044		
0.3			3,079	3,535	4,001	4,435	4,792	5,078	5,305	5,483	5,628	5,736		
0.2			3,188	3,765	4,356	4,904	5,356	5,721	6,011	6,241	6,428	6,570		
0.1			3,301	4,013	4,748	5,433	6,006	6,473	6,848	7,148	7,392	7,582		
0.0			3,418	4,278	5,181	6,033	6,756	7,354	7,842	8,238	8,563	8,821		
現状の漁獲圧					2,716	2,823	2,973	3,140	3,289	3,413	3,514	3,595	3,663	3,710

β を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧（F2024）から予測される 578 トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2024、 $\beta = 0.66$ に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021～2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足表 4-4. 将来の漁獲量の平均値の推移

a) 再生産関係による加入のみを想定した場合（トン）

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.0	578	844	778	732	712	712	720	733	747	760	770	777
0.9		772	736	708	698	702	713	727	741	755	766	773
0.8		699	687	677	676	687	699	715	730	744	755	763
0.7		622	631	637	647	663	678	695	711	725	737	745
0.6		543	569	588	607	628	647	665	682	696	708	717
0.5		460	498	528	555	581	602	621	639	653	666	675
0.4		375	419	456	488	517	540	560	578	592	605	614
0.3		286	331	369	403	433	456	476	493	507	518	527
0.2		194	232	266	296	323	343	361	376	388	398	406
0.1		99	122	144	164	181	195	206	216	224	231	236
0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現状の漁獲圧		592	608	620	633	651	668	685	701	715	727	736

b) 現状の放流を想定した場合（トン）

β	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.0	578	844	787	764	767	785	806	826	844	858	870	878
0.9		773	744	737	750	773	797	818	837	852	864	872
0.8		699	694	703	726	754	781	804	823	839	852	861
0.7		622	638	661	692	726	756	781	801	818	831	840
0.6		543	574	609	648	686	719	746	767	785	799	808
0.5		461	503	547	591	633	668	696	718	736	750	761
0.4		375	423	471	518	562	598	626	649	667	681	692
0.3		286	333	381	427	469	503	531	553	570	583	594
0.2		194	234	274	313	349	378	402	421	436	447	457
0.1		99	123	148	173	195	214	229	242	251	259	265
0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現状の漁獲圧		592	614	643	677	712	743	769	790	807	820	830

β を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧（F2024）から予測される 578 トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2024、 $\beta=0.66$ に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021～2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足資料 5 将来予測の方法

将来予測は、「令和 7 (2025) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針. FRA-SA2025-ABCWG02-01. 水産研究・教育機構 (2025a)」の 1 系資源の管理規則に従い、令和 3 年 9 月に開催された「管理基準値等に関する研究機関会議」において最大持続生産量 MSY を実現する F (F_{msy}) の推定に用いた再生産関係 (山下ほか 2021) と、補足表 5-1 に示した各種設定 (自然死亡係数、成熟率、年齢別平均体重、現状の漁獲圧) を使用して実施した。資源尾数や漁獲量の予測計算には、「令和 7 (2025) 年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート. FRA-SA2025-ABCWG02-04. 水産研究・教育機構 (2025b)」に基づき、統計ソフトウェア R (version 4.4.1) および計算パッケージ frasyr (コミット番号 8f9130c) を用いた。

また、本系群は栽培対象種であり、種苗放流が継続的に行われている (表 4-3)。ここで将来の放流尾数については、毎年緩やかながら減少傾向が継続しているため、2023 年の放流尾数 (279 万尾) を用いた。添加効率については、2021~2023 年の添加効率の平均値である 0.066 とした。人工種苗由来の加入尾数はこの放流尾数と添加効率の積である 18 万尾とし、将来予測における 2025 年の加入尾数には、再生産関係による加入尾数とこの人工種苗由来の加入尾数の和を用いた。種苗放流を考慮する場合には、2026 年以降もこの値を毎年の再生産関係から推定される加入尾数に加算して予測を行った。

将来予測における 1~4 歳魚の資源尾数は以下の式で求めた。

$$N_{a,y} = N_{a-1,y-1} \exp(-M_{a-1} - F_{a-1,y-1}) \quad (a = 1, \dots, 4) \quad (18)$$

5 歳魚以上のプラスグループの資源尾数は以下の式で求めた。

$$N_{5+,y} = N_{4,y-1} \exp(-M_{4,y-1} - F_{4,y-1}) + N_{5+,y-1} \exp(-M_{5+,y-1} - M_{5+,y-1}) \quad (19)$$

将来予測における漁獲圧 (F) は 1 系資源の漁獲管理規則に従い、以下の式で求めた。

$$F_{a,y} = \begin{cases} 0 & \text{if } SB_t < SB_{ban} \\ \beta \gamma(SB_t) F_{msy} & \text{if } SB_{ban} \leq SB_t < SB_{limit} \\ \beta F_{msy} & \text{if } SB_t \geq SB_{limit} \end{cases} \quad (20)$$

$$\gamma(SB_y) = \frac{SB_y - SB_{ban}}{SB_{limit} - SB_{ban}} \quad (21)$$

ここで、SB_y は y 年の親魚量、F_{msy} および SB_{target}、SB_{limit}、SB_{ban} はそれぞれ補足表 6-2 に案として示した親魚量の基準値である。

また、各年齢の漁獲尾数は以下の式で求めた。

$$C_{a,y} = N_{a,y} \left(1 - \exp(-F_{a,y})\right) \exp\left(-\frac{M_a}{2}\right) \quad (22)$$

将来予測における資源量および漁獲量は、ここで求めた資源尾数または漁獲尾数に補足表 5-1 の平均体重を乗じて求め、親魚量はこの資源量に成熟割合を乗じて算出した。

引用文献

- 水産研究・教育機構 (2025) 令和 7(2025)年度 漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針. FRA-SA2025-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜, 25 pp, https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2025-ABCWG02-01.pdf. (last accessed 22 July 2025)
- 資源評価高度化作業部会 (2025) 令和 7(2025)年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート. FRA-SA2025-ABCWG02-04, 水産研究・教育機構, 横浜, 14 pp, https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2025-ABCWG02-04.pdf. (last accessed 22 July 2025)
- 山田徹生・本田 聡 (2020) 令和元 (2019) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の資源評価. 令和元年度我が国周辺水域の漁業資源評価, 水産庁・水産研究・教育機構, 東京, 43 pp. https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2023/07/details_2019_061.pdf (last accessed 22 July 2025)
- 山下夕帆・山田徹生・真鍋明弘・金谷彩友美・阪地英男 (2021) 令和 3 (2021) 年度ヒラメ瀬戸内海系群の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2021-BRP04-001, 水産研究・教育機構, 横浜, 40 pp. http://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/20210928/doc_hirame_setonaikai_RIM.pdf (last accessed 22 July 2025)

補足表 5-1. 将来予測計算に用いた設定値

年齢	選択率 (注 1)	Fmsy (注 2)	F2024 (注 3)	平均体重 (g)	自然死亡 係数	成熟 割合
0 歳	0.034	0.014	0.009	107	0.078	0.000
1 歳	0.467	0.187	0.124	349	0.313	0.042
2 歳	0.922	0.369	0.244	848	0.313	0.750
3 歳	1.000	0.400	0.265	1,660	0.313	0.818
4 歳	0.949	0.380	0.251	2,651	0.313	1.000
5 歳以上	0.949	0.380	0.251	3,853	0.313	1.000

注 1：令和 3 年度研究機関会議で MSY を実現する水準の推定の際に使用した選択率（すなわち、令和 3 年度資源評価での $F_{current}$ の選択率）。

注 2：令和 3 年度研究機関会議で推定された Fmsy（すなわち、令和 3 年度資源評価での $F_{current}$ に $F_{msy}/F_{current}$ を掛けたもの）。

注 3：上記の選択率の下で、今回の資源評価で推定された 2024 年の年齢別 F と同じ漁獲圧を与える F 値を %SPR 換算して算出した。この F 値は 2025 年の漁獲量の仮定に使用した。

補足資料 6 各種パラメータと評価結果の概要

補足表 6-1. 再生産関係式のパラメータ

再生産関係式	最適化法	自己相関	a	b	S.D.	ρ
ホッケー・スティック型	最小二乗法	有	1.28	1,154	0.294	0.703

a と b は各再生産関係式の推定パラメータ、S.D. は加入量の標準偏差、 ρ は自己相関係数である。

補足表 6-2. 管理基準値案と MSY

項目	値	説明
SBtarget 案	2,427 トン	目標管理基準値案。最大持続生産量 MSY を実現する親魚量 (SBmsy)
SBlimit 案	857 トン	限界管理基準値案。MSY の 60% の漁獲量が得られる親魚量 (SB0.6msy)
SBban 案	121 トン	禁漁水準案。MSY の 10% の漁獲量が得られる親魚量 (SB0.1msy)
Fmsy		SBmsy を維持する漁獲圧 (漁獲係数 F) (0 歳, 1 歳, 2 歳, 3 歳, 4 歳, 5 歳以上) =(0.01, 0.19, 0.37, 0.40, 0.38, 0.38)
%SPR (Fmsy)	28%	Fmsy に対応する %SPR
MSY	806 トン	最大持続生産量

補足表 6-3. 最新年の親魚量と漁獲圧

項目	値	説明
SB2024	2,464トン	2024年の親魚量
F2024	2024年の漁獲圧(漁獲係数 F) (0歳, 1歳, 2歳, 3歳, 4歳, 5歳以上) =(0.01, 0.13, 0.22, 0.29, 0.25, 0.25)	
U2024	16.4%	2024年の漁獲割合
%SPR (F2024)	39.6%	2024年の%SPR、現状(2024年)の漁獲圧に対応する%SPR
管理基準値案との比較		
SB2024/ SBmsy (SBtarget案)	1.02	最大持続生産量を実現する親魚量(目標管理基準値案)に対する2024年の親魚量の比
F2024/ Fmsy	0.66	SBmsyを維持する漁獲圧に対する2024年の漁獲圧の比*
親魚量の水準	MSYを実現する水準を上回る	
漁獲圧の水準	SBmsyを維持する水準を下回る	
親魚量の動向	増加	

*2024年の選択率の下で Fmsy の漁獲圧を与える F を%SPR 換算して算出し求めた比率。

補足表 6-4. 再生産による加入のみを想定した場合の予測漁獲量と予測親魚量

2026年の親魚量(予測平均値):2,637トン				
項目	2026年の 漁獲量 予測平均値 (トン)	90% 予測区間 (トン)	現状の漁獲圧に 対する比 (F/F2024)	2026年の 漁獲割合(%)
$\beta=1.0$	844	821-875	1.51	24.7
$\beta=0.9$	772	752-801	1.36	22.6
$\beta=0.8$	699	681-725	1.21	20.5
$\beta=0.7$	622	606-645	1.06	18.2
$\beta=0.6$	543	529-563	0.91	15.9
$\beta=0.5$	460	449-477	0.76	13.5
$\beta=0.4$	375	366-388	0.60	11.0
$\beta=0.3$	286	279-297	0.45	8.4
$\beta=0.2$	194	190-201	0.30	5.7
$\beta=0.1$	99	97-102	0.15	2.9
$\beta=0.0$	0	0- 0	0.00	0.0
F2024	592	577-614	1.00	17.3

補足表 6-5. 現状の放流を想定した場合の予測漁獲量と予測親魚量

2026年の親魚量(予測平均値):2,637トン				
項目	2026年の 漁獲量 予測平均値 (トン)	90% 予測区間 (トン)	現状の漁獲圧に 対する比 (F/F2024)	2026年の 漁獲割合(%)
$\beta=1.0$	844	822-876	1.51	24.6
$\beta=0.9$	773	753-802	1.36	22.5
$\beta=0.8$	699	681-725	1.21	20.3
$\beta=0.7$	622	606-645	1.06	18.1
$\beta=0.6$	543	529-563	0.91	15.8
$\beta=0.5$	461	449-477	0.76	13.4
$\beta=0.4$	375	366-389	0.60	10.9
$\beta=0.3$	286	279-297	0.45	8.3
$\beta=0.2$	194	190-201	0.30	5.7
$\beta=0.1$	99	97-102	0.15	2.9
$\beta=0.0$	0	0- 0	0.00	0.0
F2024	592	577-614	1.00	17.2

現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021~2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足表 6-6. 再生産による加入のみを想定した場合の異なる β を用いた将来予測結果

考慮している不確実性: 加入量					
項目	2036年の親魚量予測平均値(トン)	90%予測区間(トン)	2036年に親魚量が以下の管理基準値を上回る確率(%)		
			SBtarget案	SBlimit案	SBban案
$\beta=1.0$	2,335	1,487- 3,371	40	100	100
$\beta=0.9$	2,570	1,647- 3,698	52	100	100
$\beta=0.8$	2,842	1,821- 4,061	63	100	100
$\beta=0.7$	3,157	2,043- 4,481	77	100	100
$\beta=0.6$	3,526	2,295- 5,002	85	100	100
$\beta=0.5$	3,960	2,585- 5,564	93	100	100
$\beta=0.4$	4,476	2,943- 6,268	98	100	100
$\beta=0.3$	5,093	3,359- 7,126	99	100	100
$\beta=0.2$	5,837	3,874- 8,169	100	100	100
$\beta=0.1$	6,741	4,509- 9,467	100	100	100
$\beta=0.0$	7,851	5,306-10,930	100	100	100
F2024	3,291	2,133- 4,659	81	100	100

補足表 6-7. 現状の放流を想定した場合の異なる β を用いた将来予測結果

考慮している不確実性: 加入量					
項目	2036年の親魚量予測平均値(トン)	90%予測区間(トン)	2036年に親魚量が以下の管理基準値を上回る確率(%)		
			SBtarget案	SBlimit案	SBban案
$\beta=1.0$	2,636	1,793- 3,670	56	100	100
$\beta=0.9$	2,900	1,977- 4,026	68	100	100
$\beta=0.8$	3,205	2,189- 4,424	82	100	100
$\beta=0.7$	3,560	2,446- 4,884	91	100	100
$\beta=0.6$	3,975	2,745- 5,452	96	100	100
$\beta=0.5$	4,464	3,089- 6,067	99	100	100
$\beta=0.4$	5,044	3,511- 6,836	100	100	100
$\beta=0.3$	5,736	4,002- 7,769	100	100	100
$\beta=0.2$	6,570	4,607- 8,902	100	100	100
$\beta=0.1$	7,582	5,350-10,307	100	100	100
$\beta=0.0$	8,821	6,276-11,900	100	100	100
F2024	3,710	2,553- 5,078	93	100	100

現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021~2023 年の平均添加効率と 2023 年の放流尾数との積とした。

補足表 6-8. 将来の加入の想定を変化させた場合に予測される親魚量・漁獲量と親魚量が管理基準値案を上回る確率のまとめ

将来の加入の想定	β	10年後の目標達成確率(%)	予測平均親魚量(トン)		予測平均漁獲量(トン)		
		親魚量が目標管理基準値案を上回る	5年後	10年後	0年後	5年後	10年後
			2031年	2036年	2026年	2031年	2036年
再生産関係による加入のみ	1.0	40	2,151	2,335	844	720	777
	0.8	63	2,589	2,842	699	699	763
	0.6	85	3,156	3,526	543	647	717
	0.4	98	3,899	4,476	375	540	614
	0.2	100	4,881	5,837	194	343	406
	0.0	100	6,190	7,851	0	0	0
	F2024	81	2,964	3,291	592	668	736
種苗放流を考慮* (279万尾放流、添加効率0.066)	1.0	56	2,403	2,636	844	806	878
	0.8	82	2,881	3,205	699	781	861
	0.6	96	3,497	3,975	543	719	808
	0.4	100	4,301	5,044	375	598	692
	0.2	100	5,356	6,570	194	378	457
	0.0	100	6,756	8,821	0	0	0
	F2024	93	3,289	3,710	592	743	830

漁獲管理規則案での調整係数 β を 0~1.0 にて 0.2 刻みで変更した結果をまとめた。

漁獲管理規則案での漁獲管理を開始する初年度（0年後）の2026年の値と、5年および10年管理を行った後の値（2031年および2036年）を示した。

*現状の放流による人工種苗由来の加入尾数は 2021~2023 年の平均添加効率（0.066）と 2023 年の放流尾数（279万尾）との積である 18万尾とした。