




キチジ道東・道南 令和7年度資源評価結果

生物学的特性




生物学的特性

- 寿命：不明
- 成熟開始年齢：雌の50%成熟体長は24 cm（6～10歳）、雄は不明
- 産卵期・産卵場：3～5月、恵山海丘、襟裳岬沖、釧路沖、落石沖の山状地形の周辺（水深400～850m）
- 食性：クモヒトデ類、ヨコエビ類、オキアミ類、エビ・カニ類、多毛類、魚類など
- 捕食者：マダラ、アブラガレイ、キチジ（共食い）


- 主な分布水深は300～900m

漁獲の動向




- 沖合底びき網漁業（沖底）や沿岸漁業（えびこぎ網漁業、刺し網漁業）により周年漁獲
- 1985年には1,000トンを超えていた漁獲量は、1998年以降は概ね200～300トン程度にまで減少したが、2012年以降にやや増加した後、2024年には373トンとなった

資源評価の流れ



※ABCは漁業法改正前の考え方に基づく基本規則を適用した値


資源の動向①



※水準区分 低位／中位：漁獲量482トン、中位／高位：漁獲量775トン
(過去39年間(1986~2024年)の漁獲量の最高値~最低値の間を3等分して算出)

- 過去39年間(1986~2024年)の漁獲量から資源水準を判断
- 資源水準：2024年の漁獲量は373トンであり「低位」

資源の動向②



- 資源量指標値（トロール調査結果に基づく分布密度推定値）により動向を判断
- 資源動向：直近5年間（2021～2025年）の道東海域での資源量指標値の推移から「減少」

※トロール調査：底魚類共同資源調査

資源評価のまとめ

- キチジ道東・道南の資源水準は「低位」、動向は「減少」
- 漁獲量から資源水準を判断し、資源量指標値（分布密度推定値）の推移から資源動向を判断

2026年ABC

管理基準	Target/Limit	2026年ABC (トン)	漁獲割合 (%)	F値（現状のFからの 増減%）
0.7・Cave3-yr・0.88	Target	200	—	—
	Limit	250	—	—

- 漁業法改正前の考え方に基づく基本規則の2-1) により、
 $ABC\ limit = \delta_1 \cdot Ct \cdot \gamma_1$ で計算
- δ_1 : 0.7（低位水準での推奨値）
- Ct : Cave3-yr（直近3年間（2022～2024年）の漁獲量平均値）
- γ_1 : 0.88（直近3年間の資源量指標値の傾きと平均値から算定される係数）